

Smärre meddelanden och notiser.

Fjärilar från Blekinge.

Fynd från Holmsjö i Sillhövda s:n i nordöstra Blekinge.

I november 1948 inköpte jag en sportstuga i Sillhövda s:n i Blekinge, närmare bestämt belägen mellan de båda sjöarna Sillhövdingen och Hugölen. Här har jag under tvonne år bedrivit fjärilsfångst, dels dagfjärilsfångst naturligtvis, dels ljusfångst samt i någon ringa mån lockbetefångst. Denna sistnämnda har nästan ständigt slagit fel, men så mycket mera givande har ljusfångsten blivit. Skogar och mossar äro de förhärskande växtsamhällena i trakten, och på grund härav äro en del rent nordliga arter att anteckna, t. ex. *Chl. solidaginis* Hb., *Rh. subrosea* Steph. var. *subcoerulea* Stgr., *E. diversata* Schiff. och *C. pendularia* Cl. (*orbicularia* Hb.). Men även rent sydliga element ha tagits, exempelvis *P. ridens* F., *D. harpagula* Esp., *Sc. decorata* Schiff., formen *violata* Thunbg. och *O. sambucaria* L. Sammanlagt ha 408 arter tagits. Antalet torde dock kunna utökas åtskilligt, särskilt om lockbetefångsten i framtiden kommer att lyckas bättre än hittills. Nomenklaturen är efter Nordström och Wahlgren: Svenska fjärilar.

Ett varmt tack framhäres härmed till fil. dr Frithiof Nordström, som bestämt en del av *Eupitecia*-arterna samt några andra.

Fyndlista.

P. machaon L. 1 ex. på blommande *Lychnis* 5.6.49. — *A. crataegi* L. Mycket allm. i trakten. Slån och vildapel vanliga. — *P. brassicae* L., *rapae* L. och *napi* L. Allmänna. — *A. cardamines* L. Ej särskilt allm. 4—5 ex. — *C. palaeno* L. Observerad på Åbyholms torvmosse 5 km från min stuga. — *G. rhamni* L. och *L. sinapis* L. Båda allmänna. — *P. c-album* L. T. allm. Som larv tagen på lönn, vilken näringsväxt jag ej förut sett anmäld. En larv på nässlor. — *P. atlanta* L. Endast ett ex. sept. 50. — *P. cardui* L. Flera ex. 49. — *M. cinxia* L. och *athalia* Rott. Mycket allmänna. — *D. paphia* L. Allm. — *R. lathonia* L. Allm. — *A. aglaja* L., *cydippe* L. och *niobe* L. Mycket allmänna. — *B. selene* Schiff. och *euphrosyne* L. Allmänna. — *E. ligea* L. Allm. 1949. Både här och i hela Blekinge ej observerad 1950. Denna art synes åtminstone i södra Sverige uppträda blott vartannat år, varför man väl får lov antaga att larvens utveckling tar två år i anspräk. — *S. semele* L. Några ex. i juli 49—50. — *A. hyperanthus* L. och *E. jurtina* L. Mycket allmänna. — *C. arcania* L. och *pamphilus* L. Allmänna. — *P. megaera* L. T. allm. — *P. hiera* L. Allm. — *P. maera* L. T. allm. — *C. rubi* L. Mycket allm. — *R. betulæ* L. Flera larver på slån 49. — *H. hippotheæ* L. På en sankäng 1 km från min stuga, i fortsättningen benämnd »Sjöängen», några ex. av f. *eurydice* Rott. — *H. virgaureæ* L. och *phlaeas* L. Allmänna. — *Pl. argus* L. och *idas* L. Allm. — *Pl. medon* Esp. Ett par ex. i juni 49 och 50. — *P. icarus* Rott. Allm. i två gen. — *P. amandus* Schn.

Några ex. 49—50. — *P. semiargus* Rott. Några ex. 49—50. — *P. optilete* Knoch. 1 ex. 19.6.49. — *C. argiolus* L. Ej allm. men tagen båda åren. — *A. lineola* Ochs. T. allm. — *A. sylvanus* Esp. Allm. — *H. malvae* L. Oerhört allm. i maj. Även larven tagen aug. 49 vid Fur, Sillhövda s:n på Comarum palustre. — *N. tages* L. Allm. särskilt 1950. — *Sm. ocellatus* L. Två larver på Salix 21.7.50 kläckta april 51 ♂ och ♀. — *A. populi* L. Allm., kommer ofta på ljus sent på kvällen, omkring midnatt. — *H. tityus* L. Flera ex. på en ödetomt 2 km från min stuga. Även larven tagen. — *P. elpenor* L. Några ex. på lockbete båda åren. — *P. porcellus* L. Flera ex. på ljus 49—50. — *D. vinula* L. Synes vara allm. Både hanar och honor tagna på ljus i maj båda åren. Även larven på asp. — *S. fagi* L. En larv 7.8.49 å Salix caprea kläckt 5.6.50 ♀. Denna stod ute hela natten, men ingen ♂ visade sig. — *D. chaonia* Hb. Ett ex. 6.5.50 och minst 20 ex. 12.5.50 ljusfångst. Dock endast ♂♂. — *Ph. tremula* Cl. 1 ♂ 5.5.50 och ett 10-tal ex. (♂♂ och ♀♀) på ljus 22.7.50. — *Ph. dictaeoides* Esp. 1 ♂ 6.5.50 och flera ex. på ljus i juli—aug. 50. — *N. ziczac* L. Allm. i två gen. — *N. dromedarius* L. På en nykläckt ♀ togos 12.5.50 13 st. ♂♂. Dessutom ett och annat ex. på ljus i juli—aug. samt larver å björk och al. — *N. phoebe* Sieb. En stor och vacker ♀ på ljus 6.6.50, tillhörande typformen. Av en del ägg, som hon lade, erhölls tre puppor. 2 ♂♂ kläckta febr. 51. — *P. anceps* Goeze. Den 12.5.50 flög arten talrikt till lampan. En del sutto kvar till följande dag. Sammanlagt minst ett 20-tal ex. Dock endast ♂♂. — *L. camelina* L. Allm. i två gen. — *Pt. palpnum* L. 2 ex. juni 49. — *Pt. plumigera* Esp. Allm. okt.—nov. båda åren, mest ♂♂ men även enstaka ♀♀. Arten ej tagen i Karlskrona. — *Ph. bucephala* L. Några ex. i juli båda åren. — *E. pavonia* L. Synes vara allm. 1 ♀ på ljus 9.5.49. Larven allm. överallt på diverse växter såsom blåbär, rosor och Salix. Arten ej tagen i Karlskrona. — *A. tau* L. I en större bokskog på andra sidan Sillhövdingen flögo många ♂♂ 14.5.50. Boken var då nyutslagen. De flögo endast på morgonen mellan 9—11 i solskenet. ♀♀ stundom på ljus. — *E. versicolora* L. På en nykläckt ♀ togos den 22.4.50 6 ♂♂. En av dem släpptes in till honan, och kopulationen vid tog nästan genast samt varade i sex timmar. Dagen därpå hade ♀ lagt ett 90-tal ägg. Hanarna av denna art flyga både på kvällen — och komma då gärna till ljus — och på morgonen i solskenet. — *M. neustria* L. Mycket allm. i juli. — *Tr. crataegi* L. T. allm. i aug.—sept. På en nykläckt ♀ togos 26.8.49 fjorton ♂♂. — *P. populi* L. Allm. på ljus okt.—nov. 49—50. Även ♀♀ på ljus. Den 31.10.50 tände jag lampan klockan 18.30. Efter 1 timma sutto cirka 40 ♂♂ på väggen. — *E. lanestris* L. 1949 flera larvkolonier. 1 ♂ kläckt 50. 1 ♀ kläckt febr. 51. — *L. quercus* L. Två larver cirka 3,5 cm långa 14.8.50 vid Dunkamåla mosse $\frac{1}{2}$ mil SO Holmsjö. — *L. trifolii* Esp. Mycket allm. Båda könen komma gärna till ljus. — *M. rubi* L. Mycket allm. ♀ ofta på ljus, ♂ i solnedgången. — *D. pini* L. 1 ♂ på ljus 12.7.50. — *D. pudibunda* L. 2 ♂♂ på ljus 12 och 13 maj 50, resp. i larv på Salix caprea 7.8.49. Synes avtagta i frekvens norrut, då arten i Karlskrona är mycket allm. på försommaren. — *S. salicis* L. 1 ♂ 12.8.50. — *L. monacha* L. Ett 10-tal ♂♂ på ljus aug. 50. Från den ljusa huvudformen med många mellanformer till den nästan svarta ab. *eremita* Ochs. — *P. similis* Fuessl. Några ex. på ljus i juli båda åren. 1 ♀, 5 ♂♂. — *D. lacertinaria* L. och *falcataria* L. Allmänna i maj och juli båda åren. — *D. harpagula* Esp. 1 ♂ på ljus 17.6.50. Ny för Bl.! — *Th. batis* L. 1 ♂ 22.7.50 å ljus. — *P. flavigornis* L. T. allm. båda åren. — *P. duplaris* L. Några ex. i juli 49, 50. — *P. fluctuosa* Hb. 2 ex. 17.7.50. — *Po. cinerea* Goeze. Mycket allm. i april. — *Po. ridens* L. ♂ 6.5.50. — *D. coeruleocephala* L. Mycket allm.; även enstaka ♀♀ på ljus. — *P. coenobita* Esp. 1 ♂ 22.7.50 på ljus. — *C. coryli* L. Allm. i maj på ljus. Endast ♂♂. — *A. leporina* L. Några larver på björk 20.7.50. — *A. megacephala* F. Flera ex. å lockb. 49. — *A. tridens* Schiff. 1 ♂ 15.8.50 å ljus. Mycket mörkt ex. Någon melanistisk form? Larv 14.8.50 å asp Dunkamåla mosse. — *A. cuspis* Hb. 1 ♀ å lockb. 6.7.49. 2 ♂♂ på ljus 22.7.50. — *A. auricoma* F. Några ex. i maj. 1 ♂ redan 19.5.50. Allm. i juli 49, 50. — *A. euphorbiae* Schiff. 3 ex. juli—aug. 49, 50. — *A. rumicis* L. T. allm. maj—juli. Larven mycket allm. på

allehanda buskar. — *B. divisa* Esp. 3 ex. i aug. 50 å ljus. — *E. obelisca* Hb. 7 ex. i aug. 49, 50. — *E. nigricans* L. Endast fyra ex. 49—50. — *E. tritici* L. 1 ♂ 26.8.49. — *A. ypsilon* Rott. 1 ♂ 12.8.50 å ljus. — *A. segetum* Schiff. 1 ♀ å lockb. 14.7.49. — *A. corticea* Hb. (*clavis*). Mycket allm. juli 49. 1950 endast ett par ex. — *A. vestigialis* Rott. 1 ex. på ljus 6.8.49. — *A. cinerea* Schiff. 1949 oerhört allm. från 15.5. t. o. m. midsommar, 1950 ej så allmän men dock tagen i ett 10-tal ex. senare hälften av maj. Arten varierar kolossal från nästan vita ex. över rödbruna, gråsvarta till nästan svarta. De färliga ♀♀ alltid mörkare än ♂♂. — *A. exclamatio*nis L. Några ex. i juni båda åren. Ej på långt när så vanlig som nere vid kusten. — *Rh. subrosea* Steph. var. *subcoerulea* Stgr. 2 ex. på ljus 12.8.50. Larver på odon Dunkamåla mosse juni 49. — *Rh. griseascens* F. 1 ♀ på ljus 26.8.50. — *Rh. porphyrea* Schiff. (*varia* Vill.). Allm. på ljus juli 1950. — *Rh. dahlii* Hb. Flera ex. 49—50. Även några av ab. *fusca* Ling. — *Rh. mendica* F. 2 ex. på lockbete juli 49. — *Rh. baja* F. Allm. på lockbete 49—50. — *Rh. rubi* View. Mycket allm. slutet av maj—sept. i två generationer. — *Rh. C-nigrum* L. Mycket allm. särskilt aug.—sept. — *Rh. triangulum* Hufn. 1 ex. 11.7.50 på lockbete. — *Rh. plecta* L. 1 ♀ på ljus 2.6.49. — *Rh. umbrosa* Hb. 1950 ett 10-tal ex. på ljus i aug. — *Rh. xanthographa* Schiff. Mycket allm. — *Rh. augur* F. 1 ex. på lockbete 14.7.49. — *E. occulta* L. Några ex. på lockbete juli 49. — *C. rubricosa* Schiff. Allm. i april på ljus, även ♀♀. Larven, ofta erhållen ex ovo, mycket stor i förhållande till fjärilen. — *C. sobrina* Gn. 2 ♂♂ på ljus aug. 50. — *O. caecimacula* Schiff. Allm. i sept. — *T. fimbria* L. 1 ♀ på ljus 27.8.49. — Ur några ägg från denna ♀ kläcktes ett mycket mörkt ex. ab. *solani* F. — *T. pronuba* L. Allm. särskilt på lockbete 49—50. — *Sc. trifolii* Rott. 5 ex. på lockbete och flera på ljus 5.8.50. — *P. contigua* Schiff. 1 ♂ juli 49. ♀ 5.8.50. — *P. genistae* Bkh. Flera ex. på ljus juni 50. — *P. dissimilis* Kn. T. allm. i aug. Uppträder mest i formen *W-latinum* Esp. — *P. pisi* L. 2 ex. på ljus juni 50. Larven allm. överallt i aug.—sept. — *P. nana* Hufn. (*dentina* Esp.). Mycket allm. i juni 49, 50. 1 ex. av ab. *latenai* Perr. 7.6.50. — *P. serena* Schiff. 3 ex. på ljus 29—30 maj 50. I juli flera larver på Hieracium umbellatum. Ex. synes tillhöra f. *obscura* Stgr. — *H. rivularis* F. 1 ♀ på lockbete 7.8.49. — *H. bicruris* Hufn. 1 ♂ på ljus 21.7.50. Nejlikväxter finnas rätt sparsamt i trakten. — *A. advena* Schiff. Allm. på ljus och lockbete båda åren. — *A. nebulosa* Hufn. 1 ex. å lockbete 10.7.49. — *P. fulminea* F. Allm. på ljus båda åren. — *H. reticulata* Vill. T. allm. i juni 49. Ej tagen 1950. — *Th. populi* F. och *coespitis* Schiff. Mycket allmänna. — *M. gothica* L. Allm. — *M. populi* Ström. Allm. Den 5.4.49 sutto minst ett 40-tal på väggen under lampan. Även larven nedslagen från asp. — *M. miniosa* F., *pulverulenta* Esp., *incerta* Hufn. och *opima* Hb. Allmänna. — *M. gracilis* F. Några ex. 22.4 och 6.5.50. — *C. graminis* L. Allm. Även ♀♀ på ljus. — *H. lithargyria* Esp. Allm. — *S. conigera* Schiff. Allm. — *S. comma* L. T. allm. — *S. impura* Hb. 1949 ej sälls. Intet ex. 1950. — *S. straminea* Tr. 1 ex. 10.7.49. — *S. pallens* L. Allm. juli, aug., sept. — *C. absinthii* L. 1 ex. ♀ 21.7.50. — *C. umbratica* L. 1 ex. 49. 2 ex. 50 i juli. — *B. nubeculosa* Esp. Allm. mars—april. — *D. templi* Thunb. T. allm. Flera ex. tagna sept. och april båda åren. — *B. viminalis* F. Mycket allm. juli—aug. Kommer sent till ljuset, efter kl. 23. — *Chl. solidaginis* Hb. 1 ex. genom hävning på bärris 12.8.50. Larver på samma lokal 49. 2 ♀♀ kläckta. Larven även på Dunkamåla mosse och vid Åbyholms torvmosse. — *L. lambda* F. Endast 1 ex. 15.4.50 på ljus. — *L. socia* Rott. 1 ex. 21.3.50 å lockbete. — *X. exoleta* L. 1 ex. 10.10.50 å lockbete. — *M. oxyacanthae* L. T. allm. på hösten. Larven ofta på slån i maj. — *C. celsia* L. Allm. i sept. Även ♀♀ på ljus. — *C. sativa* Schiff. Allm. i aug.—sept. — *C. adusta* Esp. 1 larv under mossan på en sten april 1949. — *A. aprilina* L. 1 ♀ 22.9.49 å ljus. — *C. gemmea* Tr. T. allm. särskilt 49. — *D. protea* Schiff. T. allm. särskilt 49. — *A. chi* L. Ej sälls. Tages ofta redan på eftermiddagen. — *E. satellitia* L. Allm. höst och vår på ljus och lockbete. — *C. vau punctatum* Esp. och *C. vaccinii* L. Allmänna höst och vår på ljus och lockbete. — *C. rubriginea* Schiff. 1 ex. 5.5.50 å ljus. — *A. macilenta* Hb. 1 ex. 21.10.49 å ljus. — *A. circellaris* Hufn. 2 ex. 49, 50. — *A. helvola* L. Allm. i sept. Larven allm. på Salix och asp i juni. — *A. litura*

L. T. allm. i sept. båda åren. — *C. lutea* Ström. Endast 1 ex. 24.9.50. — *C. icteritia* Hufn. (*fulvago* Cl.). 2 ex. aug. 49, 1 ex. 1950. — *A. tragopogonis* L. Allm. i aug. 49, 50. — *St. umbratica* Goeze. Mycket allm. 49, 50. — *D. scabriuscula* L. 1 ♂ 21.7.50. — *P. monoglypha* Hufn. Allm. i juli på ljus och lockbete. — *P. rurea* F. 1 ♀ 17.6.50. ab. *alopecurus* Esp. — *P. lateritia* Hufn. Allm. i juli 49, 50. — *P. secalis* L. Endast 1 ♂ 21.7.49 å lockbete. — *Pr. strigilis* L. 1 ♂ 15.6.49, 1 ♂ 25.6.50. 1 ♀ 6.7.49. — *C. furva* Schiff. Allm. juli 49. Ej allm. 50. — *P. testacea* Schiff. Mycket allm. 49, 50. — *T. atriplicis* L. Allm. från 29.5 till slutet av juli. — *E. lucipara* L. 1 ♂ på ljus 20.6.50. — *Th. matura* Hufn. Mycket allm. båda åren. — *H. alsines* Brahm. Allm. juli 49, 50. — *H. blanda* Schiff. Allm. juli, aug. 49, 50. Flyger något senare än föregående. — *E. morpheus* Hufn. Ej så allm. som de båda föregående men likväld ej sälls. — *E. cinerascens* Tngstr. T. allm. 49, 50. — *E. selini* B. Endast 1 ♂ 24.6.49. — *Ath. palustris* Hb. Flera ex. maj—juni båda åren. De flesta synas tillhörta typformen. Ringfläck finnes. Diskfläck på bakvingarna. Ett och annat ex. från Karlskrona tillhör emellertid *f. lutescens* Farr. — *Ap. fucosa* Frr. Allm. — *Ap. ocella* L. Mycket allm. 49, 50. — *Ap. lucens* Frr. 4 ex. 49, 50. — *Ap. crinennis* Burr et Pierce. 1 ex. 49. — *H. micacea* Esp. Allm. 49, 50. — *I. subtusa* F. 3—4 ex. årligen i juli, aug. 1 larv på asp. — *M. trigramma* Hufn. 3 ex. tagna 8.6.49 tillhörande ab. *evidens* Thnbg. — *C. trapezina* L. T. allm. men ej på långt nära så allm. som nere vid kusten. Varierar mycket. — *E. paleacea* Esp. Några ex. i aug. båda åren. — *Rh. lutescens* Hb. 1 ♀ 14.9.49 å ljus. — *Ar. fluxa* Hb. Flera ex. å ljus och lockbete i aug. Både huvudformen och ab. *hellmanni* Ev. — *Ar. pygmina* Haw. T. allm. på ljus i sept. 49, 50. — *C. virens* L. 1 ex. 20.8.49. — *P. flammea* Schiff. Flera ex. april, maj 1950. — *E. uncula* Gl. 2 ex. 12.7 och 21.7.50. Tagen i mängd 1942 vid Furs sanatorium, Sillhövda s:n av E. Åkesson. — *S. revayanus* Scop. 2 ex. ♂ och ♀ 26.8.50. — *S. degeneranus* Hb. 1 ♀ 25.7.49. 1 ♂ 5.5.50. — *H. bicolorana* Fuessl. 1 ♀ på ljus 18.7.49. — *C. fraxini* L. 1 ♂ på ljus 2.9.50. — *G. mi* Cl. 1 ex. 14.5.49. 2 ex. 29.5.50 på »Sjöängen». Ny för Bl.! — *G. glyphica* L. T. allm. i maj 49, 50. — *Ph. chrysitis* L. Flera ex. på ljus i juni och sept. — *Ph. gamma* L. Allm. i juni och sept.—okt. på ljus och på dagen. Massvis på blommande Buddleja variabilis. — *A. triplasia* L. 1 ex. 25.8.50 å ljus. — *A. tripartita* Hufn. 3 ex. i juli 49, 50. — *T. viciae* Hb. 1 ex. å ljus 24.6.49. — *P. fuliginaria* L. Ett par ex. i juli båda åren. — *Pr. viridaria* Cl. 1 ♂ 26.6.49 på dagen. — *R. sericealis* Scop. Ej sälls. Flera ex. på ljus aug.—sept. — *Z. tarsiplumalis* Hb. T. allm. i juli 49, 50. — *Z. tarsipennalis* Tr. Ett par ex. juli 49, 50. — *Z. nemoralis* F. 1 ex. 16.7.49. — *H. derivialis* Hb. 1 ♀ 17.7.49. — *P. barbalis* Cl. Några ex. juni 49. — *B. fontis* Thnbg. Larven t. allm. på blåbär i aug. — *H. proboscidalis* L. Flera ex. i juli båda åren. — *H. rostralis* L. 1 ♀ på ljus 19.5.50. — *Br. parthenias* L. T. allm. i björkskog. — *E. diversata* Schiff. 1 ♂ på ljus 15.4.50. Flyger ju i vanliga fall på dagen. — *H. papilionarius* L. T. allm. 49, 50, juni—aug. — *C. pustulata* Hufn. 1 ♂ 30.6.49 å ljus. — *J. lactearia* L. Några ex. i juni 49, 50. — *J. putata* L. Flera ex. juni 1950 på blåbärsmarker. — *R. vibicaria* Cl. Allm. båda åren. — *C. amataria* L. T. allm. i juni och aug.—sept. 2 ♂♂ 20 och 30 aug. 50 synas vara f. *brykaria* Ndstr. (se *Folio* entomologicum 1943). De övriga f. *amataria* *amataria* L. (*griseata* Peters). — *C. albipunctata* Hufn. 1 ♀ 7.6.50. — *C. pendularia* Cl. (*orbicularia* Hb.). 1 ♀ 25.6.50. Ny för Bl.! — *C. punctaria* L. Några ex. i juni 49, 50. — *C. linearia* Hb. 1 ♀ 13.6.50 å ljus. — *Sc. ternata* Schrank. 1 ex. 20.6.50. — *Sc. incanata* L. T. allm. 49, 50. — *Sc. immutata* L. T. allm. på »Sjöängen». — *Sc. floslactata* Haw. Ett och annat ex. på dagen maj—juni 49, 50. — *Sc. ornata* Scop. T. allm. juni och aug. båda åren. Synes ha två generationer. — *Sc. decorata* Schiff. f. *violata* Thnbg. Ett ex. ♂ 25.8.50 på ljus. Ny för Bl.! — *St. serpentata* Hufn. T. allm. på »Sjöängen». — *St. biselata* Hufn. 1 ex. 26.7.49. — *St. sylvestraria* Hb. 1 ex. 18.7.50. — *St. seriata* Schrank. 1 ♂ 6.7. 1 ♀ 25.7.1950. — *St. dimidiata* Hufn. Allm. 49, 50. — *St. pallidata* Schiff. Åbyholm, Sillhövda s:n. 1 ♀ 25.6.49. 1 ♂ 4.6.50. 1 ♂ 14.6.50. — *St. emarginata* L. Flera ex. juli 1950. — *St. aversata* L. Huvudf. ej allm. Ett par ex. 49, 50. ab. *remutata* L. (*spoliata* Stgr.) var däremot allm. 49, 50. —

St. inornata Haw. Allm. juli 49, 50. — *St. deversaria* HS. T. allm. juni, juli 49, 50. — *L. purpurata* L. Några ex. på en torräng ett par km från min stuga. — *L. clavaria* Haw. 1 ♀ på ljus 22.8.49. — *C. chenopodiata* L. Allm. på dagen och på ljus båda åren. — *Ch. legatella* Schiff. 1 ♀ på ljus 10.10.50. — *A. plagiata* L. Mycket allm. i två generationer, maj—juni och aug.—sept. båda åren. — *N. carpinata* Bkh. T. allm. april—maj båda åren. — *L. halterata* Hufn. Några ex. i maj 50. — *M. sexalata* Retz. 1 ♂ 3.6.50 »Sjöängen». — *O. fagata* Scharfenb. och *brumata* L. Mycket allmänna 49, 50. — *O. christyi* Prt. T. allm. sept.—okt. 49, 50. — *O. autumnata* Bkh. Allm. 49, 50. — *Ph. vetulata* Schiff. 1 ex. 21.7.50. — *L. prunata* L. 1 ♂ 13.7.49 å ljus. — *L. testata* L. Allm. 49, 50. Förekommer ofta som ab. *insulicola* Stgr. — *L. populata* L. Allm. 49, 50. — *L. mellinata* F. Ett par ex. i juli 49, 50. — *L. pyriliata* Schiff. Allm. 49, 50. — *Cid. fulvata* Forst. 1 ♂ 19.7.49. — *Cid. ocellata* L. Allm. i två generationer maj—juni och aug., sept. 49, 50. — *Cid. bicolorata* Hufn. 1 ♂ å ljus 13.7.49. — *Cid. variata* Schiff. 1 ex. 1950. — *Cid. obeliscata* Hb. Några ex. aug. 49, 50. — *Cid. juniperata* L. Mycket allm. okt. 49, 50. — *Cid. firmata* Hb. Allm. sept. 49. 1 ♀ 2.9.50. — *Cid. cognata* Thnbg. Allm. i juli 49, 50. — *Cid. citrata* L. Allm. aug.—sept. 49, 50. — *Cid. siterata* Hufn. Ej sälls. aug.—sept. 49, 50. — Ej iakttagen på våren. — *Cid. miata* L. Allm. höst och vår 49, 50. — *Cid. iliciflora* L. Allm. i 2 generationer, maj och aug. 49, 50. — *Cid. montanata* Schiff. 1 ♂ 20.6.50. 1 ♀ Åbyholm 25.6.49. — *Cid. spadicearia* Schiff. Ej allm.; några ex. tagna i juni 49. — *Cid. ferrugata* Cl. Mycket allm. i två generationer, maj och aug. — *Cid. quadriasciata* Cl. T. allm. juli 49, 50. — *Cid. lignata* Hb. 1 ♂ 29.5.49. 1 ♀ 9.8.49. 1 ♂ 13.6.50. Av honan erhölls några ägg, från vilka kläcktes 2 ♂♂ 7.10.49. Generatio tertia med konst frambragt. — *Cid. olivata* Schiff. 3 ex. juli 49. 1 ex. juli 50. — *Cid. pectinataria* Kn. Några ex. juli 49, 50. — *Cid. didymata* L. T. allm. 49, 50. — *Cid. suffumata* Schiff. 1 ♀ 6.6.50. — *Cid. derivata* Schiff. 1 ♀ på ljus 6.5.50. — *Cid. unangulata* Haw. 3 ex. juni 50. — *Cid. bilineata* L. (*Campylogramma* Steph.). T. allm. på dagen och på ljus 49, 50. — *Cid. silacea* Schiff. Några ex. maj och aug. 49, 50. — *Cid. corylata* Thnbg. 1 ex. 25.6.50. — *Cid. alternata* Müll. Flera ex. i juni och aug. 49, 50. — *Cid. rivata* Hb. Ej sälls. Rätt många ex. 49, 50 i juni. — *Cid. cucullata* Hufn. Flera ex. juli 49, 50. — *Cid. rubidata*. 1 ♀ på ljus 18.7.50. — *Cid. alchemillata* L. Några ex. i juni och aug. 49, 50. — *Cid. bifasciata* Haw. 1 ♀ 6.7.49. Ny för Bl.! — *Cid. albula* Schiff. Några ex. på ljus i juni 49, 50. — *Cid. furcata* Thnbg. Flera ex. på ljus juli 49, 50. — *P. comitata* L. Mycket allm. 49, 50. I sept. fann jag massor av larver på en planterad Iberis-art på min tomt. — *A. albula* Hufn. Flera ex. på dagen i juni 49, 50. — *Eup. linariata* F. Ett och annat ex. på ljus juli—aug. 49, 50. — *Eup. exigua* Hb. ♂ och ♀ 2.6.49. 1 ♀ 6.6.50. — *Eup. venosata* F. 1 ♀ 12.7.50. Några larver i nejlikor (*Silene nutans*) sommaren 50. — *Eup. centaureata* Schiff. 1 ♀ 14.8.49. 1 ♀ 11.8.50. — *Eup. intricata* Zett. 1 ♀ 30.6.49. — *Eup. denotata* Hb. 1 ex. Furs sanatorium 1942. — *Eup. pimpinellata*. 8 ex. 49, 50. — *Eup. satyrata* Hb. 3 ex. i juni 49, 50. — *Eup. absinthiata* Cl. 1 ♂ 2.8.50. — *Eup. goosensiata* Mab. 1 ♂ 20.7.50. 1 ♀ 1.8.50. — *Eup. vulgaris* Haw. 6 ex. i juni 49, 50. — *Eup. castigata* Hb. 3 ex. i juni 49, 50. — *Eup. icterata* Vill. Mycket allm. 49, 50. — *Eup. succentaurata* L. 3 ex. aug. 50. — *Eup. innotata* Hufn. Några ex. i juni. 1 ♀ 7.6.50 och ett par i aug. 49. — *Eup. sobrinata* Hb. Oerhört allm. juli—okt. båda åren. — *Eup. tantillaria* Bsd. T. allm. i en granskog 1 km från min stuga. — *Eup. lanceata* Hb. 2 ex. april 50. — *G. pumilata* Hb. 3 ex. maj, 1 ex. juli 49. — *Cl. rectangulata* L. Endast 1 ♀ 20.7.49. — *H. tersata* Schiff. 1 ♀ 19.7.49. — *A. melanaria* L. Flera ex. juli 49, intet 50. — *C. pusaria* L. Allm. i juni. 2 ex. 28.8.49. Tydligen en andra generation. — *C. exanthemata* Scop. 1 ex. på ljus 49, ett i Åbyholm juni 49 på dagen, 1 ♀ 19.8.49. Ävenledes en andra generation. — *O. sambucaria* L. 1 ♂ på ljus 22.7.50. — *Pl. dolobraria* L. 3 ex. juni 49, 50. — *E. fasciaria* L. 5 ex. juli 49, 50. — *En. alniaria* L. Allm. 49, 50. — *En. fuscantaria* Steph. 1 ♂ 14.9.49. Fyra ♂♂ och en ♀ aug. 50. — *En. erosaria* Schiff. Allm. 49, 50. — *S. bilunaria* Esp. Några ex. i maj 49, 50. Två ex. av f. *illunaria* Esp. aug. 50. — *S. lunaria* Schiff.

3 ex. juni 50. — *S. tetralunaria* Hufn. Flera ex. i maj 49, 50. 2 ex. 5.8.50 av den lilla sommargenerationen. — *Ph. syringaria* L. 1 ♀ på ljus 16.7.49. — *G. bidentata* Cl. T. allm. på ljus i juni 49, 50. — *Cr. elinguaria* L. 5 ex. juli 49, intet 50. Larver på blåbär i maj. — *A. prunaria* L. 5 ♂♂ på ljus 49, 50. 1 larv på vildapel maj 49. — *O. luteolata* L. Flera ex. på ljus juni 49, 50. — *E. vespertaria* F. Allm. i juli 49, 50. Även ♀♀ på ljus. — *L. chlorosata* Scop. Allm. i juni 49, 50. — *C. pennaria* L. Allm. 49, 50. — *S. notata* L. 1 ♂ 28.8.49, 1 ♂ 13.6.50. — *S. alternaria* Hb. Allm.! 1949. Intet ex. 50. — *S. signaria* Hb. 4 ex. 49, 50. — *S. liturata* Cl. 1 ♀ redan 8.5.49. Flera ex. juni—juli 49, 50. — *S. fulvaria* Vill. T. allm. juli 49. Intet ex. 50. — *Th. rupicapraria* Schiff. 1 ♂ 23.3.49. — *E. leucophaearia* Schiff. 1 ♂ 23.3.49. — *E. aurantiaria* Hb. T. allm. okt. 49, 50. — *E. defoliaria* Cl. Allm. okt. 49, 50. Varierar mycket. v. *obscura* Helfer ab. *Holmgreni* Lpa och ab. *obscurata* Stgr. — *E. marginaria* F. Flera ex. mars—april 49, 50. — *A. aescularia* Schiff. Flera ex. 49, 50. — *Ap. hispidaria* Schiff. 1 ♂ 23.3.49. — *L. hirtaria* Cl. Ett 10-tal ex. april—maj 49, 50. Flyger något senare än följande art. — *B. stratarius* Hufn. T. allm. april 49, 50. — *B. betularius* L. Larver t. allm. på björk och sälg. Intet fullbildat ex. taget. — *B. cinctaria* Schiff. Ej observerad 49. Allm. 1950. Larven rätt ofta på Galium. — *B. ribeata* Cl. 1 ♂ 7.7.49, 1 ♂ 21.7.50. — *B. repandata* Cl. Allm. i juli. Mest på lockbete. 2 ♀♀ av ab. *conversaria* Hb. — *B. roboraria* Schiff. Allm. juni—juli 49, 50. — *B. distortata* Goeze. T. allm. april—maj 49, 50. — *B. punctulata* Schiff. Flera ex. 50, intet 49. — *G. obscurata* Schiff. Allm. juli—aug. 49, 50. — *G. myrtillata* Thnbg. Allm. juli 49, 50. — *E. atomaria* L. Allm. på ljungmarker 49, 50. — *P. strigillaria* Hb. 1 ♀ på ljus 19.6.49. — *N. cuculatella* L. Allm. båda åren. — *R. strigula* Schiff. 1 ♂ 20.6.49, 1 ♂ 25.6.50. — *C. centonalis* Hb. Ett 10-tal ex. juli 49, 50. Ny för Bl.! — *N. mundana* L. Allm. 49, 50. Larv 30.5.49 å stenlavar. — *M. miniatia* Forst. Allm. 49, 50. — *Ph. irrorella* Cl. 1 ♂ på ljus 8.8.50. Ny för Bl.! — *C. mesomella* L. Allm. 49, 50. — *Oe. quadra* L. 4 ♂♂ aug. 50. — *L. deplana* Esp. 22.7.50 minst ett 30-tal ex. på ljus. Sedan ej observerad. — *L. lurideola* Zinck., *complana* L. och *lutarella* L. Allmänna juli—aug. 49, 50. — *D. mendica* Cl. 8 ♂♂ 10.5.50. 1 larv å blåbär Åbyholm aug. 49, kläckt 50. — *Sp. lutea* Hufn. och *lubricipedum* L. Mycket allmänna maj—juni 49, 50. — *Ph. fuliginosa* L. Allm. som larv. Stundom på ljus, särskilt andra generationen i juli. Alla ex. tillhörta *borealis* Stgr. — *D. sannio* L. Allm. på dagen och på ljus sent på kvällen, ungefär vid midnatt. Både huvudformen och formen *vulpinaria* L. Den senare allmänast. — *A. caja* L. Allm. på ljus 49, 50. — *C. cribraria* L. 1 ♂ på ljus 19.7.50. Mycket mörkt ex. — *A. meliloti* Esp. Endast 1 ♂ 10.7.49 «Sjöängen». — *Coch. limacodes* Hufn. 1 ♂ på ljus 20.7.50. — *Hep. humuli* L. 1 ♀ på ljus 13.6.50. — *Hep. fusconebulosus* Deg. 1 ♂ på ljus 10.7.50.

Intressantare fynd från andra delar av Blekinge, tidigare ej publicerade.

St. illicis Esp. Mörrum 17.7.46 sju ex. och 4.8.46 fyra ex. å blommande björnbär. — *C. argiolus* L. 1 ♂ 1.8.48. Karlskrona V. m.¹ Tydlig en 2:a generation. — *H. convolvuli* L. 1944 i sept. Karlskrona V. m. 2 ♂♂ å blommande tobak, 7 ♀♀ på ljus. En ♀ försökte jag förgäves få att lägga ägg. — *P. anceps* Goeze. Karlskrona V. m. flera gånger på ljus. — *D. chaonia* Hb. T. allm. de senaste åren i Karlskrona V. m. — *D. trimacula* Esp. 2 ♂♂ Karlskrona V. m., 2.6. och 15.6.47. — *N. phoebe* Sieb. Huvudformen, 1 ♂ 5.6.43 Karlskrona V. m. — *O. carmelita* Esp. 1 ♂ på ljus Karlskrona V. m. 15.5.47. — *D. pini* L. Karlskrona V. m. 1 ♂ 16.7.45. 2 ♂♂ 2.8.49. — *D. fuscelpina* L. Törnäkra, Jämjö s:n larv i april 48, kläckt 8.7. Trots en hel kvälls lockande med den nykläckta ♀ erhölls ingen ♂. Larver av denna art tagna även i Smål-, Vissefjärda s:n aug. 48. — *A. L-nigrum* Müll. 1 ♂ Karlskrona V. m. 5.7.45. — *H. derasa* L. (*pyritooides* Hufn.) var ej sälls. i Karlskrona V. m.

¹ V. m. = Västra Mark.

sommaren 43. På lockbete erhölls 6 ex. Ex ovo erhölls 3 ex. i okt. samma år. 2:a generation med konst frambragt. — *P. ridens* F. 2 larver Karlskrona V. m. samt en ♀ 14.5.47. En larv Nättraby, Skärva 2.6.49. — *P. coenobita* Esp. Karlskrona V. m. 2 ex., 27.7.44 och 15.7.46. En larv tagen i sept. 50 i Bergkvara, Kalmar län av min son Arne Wendel. — *E. linogrisea* Schiff. 1 ♀ å ljus 21.8.44 Karlskrona V. m. Ett ex. tidigare anmält från samma lokal. — *Cuc. scrophulariae* Cap. Karlskrona V. m. 1 ♂ 9.6.45. Larver dessutom i Gagnekulla och Allsjömåla i Rödeby s:n. — *Cuc. lychnitidis* Rbr. Karlskrona V. m. 1 ♂ 22.6.46. — *B. sphinx* Hufn. Karlskrona V. m. 1 ♂ 22.10.42. Larver vid Skärva i Nättraby s:n. — *D. areola* Esp. 2 ♂♂ på ljus 18 och 28.4.48. Karlskrona V. m. — *C. gilvago* Esp. 5 ex. Karlskrona V. m. 1942—47. — *A. pyramidea* L. Karlskrona V. m. 1 ex. å lockbete aug. 47, annars endast tagen som larv i Nättraby s:n men där mycket allm. både vid Skärva och Rosenholm. Larven oftast på hagtorn. — *P. illyrica* Frr. Karlskrona V. m. 5 ex. å blommande kaprifol 1941—45. — *P. literosus* Haw. Karlskrona V. m. i juli 1943 femton ex. Sedan ej tagen. — *E. ochroleuca* Schiff. 1 ex. å rödklint vid Hällevik å Listerlandet. — *E. cinerascens* Tngstr. Några ex. å ljus Karlskrona V. m. — *A. dissoluta* Tr. Förutom de två förut anmälda ex. av huvudformen ytterligare fyra ex. av denna tagna. Dessutom 3 ex. av v. *arundineta* Schmidt. Lokal: Karlskrona V. m. — *M. trigammica* Hufn. ab. *obscura* Tutt. Karlskrona V. m. 3.6.48 ♂. Ej förrapporterad från Sverige! — *Z. oo* L. Larver tagna vid Skärva i Nättraby s:n och Knösö, Lyckeby 1949. — *M. sponsa* L. Larver tagna på ek i Skärva, Nättraby s:n och på Knösö, Lyckeby 1949. Tre ex. kläckta. — *A. asclepiadis* Schiff. Ett ex. 15.7.45 Karlskrona V. m. Ett ex. tidigare anmält samma lokal. — *Br. notha* Hb. Ej sälls. Karlskrona V. m. Den flyger samtidigt och tillsammans med *parthenias*. Larven finner man stundom vid midsommartiden krypande på vägar och husväggar i och för förpuppning. Den har då mist den gröna färgen och har en mera rödviolett ton. — *Ph. pustulata* Hufn. Ej sälls. Karlskrona V. m. — *Ch. legatella* Schiff. Karlskrona V. m. 1 ♀ 14.10.44. — *Op. christyi* Prt. Ett gynandromorf ex. av denna art togs okt. 1945 Karlskrona V. m. Ex. befinner sig nu i Riksmuseum. — *A. efformata* Gn. Hällevik å Listerlandet. 2 ex. juli 43. — *Cid. picata* Hb. Ej sälls. Karlskrona V. m. — *Cid. luctuata* Schiff. 1 ex. Allsjömåla 4.7.44. — *Cid. biviria* Bkh. 1 ex. Karlskrona V. m. 21.6.41. — *Cid. corylata* Thnbg. Vissa år, såsom 1943, mycket allm. Karlskrona V. m. Den satt då överallt på trädstammar — även barrträden — i juni månad. — *Cid. lignata* Hb. 1 ♀ 7.6.49 Karlskrona V. m. — *Eup. linariata* F. Ej sälls. Karlskrona V. m. i 2 generationer. Även uppfödd från larvstadiet. Larverna tagna i Fridlevstad 1948. — *Eup. irriguata* Hb. Karlskrona V. m. 1 ex. juni 41. Rödeby 1 ex. juni 47. — *Eup. tripunctaria* HS. Karlskrona V. m. 2 ex., 42 och 43. — *Eup. denotata* Hb. Karlskrona V. m. 5 ex. juli—aug. under ett flertal år. — *Eup. conterminata* Zett. 1 ♀ 21.5.47 i Rödeby. — *B. pinarius* L. Karlskrona V. m. 3 ♀♀ 1942. Rödeby, 1 ♀ 42. — *A. rubricollis* L. Rätt allm. i Karlskronatrakten i ekdungar. Flyger stundom på dagen. Larven hittas på ek i aug.—sept. men är svår att föda upp. Där emot finner man ofta puppan under mossan på större stenar på våren. Den ligger i en gles lucker kokong. — *D. mendica* Cl. Liksom föregående hittas ofta puppan under mossan på stenar om våren. Kokongen är mera avlång och grårödhårig samt segare. ♀ flyger stundom om dagen. — *A. lonicerae* Schev. och *meliloti* Esp. Allmänna i Torhamn samt framförallt i Lyckebyåns dalgång, exempelvis i Augerum, Allsjömåla och Flymen. Väster därom sällsyntare. — *A. filipendulae* L. Ej allm. men tagen i några ex. i Augerum, Allsjömåla och Flymen samt i Svängsta i västra Bl. — *D. ichneumoniformis* F. Karlskrona V. m. 1 ex. 7.7.49 (A. Sundholm). Även tagen i Smål., Emmaboda aug. 48. — *C. cossus* L. Karlskrona V. m. allm.; larv ofta på hösten krypande på vägar och stigar. ♀ ett par gånger på ljus. Larven även tagen i Torhamn. — *Z. pyrina* L. Ej tagen i Bl., men 24.6.50 tog tandläkare Oscar Wigren ett par in copula. De kommo nedramlande från en flaggstång, när flaggan hissades midsommardagens morgon på hans sommarställe Kammarbo, Vissefjärda i Kalmar län.

Sune Wendel.