

## Smärre meddelanden och notiser.

### En för landet ny *Cucullia*-art.

#### I.

Den 25 juli i år (1950) tog jag vid ljusfångst i fönstret till min bostad i Kalmar en ♂ av en *Cucullia*-art, som jag omöjligen kunde identifiera med någon av de hittills kända svenska arterna av detta släkte. Exemplet avvek tydligt från alla i Svenska Fjärilar upptagna arter genom den grovt markerade streckningen i svart samt den överhuvud diffust brokiga teckningen å framvingarna. Det visade sig också vara en för landet ny art. Jag bestämde så småningom fjärilen efter Seitz' Die Gross-Schmetterlinge der Erde till *Cucullia fraudatrix* Ev. Bestämningens riktighet har sedermera välvilligt kontrollerats av fil. dr Frithiof Nordström.

En av dr Nordström given noggrann beskrivning av fjärilen med inplacering av arten i bestämningstabellen för *Cucullia* i Svenska Fjärilar följer nedan.

Arten har en starkt östlig utbredning. Enligt Seitz omfattar dess utbredningsområde östra Europa (Tyskland, Ungern, Galizien, Rumelien och Ryssland), Väst- och Ostturkestan samt Väst- och Östsibirien. I brev har emellertid dr Nordström meddelat, att fjärilen under de senaste åren visat en tendens att vidga sitt utbredningsområde in på västeuropeisk mark. Den har även, ehuru ytterst fåtaligt, anträffats i Fennoskandia (Östkarelen 1943; ön Hitis i sydvästra Finland 1947). Enligt uppgift i samma brev togs förra året ett exemplar av arten på så nära håll som vid Saltuna på Bornholm i Danmark. Därifrån är ej vägen lång till Skåne och det övriga Sverige. Då artens näringsväxt, *Artemisia vulgaris*, är allmän i vårt land, torde det ej vara omöjligt, att fjärilen så småningom blir bofast inom svenska landa-mären. Svenskt namn förslagsvis Gråbokapus chongfly.



Ett varmt tack uttalar jag till dr Nordström för kontrollbestämningen av exemplaret liksom för godhetsfullt lämnade uppgifter om artens nya spridningstendenser. Likaledes framföres ett hjärtligt tack till fotografen N. Gonnert för det av honom tagna i detta meddelande publicerade fotot av fjärilen.

Gösta Christiansson.

## II.

*C. fraudatrix* Ev. Vingform som hos *artemisiae*. Framv. ljust askgrå, mjukt schatterade med olivbrunt; rotstreck grovt, svart; inre tvärnlinjen olivbrun med svart inblandning, inåt ljuskantad, på  $Cu_2$  spetsvinkligt böjd mot bakkanten, som den ej når, yttre tvärnlinjen endast i fält  $Cu_2$ -Ax synlig som ett svart streck, ring- och njurfläckar stora, snett fyrkantiga, skilda av en brun skuggfläck, särskilt ringfläcken ljusare grå än grunden och dessutom utflytande i framkanten och mot bakkanten, bildande ett snett ljust band över framv.; våglinje bred, vitgrå, diffus, i fälten  $R_5$ - $M_1$ ,  $M_2$ - $M_3$  och  $Cu_2$ -Ax med kort och brett djupsvart streck, det mellersta dubbelt så långt som de båda andra; kantlinje fin, svart, avbruten vid ribbändarna. Bakv. som hos *artemisiae*. Vbr. hos detta exemplar 40 mm.

För att passa in den nya svenska arten i systemet i Svenska Fjärilar kan bestämningstabellen på sid. 138 ändras sålunda:

- — — — —  
 3. Framv:s ljusa våglinje avbruten av 3 svarta streck... 1 a. *C. fraudatrix*  
 — Framv:s våglinje, om sådan finnes, ej avbruten av svarta streck... 3 a  
 3 a. Ring- och njurfläckar täml. tydliga o. s. v. .... 4

Frithiof Nordström.

### *Anepia irregularis* Hufn i Kalmar.

Den 11 juli 1949 tog jag vid hävning på en backslänt i Kalmar, beväxten med bl. a. *Melandrium album*, ett ♂-exemplar av *Anepia irregularis* Hufn. Arten är mig veterligt förut blott känd i ett enda svenskt exemplar, taget av S. Torstenius i Vickleby på Öland den 4 juli 1947.

Fjärilen har beskrivits i Opusc. Ent. (Nordström 1947), där även foto av det första svenska exemplaret återfinnes.

För bestämning av exemplaret tackar jag hjärtligt fil. dr Frithiof Nordström.

Gösta Christiansson.

### *Depressaria impurella* Tr. (Lep. Tin.) ny för Sverige.

Av *D. impurella* Tr. infångades ett ex. (♀) vid Dammtorp, Nacka, Sdm den 18.5.1948. Enligt Spuler »Die Schmetterlinge Europas», där arten