

Notiser om sällsyntare skalbaggar.

Av

ULF NYLANDER

Leptinus testaceus Müll.

Den 17 juli 1948 togs ett ex. av arten tillsammans med några *Catops* ex. i en ihålig rot av en av de fridlysta ekarna i Halltorps hage på Öland.

Velleius dilatatus F.

Två ex. av *Velleius* togs den 30 juli 1948 på eksaft på en gammal ek vid Byxelkrok på Öland tillsammans med enstaka ex. av bålgeting, *Vespa crabro* L. Ett ex. anträffades i början av augusti på en ek vid Böda. Den 27 juli året därpå påträffades 2 ex. av arten i ett bålgetingsbo i en mindre, ihålig oxelstubbe vid Byrum.

Quedius curtipennis Bernh.

Av ovannämnda, rätt nybeskrivna art infångades ett ex. den 13 april 1947 vid Ekholmsnäs på Lidingö. Djuret befann sig under ett murket trästycke i en ekdunge.

Quedius tristis Grav.

Ett ex. av denna art togs i utflytande eksaft den 8 augusti 1948 vid Böda på Öland.

Hypebaeus flavipes F.

Vid slaghävning i undervegetationen i Halltorps hage erhöles ett ex. av *Hypebaeus flavipes* den 2 juli 1950. Den 3 juli 1951 togs ett ex. springande på gammal bokstubbe vid Hornsö i Småland.

Corynetes obenbergeri A. Janss.

Talrika ex. av *Corynetes obenbergeri* sågos krypande ut och in i gångar av troligen *Xestobium rufovillosum* De G. i en ihålig ek i Halltorp i slutet av juni 1951.

Elater Megerlei Lac.

Tillsammans med J. R. Bergvall och G. Dahlgren påträffade förf. den 6 juli 1949 2 ex. av *E. Megerlei* och ett flertal ex. av *Agonum Krynicki* Sperk. i en ögonblicket tidigare nedramlad större, murken ekgren, som hade vuxit högt uppe i en gammal ek i Halltorp. Knäpparen är ej tidigare anträffad i Sverige.

Elater cardinalis Schdte.

I början av juni 1948 infångades ett ex. av denna sällsynta urskogsinsekt på en gammal ek vid Ekholmsnäs på Lidingön. Den 16 till den 26 juli 1948 anträffades 3 ex. i spindelnät i en ihålig ek vid Böda på Öland. I en stor, murken ekstubbe i Halltorp insamlades med några ex. av bl. a. *E. Hjorti* Rye och *E. nigerrimus* Lac. ett ex. av *E. cardinalis* i slutet av juni 1951.

Procrærus tibialis Lac.

Två ex. av denna art togos på en gammal ek i Halltorp i slutet av juni 1951.

Athous rufus De G.

Några enstaka ex. under brädlappar i sågspånshög i Böda kronopark i slutet av juli och början av augusti 1947—1948. Trots ivrigt efterspanande sågos inga fler individ förrän den 28 juli 1951, då två ex. kröpo på sågspånen vid 21.30-tiden på kvällen. Den 5 augusti 1951, då det åskade och duggregnade på kvällen, sågos säkerligen ej mindre än ett tjugotal individ, som flögo eller kröpo på högen. Flera ex. av *Prionus coriarius* L. svärmade samtidigt.

Cartodere filum Aubé.

Den 11 december 1950 togs ett ex. av *C. filum* i en insektlåda på Lidingö.

Colydium filiforme F.

Av denna ytterst sällsynta urskogsinsekt, som i forna tider lär ha anträffats i de jättelika ekar, som vuxo nedanför Halltorps gård, och vars stubbar man ännu kan se, fann förf. några individ på en ek i Stockholmsområdet. Eken var av medelstorlek med ett stort stycke av barken borta. På denna del, som under eftermiddagarna var starkt solbelyst, fanns ett flertal hål av trädgnagande insekter. I dessa hål kröpo några ex. av *C. filiforme* ut och in. Första fyndet gjordes den 30 juni 1952. Det sist iakttagna ex. påträffades den 7 september. Trots ivrigt sökande efter arten på ekar i omgivningen påträffades inga individ på



Fig. 1. Fyndplats för *Colydium filiforme* F. Stockholm. Foto förf.



Fig. 2. Detalj av eken, på vilken *Colydium filiforme* togs. Foto förf.

andra ekar än den ovan beskrivna. Flera ex. av *Allecula morio* F. erhöles dock i utbyte av sökandet. Tillsammans med *C. filiforme* sågs flera ex. av *Hypophloeus fasciatus* F., som troligen har liknande levnadssätt.

Orchesia fasciata Ill.

Ett ex. togs den 22 maj 1947 på en al på Lidingö.

Anisoxya fuscata Ill.

Tre ex. av *A. fuscata* samt några ex. av *Tropideres sepicola* F., *Phloeotrya rufipes* Gyll. och *Conopalpus testaceus* Ol. anträffades vid slaghävning på ek och avenbok i början av juli 1951 i Halltorp.

Prionychus melanarius Germ.

Ett ex. av denna art togs i juli 1947 vid Byrum på Öland.

Osmoderma eremita Scop.

Denna art synes ha ett fast tillhåll i flera gamla ekar i ett begränsat område vid Böda på norra Öland. Flera ex. ha nämligen iakttagits från slutet av juli till mitten av augusti 1948—1951.

Obrium cantharinum L.

En puppa av denna art anträffades under barken av en stor stubbe av *Populus* den 20 juni 1952. Puppen kläcktes den 23 juni. Talrika rester av *Necydalis major* L. befunno sig i gångar i samma stubbe.

Pyrrhidium sanguineum L.

Fem ex. av *P. sanguineum* togs på ekstockar tillsammans med *Phymatodes alni* L., *Plagionotus detritus* L. och *P. arcuatus* L. samt *Xylotrechus antilope* Schönh. i början av juli 1951 i östra Småland. *X. antilope* var mycket vanlig 1951 över ett stort område från Hornsö till Strömserum. Tore Widenfalk har meddelat, att *X. antilope* var påfallande vanlig även 1949 men sällsynt 1950, varför man kan antaga att utvecklingstiden är två år.

Vid Strömserum förekommo ett flertal sandödlor, *Lacerta agilis* L., som vid denna tid kunde konstateras till stor del leva av *X. antilope* och *Agrilus sulcicollis* Lac.

Mesosa nebulosa F.

Ett ex. vid slaghävning i Halltorp den 10 juli 1951.

Saperda similis Laich.

Tre ex. av *S. similis* anträffades den 4 juli 1946 på en mindre sälg på Lidingö. Den 24 juni 1949 togs i närheten ett ex.

Saperda perforata Pall.

Arten synes vara tämligen utbredd över Lidingön, då de flesta påträffade för arten lämpliga yngelträd ha befunnits vara angripna av *S. perforata*.