

## Catalogus Insectorum Sueciae. XVI. Coleoptera (1960) Additamenta IV<sup>1</sup>

AV STIG LUNDBERG

### Rättelser

I mitt förra tillägg till skalbaggsdelen av Catalogus Insectorum Sueciae (Opusc. ent. 1968: 197—218) finns några felaktigheter, bl.a. har tre arter där upptagits för nytt landskap på grund av felbestämning. Då det är angeläget att dessa fel rättas, anföres de härnedan.

Sid. 201. 56: 8 *Acidota quadrata* utgår för Sk; felbestämd.

Sid. 202. 62: 5 *Stenus ater* utgår för Nb; felbestämd.

Sid. 204 står 82: 42 *Hygronoma dimidiata* Gr., skall vara *Encephalus complicans* Westw.

Sid. 205. 92: 35 *Atheta islandica* utgår för Vg; felbestämd.

Sid. 206 står 100: 11 *C. lapponica*, skall vara 100: 10.

### För Sverige nya eller strukna arter

Sedan jag i Opusc. ent. 1966: 171—177 redovisade för landet nytillkomna och strukna arter, har åtskilligt nytt tillkommit. Sålunda har över 100 för Sverige nya arter rapporterats. I ett stort antal fall har namnändringar gjorts av en eller annan orsak. Dessa ändringar har här endast undantagsvis medtagits, t.ex. då en art nybeskrivits. Huvuddelen av ifrågavarande namnändringar återfinnes f.ö. i Ent. Meddr. 1970: 223—252 och Norsk ent. Tidskr. 1970: 125—145.

Nyfynden har i vissa fall redan förut publicerats, i andra fall kommer de att närmare redovisas i annat sammanhang. Jag har i fråga om de sistnämnda fynden inhämtat vederbörandes tillstånd att för fullständighetens skull ta med dem här. Fynd av tillfällig natur har markerats med T.

Till samtliga rapportörer riktas ett varmt tack. Dessutom tackar jag H. Franz, Victor Hansen, G. A. Lohse, Andreas Strand och V. Puthz för bestämningshjälp, Thure Palm för beskrivningen av den nya *Quedius*-arten och Hans Silfverberg för lånet av *Mordellistena »pseudonana»*.

<sup>1</sup> Tre tillägg till Catalogus Insectorum Sueciae. XVI. Coleoptera (1960) har tidigare publicerats, det första av Einar Klefbeck (Opusc. ent. 27: 153—174), de två andra av Stig Lundberg (Opusc. ent. 31: 171—177 och 33: 197—218). Dessa tillägg bör betecknas Additamenta I resp. II och III. Red.

Följande arter har sedan föregående rapport tillkommit eller strukits:

### Carabidae

#### *Bembidion quadripustulatum* Serv.

Denna för Norden nya art har påträffats i Sk i anslutning till vinddrift i juli 1971 dels av R. Baranowski vid Sandhammaren dels av A. Dufberg vid Falsterbo (in litt.). T.

#### *Tachys bistriatus* Dft.

Tagen i ett ex. 6.4.1967 vid Bjärka-Säby i Ög av T. E. Leiler (in litt.).

#### *Patrobis australis* J. Sahlb.

Några ex. tagna i mangelgrav i sydöstra Sk 1969 av R. Baranowski (in litt.).

#### *Badister anomalus* Perr.

Först rapporterad av R. Baranowski från Sk (Opusc. ent. 1969: 135—136). Sedan funnen även på andra platser i Sk och på Öl (Baranowski in litt.).

#### *Amara crenata* Dej.

Ett ex. taget i vinddrift i Sk vid Vitemölla 20.6.1969 av R. Baranowski (in litt.). T.

#### *Pterostichus metallicus* F.

Ett ex. taget vid Rödeby i Bl av K. Pedersen. Exemplaret förvaras i Lunds Museum.

#### *Dromius quadraticollis* Mor.

Ett dött ex. påträffat i vinddrift vid Stenshuvud i Sk 1969 av R. Baranowski (in litt.). T.

#### *Dromius quadrisignatus* Dej.

Tagen i Sk, Falsterbo i flera ex. Först rapporterad av A. Dufberg (Opusc. ent. 1969: 131—132).

### Dytiscidae

#### *Hydroporus figuratus* Gyll. (*eljasi* Wirén)

I Opusc. ent. 1968: 114—118 beskrev E. Wirén *H. eljasi* såsom ny art. Enligt finska undersökningar har denna art tidigare beskrivits av Gyllenhal under namnet *H. figuratus* (Notul ent. 1968: 247). Arten är hittills rapporterad från Jmt.

#### *Hydroporus levanderi* J. Sahlb.

Påträffad av T. B. Engelmark i Lu Lpm och av L. Huggert i Vb (in litt.).

*Hydroporus picicornis* J. Sahlb.

Tagen av Wirén i T Lpm, Abisko-trakten 1965 och i Lu Lpm av S. Persson 1966. Senare påträffad på flera lokaler (Wirén, Opusc. ent. 1968: 118).

*Hydroporus tomentosus* Popp.

Rapporterad av Wirén från Hjd (Opusc. ent. 1968: 118).

*Agabus setulosus* J. Sahlb.

Först rapporterad av S. Persson från Lu Lpm, där den även tagits av T. B. Engelmark och förf. Dessutom funnen i T Lpm av L. Huggert (Huggert och Ulefors, Ent. Tidskr. 1971: 55).

## Hydrophilidae

*Helophorus strandi* Angus

Tagen i Lu Lpm och NB av förf. Dessutom rapporterad av L. Huggert från T Lpm (förf., Ent. Tidskr. 1969: 213 under namnet *H. bergrothi*). Arten är nyligen beskriven av Angus i Entom. scand.

## Silphidae

*Choleva jeanneli* Britten

Tagen i ett ex. i Sk, Kullen av A. Carlsson 1970 (in litt.).

*Colon cordigerum* Szym.

Det svenska materialet av *S. delarouzei* Tourn. har visat sig vara *C. cordigerum*, nyligen beskriven från Mongoliet (Szymczakowski, Ent. Bl., 67: 57—60). *C. delarouzei* är dock känd i ett exemplar från Norge, varför den bör finnas i Sverige. *C. cordigerum* har senare visat sig vara synonym med *C. curvipes* Mäkl.

## Liodidae

*Liodes nigrita* Schm.

Tagen i två ex. i Sk, Härröd 2.10.70 av R. Baranowski (in litt.).

## Scydmaenidae

*Veraphis engelmarki* Franz

Denna för vetenskapen nya scydmaenid har tagits i flera ex. i Lu Lpm vid Suobbat av T. B. Engelmark och beskrivits av H. Franz i Eos 1971: 57—84.

*Neuraphes rubicundus* Schaum

Ett *Neuraphes*-ex., taget 11.10.1970 av Kurt Persson vid Klöverträsk i Nb, har av H. Franz (Wien) konstaterats vara *N. rubicundus*, närmast känd från Mellaneuropa.



*Stenichnus harwoodianus* Will.

Först rapporterad av F. Olsson från Sk (Israelson, Ent. Tidskr. 1971: 66). Även tagen på Öl (J. R. Bergvall), i Upl och Sdm (förf.). Sammanblandad med *S. pusillus*, som hittills med säkerhet endast är känd från Öl (N. Bruce) och Gotl (förf.).

*Euconnus pragensis* Nack

Hittills funnen i Hall, Sm, Öl, Sdm, Upl, Dlr och Nb; har varit sammanblandad med *E. claviger* Müll. (förf., Ent. Tidskr. 1969: 213).

## Ptiliidae

*Ptilium affine* Er.

Påträffad i ett ex. vid Halltorp på Öl av L. Huggert 1970 (in litt.).

*Ptiliolum brevicolle* Matth.

Vid genomgång av material i I. B. Ericssons samling på Göteborgs museum har Besuchet påträffat exemplar av denna art tagna i Vg.

*Pteryx splendens* A. Str.

Denna från Norge och Finland kända art har vi letat efter kanske främst i Norrland. Vid genomgång av material taget 15.8.1963 i Halltorps hage på Öl påträffades ett exemplar av *Pteryx*, som visade sig vara *splendens*. Bestämningen har kontrollerats av Victor Hansen (leg. förf.).

*Acrotrichis insularis* Mäklin

Funnen i Hall och Vg av G. Gillerfors 1971 (in litt.).

## Scaphidiidae

*Scaphosoma balcanicum* Tamanni

Funnen i Sk, Ög och Gstr (Palm, Ent. Tidskr. 1966: 43).

*Scaphosoma inopinatum* Löbl.

Tagen i Sk av G. Israelson (Ent. Tidskr. 1971: 66).

## Staphylinidae

*Thinobius pusillimus* Heer

Denna för Norden nya art har påträffats i stort antal i Nb vid Persön 1969 av K. Persson (förf., Ent. Tidskr. 1972: 43).

*Trogophloeus heidenreichi* Bck

Flera ex. tagna i Vg på Hisingen 1970 av L. Huggert (in litt.).

*Bledius denticollis* Fauv.

Tagen i Vg vid Borås av G. Svensson (förf., Ent. Tidskr. 1969: 213).

*Stenus ampliventris* J. Sahlb.

Tagen i 3 ex. 6.6.1971 i samband med vårfloden vid stranden av Kalix älv intill Tärendö i Nb (förf.). Ett ex. har kontrollerats av V. Puthz. I och med detta är samtliga nordiska *Stenus*-arter utom *S. picipennis* Steph. (känd från Danmark) konstaterade i Sverige.

*Stenus audax* J. Sahlb.

Tagen i Lu Lpm, Vietas av B. Ehnström, de första exemplaren 1967 (in litt.).

*Stenus kongsbergensis* Munst.

Tagen på Haparanda Sandskär i Nb (förf., Ent. Tidskr. 1972: 43).

*Stenus receptus* Bck

Utgår; synonym med *S. proditor* Er. (förf., Ent. Tidskr. 1968: 69—70).

*Hypomedon debilicornis* Woll.

Denna för Norden nya art har påträffats i några ex. i en komposthög i Upl, Stockholm. Det första togs 17.9.1971 av Anders Petrelius (in litt.).

*Philonthus astutoides* A. Str.

Upl, Uppsala 24.8.1963 (Palm, Ent. Tidskr. 1966: 45—46). Även tagen i Sdm, Södertälje 1969 av R. Baranowski (in litt.) och i Vstm 1965 (förf.).

*Philonthus pseudoparcus* Brunne

En *Philonthus*-art tagen i Norge av Andreas Strand och i Hall av Gösta Gillerfors kommer att beskrivas under namnet *pseudoparcus* av G. Brunne (Hamburg).

*Philonthus toxotes* Joy

Först påträffad i Hall vid Varberg av G. Gillerfors 1966 (in litt.). Dessutom tagen på Haparanda Sandskär i Nb 1970 av förf.

*Quedius lundbergi* Palm

Denna för vetenskapen nya art har dels tagits av förf. i Nb vid Kalix 1.8. 1967 dels erhållits i ljustfälla vid Messaure i Lu Lpm 1.9.1971 (Karl Müller). Arten har beskrivits av Thure Palm i Ent. Tidskr. 1972: 183—185.

*Conosoma marshami* Steph.

Har konstaterats från Sk (G. Israelson), Sm, Upl och Nb (förf.) samt Vstm (O. Robin).

*Conosoma strigosum* J. Sahlb.

Funnen på G. Sandön, i Upl, Hls och Nb (samtliga förf.).

*Tachyporus quadriscopulatus* Pand.

Sk, Hässleholm (Israelson, Natur i Göinge 1966: 27); ursprungligen rapporterad som *T. signifer* Pand.

*Hypocyptus hanseni* Palm

Tagen i Sk, Haväng i ett exemplar 31.10.1970 av R. Baranowski (in litt.).

*Myllaena hyperborea* A. Str.

Anmäld från Lu Lpm, där det första exemplaret togs av T. B. Engelmark 1966. Dessutom påträffad i T Lpm, bl.a. i Vittangi (förf.) och i Nb av S. O. Ulefors (förf., Ent. Tidskr. 1968: 244).

*Gyrophaena rousi* Dvorak

En *Gyrophaena*-art, tagen i två ex. 7.7.1971 vid Etelhem på Gtl av Gösta Gillerfors, har av Andreas Strand konstaterats vara denna tidigare endast från Slovakien kända art (in litt.).

*Falagria concinna* Er.

Denna för Norden nya art har påträffats i stort antal i Nb, Harads (förf., Ent. Tidskr. 1972: 46).

*Schistoglossa bergvalli* Palm

Nyligen beskriven på material från Jmt, taget av J. R. Bergvall 1967 (Palm, Ent. Tidskr. 1968: 248—249). Dessutom funnen i Vb av S. O. Ulefors.

*Atheta amplicollis* Muls. & Rey

Påträffad i flera exemplar vid Ripa i Sk 1970 av R. Baranowski (in litt.).

*Atheta clavigera* Scriba

Denna för Norden nya art av undersläktet *Rhopalocerina* har slaghåvats i totalt 4 ex. 1968—1970 i Revsund, Jmt av J. R. Bergvall (förf., Ent. Tidskr. 1969: 213). Arten anses numera tillhöra ett självständigt släkte.

*Atheta convergens* A. Str.

Sanmmanblandad med *A. obfuscata* Gr. Känd från följande landskap: Sk, Sm, Öl, Gotl, Upl, Dlr, Med, Ång, Vb, Nb och Lu Lpm, medan *A. obfuscata* hittills endast är känd från Sk (G. Israelson) och Hall (G. Gillerfors).

*Atheta glabriculoides* A. Str.

Hittills endast känd i ett ex. från Sverige taget 13.9.1968 på ruttande svamp i Barkaby, Upl (förf., Ent. Tidskr. 1969: 214).

*Atheta hanseni* A. Str.

Flera ex. tagna på duvspillning, de första 19.8.1971 vid Dagsås i Hall av G. Gillerfors (in litt.).



*Atheta obscurior* G. Bnk

Arten har nybeskrivits efter bl.a. ett ex. taget av Palm 12.6.1933 i Vrm vid Klarälven (Benick, Ent. Bl., 65: 166—167).

*Atheta parens* Muls. & Rey

Tagen på G. Sandön i ett ex. 7.11.1967 av förf. (Ent. Tidskr. 1972: 49).

*Atheta pertyi* Heer

Tagen dels i Sm vid Bergkvara i flera ex. 12.8.1971 av Roy Danielsson dels på Öl vid Borgholm 24.9.1971 av Gösta Svensson. Bestämningen har i båda fallen kontrollerats av Victor Hansen.

*Atheta platonoffi* Brd.

Första exemplaren tagna 3.8.1966 av B. Ehnström i Vietas, Lu Lpm. Senare funnen på ytterligare lokaler i Lu Lpm (förf.) samt i T Lpm och i Nb av L. Huggert och S. O. Ulefors (förf., Ent. Tidskr. 1969: 214).

*Atheta tenella* Mannh.

Har rapporterats från Sk av G. Israelson (Ent. Tidskr. 1971: 67), men bestämningen har visat sig vara felaktig, varför arten utgår (in litt.).

*Lomechusa welleni* Palm

Flera ex. från Nb, Överkalix-trakten (förf.) och Björkfors vid Kalix (S. E. Nilsson) (förf., Ent. Tidskr. 1969: 214).

*Amarochara bonnairei* Fauv.

Utgår för Sverige, då exemplaret i fråga har visat sig vara *Aleuonota gracilenta* Er. (Palmqvist in litt.).

*Deubelia picina* Aubé

Tidigare från Sverige rapporterade fynd från Sk och Ås Lpm har visat sig vara *Ocyusa longitarsis* Thoms. (*hibernica* Rye). Dock funnen i flera ex. i Kalix, Nb (förf., Ent. Tidskr. 1969: 215—216).

*Oxypoda strandi* Scheerp.

Först rapporterad från T Lpm och Nb (förf., Ent. Tidskr. 1968: 245). Även tagen i Ly Lpm (B. Persson).

*Stichoglossa semirufa* Er.

Utgår; felbestämd (förf., Ent. Tidskr. 1969: 220).

*Aleochara albovillosa* Bernh. och *diversa* J. Sahlb.

Flertalet fynd av *A. diversa* har visat sig vara en nybeskriven art *A. albovillosa*, medan *A. diversa* i Sverige endast är känd från Ög (leg. T. Palm).

*Aleochara cuniculorum* Kr.

Tagen i Sk i ett exemplar 1970 av L. Huggert (in litt.).

*Aleochara peeziana* Lohse

Rapporterad från Sk av G. Israelson, från Sm av G. Dahlgren samt från Jmt av J. R. Bergvall (Dahlgren, Ent. Tidskr. 1969: 158—160).

*Aleochara stichai* Likovsky

Tagen i Ög och Dlr av T. Palm (Ent. Tidskr. 1967: 111) samt i Vstm av förf. och i Upl av J. Höjer.

## Pselaphidae

*Biblopectus minutissimus* Aubé

Ett ex. taget av B. Ehnström i Fjärås Bräcka, Hall 24.9. 1970 (in litt.).

*Bythinus gracilipes* Raffr.

Flertalet fynd av *B. puncticollis* Denny (*validus* Aubé) torde hänföra sig till *B. gracilipes*. Säkra exemplar finns från Sk, Sm, Öl, Ög, Upl, Vb, Nb och Ly Lpm. Anses av Besuchet endast vara en varietet.

## Histeridae

*Hister terricola* Germ.

Ett exemplar påträffat 2.6.1971 under en död koltrast i Sk, Lund av Roy Danielsson (in litt.).

## Dasytetidae

*Phloeophilus edwardsi* Steph.

Ett ex. taget vid lampfångst 20.9.1967 av M. Idar på Öl (in litt.).

## Eucnemidae

*Nematodes filum* F.

Utgår för Sverige, då exemplaret från Vg visat sig vara *Hypocoelus fleischeri* Olexa (Palm, Opusc. Ent. 1969: 160). Denna art måste byta namn och nu heta *H. foveicollis* Thoms.

## Buprestidae

*Dicerca aenea* L.

Svenska ex. från Sk finns dels i Thomsons dels i E. Wiréns samling (förf., Ent. Tidskr. 1972: 49).



*Dicerca berolinensis* Hbst

Svenska beläggsexemplar saknas, varför arten bör utgå för Sverige (förf., Ent. Tidskr. 1972: 50).

## Dermestidae

*Reesa vespulae* Milliron

Införd från Amerika. Tagen i några exemplar i Sdm, Stockholm av G. Sjödin (in litt.).

*Trogoderma angustum* Sol.

Funnen införd i Upl, Stockholm (coll. Lundberg).

*Anthrenus olgae* Kalik

Tagen i flera ex. inomhus i Upl, Stockholm, säkerligen införd (Ehnström och Baranowski).

*Anthrenus fuscus* Ol.

Har ansetts införd i Sverige men förekommer allmänt i det fria vid Halltorp, Öl (förf., Ent. Tidskr. 1971: 288).

## Nitidulidae

*Brachypterus fulvipes* Er.

Ett ex. slaghåvat 3.6.1965 i Upl vid Barkaby intill Stockholm av förf. Arten är ny för Norden. Bestämningen är gjord av K. Spornraft.

*Meligethes gagatinus* Er.

Tagen på Gtl (N. Linnman) och i Sk (Israelson, Ent. Tidskr. 1971: 67).

*Carpophilus marginellus* Motsch.

Funnen i komposthög i Vg, Borås i tre ex. av G. Svesson 1971 (in litt.).

*Epuraea fuscicollis* Steph.

Funnen dels i Sk (G. Gillerfors och L. Huggert in litt.), dels i Sm (L. Huggert).

*Epurea sileciaca* Rtt.

Ett exemplar taget i Luleå, Nb 14.6.1969 (förf., Ent. Tidskr. 1972: 50).

*Pocadius lanuginosus* Franz

Nyligen utbruten ur *P. ferrugineus* F. Konstaterad från Sk, Sm och Öl (Israelson, Ent. Tidskr. 1971: 68).

## Cucujidae

*Ahasverus advena* Waltl

Har visat sig förekomma utomhus året runt i komposthögar dels i Nb dels i Sk, varför arten åtminstone för dessa landskap bör markeras med fylld cirkel.

## Cryptophagidae

*Cryptophagus micaceus* Rey

Har tidigare ansetts vara en varietet av *C. pubescens* Sturm. Konstaterad från Sdm och Sk (R. Baranowski), Vstm och Öl (förf.) samt Sm (T. E. Leiler).

*Cryptophagus obsoletus* Rtt.

Ett *Cryptophagus*-ex., som tagits i en komposthög i Upl, Stockholm 26.2. 1972 av Gunnar Sjödin, visade sig vara den för Norden nya *C. obsoletus* (det. förf.). Bestämningen har kontrollerats av Victor Hansen.

*Atomaria norica* Gangl.

Tagen i Vstm och Lu Lpm av förf. och i Dlr av B. Ehnström (förf., Ent. Tidskr. 1969: 216).

*Atomaria pseudaffinis* Strand & Johnson

Funnen i Upl och Nb (förf.), Dlr (B. Ehnström) samt Vb och Ly Lpm (L. Huggert) (förf., Ent. Tidskr. 1969: 216).

*Atomaria scutellaris* Motsch.

Tagen på Gtl enligt C. Johnson (in litt.).

## Lathridiidae

*Lathridius kokujevi* Sem.

Funnen i Sk, Sm, Öl, Sdm och Upl (förf., Ent. Tidskr. 1969: 216).

*Adistemia watsoni* Woll.

Två ex. insamlade inomhus i Danderyd, Upl 1961 av förf. Bör betraktas som införd. (Ent. Tidskr. 1972: 50).

## Colydiidae

*Anommatus diecki* Rtt.

Ett ex. sållat utomhus 3.11.1967 i Upl, Stockholm av förf. (Ehnström och förf., Ent. Tidskr. 1968: 71—73).

*Anommatus 12-striatus* Müll.

Några ex. sållade 1967—68 i Stockholm (Ehnström och förf., Ent. Tidskr. 1968: 71—73).

## Coccinellidae

*Scymnus stiglundbergi* Fürsch

I Catalogus upptagen under *S. impexus* Muls. för Vstm. Har visat sig vara en nov.sp. och har påträffats även i Sdm (Fürsch, Ent. Tidskr. 1969: 55—56). *Scymnus impexus* har emellertid utplanterats i Sm och Ög varför denna art bör införas med »i» för dessa landskap.

*Harmonia octomaculata* Thunb.

Ett dött ex. taget i vinddrift i Sk vid Vitemölla 21.6.1969 av R. Baranowski (in litt.). Arten är »ny» för Europa. T.

*Exochomus flavipes* Thbg

Erhållen i stort antal på klockljung i Hall (G. Gillerfors in litt.) och Vg (L. Huggert).

## Ciidae

*Cis glabratus* Mell.

Har tidigare varit sammanblandad med *C. nitidus* F. och *C. Jacquemarti* Mell. Konstaterad i Bl, Vg, Upl, Vstm, Vrm, Dlr, Vb och Nb.

*Rhopalodontus strandi* Lohse

Denna nybeskrivna art har hittills konstaterats från följande landskap: Sm, Upl, Hls, Nb samt Lu Lpm (förf.).

## Anobiidae

*Xyletinus suecicus* Lundberg

Denna nybeskrivna art är hittills endast känd från Haparanda Sandskär i Nb (förf., Ent. Tidskr. 1972: 57).

*Xyletinus vaederoensis* Lundberg

Hittills endast känd från Sk, Hallands Väderö, där den tagits av O. Lundblad (förf., Ent. Tidskr. 1969: 211—212).

*Theca borealis* Israelson

Det svenska materialet av »*Theca pilula* Muls.» har visat sig vara en nov.sp., som nyligen beskrivits av G. Israelson (Ent. Tidskr. 1971: 69—71).

## Oedemeridae

*Nacerda adusta* Panz

Ett ex. infångat av T. Widenfalk 4.7.1962 i Sk, Landskrona (in litt.).



## Aderidae

*Aderus brevicornis* Perris

Tagen på Hallands Väderö av O. Lundblad. Har tidigare publicerats som *A. pentatomus* Th. (Israelson, Ent. scand. 1, 1970: 21—29).

## Anthicidae

*Anthicus tobias* Mars.

Tagen i Sk vid Malmö av F. Olsson 1970 (in litt.).

## Rhipiphoridae

*Rhipidius quadriceps* Ab.

Erhållen sommaren 1970 i ett ex. i Kärrbo, Vstm av M. Idar (in litt.).

## Mordellidae

*Mordellistena connata* Erm.

Tagen av B. Ehnström vid Omberg i Ög 1968 i två ex. (in litt.).

*Mordellistena pseudonana* Erm.

I Notul ent. 1971: 134 anmäld som ny för Norden efter ett ex. taget på Gtl 21.6.1935 av W. Hellén och bestämt av Ermisch. Jag har haft tillfälle studera exemplaret och något misstag måste föreligga, då det är en hane av *M. parvula* Gyll. Arten bör enligt min mening tillsvidare icke uppföras för Sverige.

## Alleculidae

*Cteniopus murinus* Hbst

Den 12.7.1971 togs ett ex. av Bertil Sandgren vid Hornsö i Sm av denna som underart till *C. flavus* Scop. ansedda form. Enligt G. A. Lohse, som utfört bestämningen, är den säkerligen artsbild.

## Cerambycidae

*Anaesthetis testacea* F.

Hittills endast konstaterad i Emmaboda-trakten i Sm, först av G. Dahlgren (Ent. Tidskr. 1964: 169).

## Chrysomelidae

*Cryptocephalus aureolus* Suffr.

G. Dahlgren har konstaterat, att samtliga sydsvenska till *aureolus* bestämda ex. är *C. sericeus* L. Det enda landskap, som återstår för *C. aureolus* är således Nb (in litt.).

*Melasoma 20-punctata* Scop.

Erhållen i vinddrift i Sk 1971 av A. Dufberg (in litt.). T.

*Galeruca melanocephala* Ponza

Tagen i tre ex. i Ekens skärgård i Vänern, Vg redan 1958 av H. Lohmander (Göteborgs museum).

## Anthribidae

*Tropideres albirostris* Hrbst.

I E. Wiréns samling finns två ex. märkta »Scania» av denna från Norden i övrigt okända art (in litt.).

## Curculionidae

*Apion flavimanum* Gyll.

Tagen på Persö i Sdm skärgård 1967 (förf. och F. Olsson, Ent. Tidskr. 1968: 74—75).

*Apion sicardi* Dsbr.

Har konstaterats i Sk av G. Israelson 1970 (in litt.).

*Trachyploeus heymesii* Hub.

Funnen i Sk, Öl, Gtl och Ög (förf. och F. Olsson, Ent. Tidskr. 1968: 75).

*Grypus atrirostris* F.

Har visat sig vara en varietet av *G. equiseti* F. (förf., Ent. Tidskr. 1969: 226).

*Smicronyx jungermanniae* Reich.

Utgår för Sk, men har påträffats i Hall, Öl och Gtl (förf., Opusc. ent. 1967: 230—232).

*Smicronyx politus* Thoms. (*smreczynskii* Solari)

Funnen i Sk redan av Thomson. Återfunnen av G. Israelson (förf., Opusc. ent. 1968: 323).

*Phytonomus viduus* Gené

Tagen i ett ex. på Fårön, Gtl av F. Olsson (in litt.). Ny för Norden.

*Ceuthorrhynchus gallorhenanus* Solari

Upptäckt av G. Israelson på Gtl (Ent. Tidskr. 1971: 71—72). Dessutom funnen på G. Sandön (förf.).

*C. hampei* Bris.

Tagen i Upl, Stockholm (Ehnström, Ent. Tidskr. 1968: 66).

*C. ignitus* Germ.

Funnen i Sk, Sm, Öl, Sdm och Upl (Ehnström, Ent. Tidskr. 1968: 66).

*C. molitor* Gyll.

Utgår för Sverige (förf., Ent. Tidskr. 1969: 228).

*C. pervicax* Weise

Funnen i Sk av R. Baranowski 1968 (in litt.).

*C. puncticollis* Bohem.

Tagen i Sk (förf. och F. Olsson, Ent. Tidskr. 1968: 76). Ny för Norden.

## Scolytidae

*Hylurgus ligniperda* F.

Tagen i ett ex. i Sk av K.-J. Hedquist (in litt.).

*Hylastes scandinavicus* Lekander

Det svenska till *Hylastes attenuatus* Er. bestämda materialet har visat sig vara en nov.sp., beskriven av B. Lekander i Ent. Tidskr. 1965: 196—201.

Antalet från Sverige kända skalbaggsarter uppgår i och med detta tillägg till 4258.