

Smärre meddelanden och notiser

Anteckningar om *Poecilopsis pomonaria* Hb. (Lep. Geometridae)

Notes on *Poecilopsis pomonaria* Hb. (Lep. Geometridae)

Poecilopsis pomonaria Hb. har länge betraktats med stor respekt av samlare. Arten har sällan tagits som imago. Däremot har larver blivit funna vid flera tillfällen. Följande iakttagelser av *pomonaria* är gjorda i fjällbjörkskogsområdet kring Kiruna och Stenbacken, Torne träsk (TLpm) dels 1963 (5—11 maj), dels 1975 (8—11 maj). Arten har här visat sig vara tämligen allmän. Den har säkerligen tidigare blivit förbisedd genom den tidiga flygtiden. Denna inföll vid bägge tillfällena i samband med intensiv snösmältning. *P. pomonaria* är tillsammans med *Polyplocia flavicornis* L. och *Eriogaster lanestris* L. de tidigaste nattflygande storfjärilarna i fjällbjörkskogen. Dessa arter flyger trots att uppskattningsvis 50 % av marken är täckt av snö.

Hanarna flyger klara kvällar med sol från ungefär kl. 20.00 till åtminstone kl. 23.00. Den största flygaktiviteten tycks infalla vid kl. 21.00 strax före solens nedgång. Nätterna är emellertid så pass ljusa, att hävning utan svårighet kan bedrivas nattetid. Kalla kvällar, då temperaturen snabbt sjunkit till minusgrader, minskar flygaktiviteten. Men även då termometern visat -2° C, har enstaka flygande hanar observerats så sent som kl. 22.15. Hanarnas flykt är rak och rätt snabb på ca 1,5—2 m höjd. De vinglösa honorna är däremot mycket svåra att finna i den risiga undervegetationen och på björkar.

P. pomonaria har stora likheter i uppträdandet med *Poecilopsis lapponaria* B., som också anträffats i fjällbjörkskogen, men denna är en senare art.

Den kända förekomsten av *pomonaria* i Sverige är huvudsakligen begränsad till de norra delarna (TLpm, LyLpm, ÅsLpm, Nb, Vb) men ett fynd från Sm av en flygande hane och ett honfynd från Gstr samt äldre osäkra larvfynd från Dlr tyder på en större utbredning i landet. Lämpliga biotoper söderut torde, liksom för *lapponaria*, vara moss- och myrmarker med glesa trädbestånd. I Mellaneuropa förekommer *pomonaria* lokalt i bl.a. mindre täta lövskogar, trädgårdar och parker.

Göran Palmqvist

Smedvägen 15, S-136 44 Handen, Sweden

Rättelse

I förteckningen över nya landskapsfynd av skalbaggar i Entomologisk Tidskrift 96: 65—67 upptas *Notiophilus pusillus* Wat. som funnen i Lycksele lappmark. Detta meddelande är emellertid oriktigt. Exemplet i fråga har kontrollerats av prof. Carl H. Lindroth och därvid visat sig vara *N. palustris* Duft.

Birger Persson

Pl 6035, S-921 00 Lcksele, Sweden