

# DAGFJÄRILSFAUNAN PÅ EN FLÄCK AF MELLERSTA SKÅNE

ANTECKNAD

AF

C. LINDEQUIST.

Då man följer södra stambanan från Malmö uppåt, inträder man i den egentliga skogstrakten först vid Stehags station, i hvars närhet Skånes vackraste insjö, Ringsjön, är belägen. Fortsättes färden från Stehag åt Billinge längs Ringsjöns utlopp, Rönneå, så anländer man efter en half mils resa till Rönneå, en mindre egendom belägen vid nämnda å och utgörande medelpunkten för det område af omkring en half kvadratmils yta, som dessa två sistförflutna år blifvit undersökt rörande *Dagfjärilsfaunan*.

Trakten är i botaniskt hänseende renommerad såsom synnerligen rikhaltig och har noga blifvit undersökt af N. LILJA, hvilken här lefde och dog som klockare i Billinge pastorat. Vidsträckta mossar omvexla med yppiga mader och buskmark; lum-miga ek- och bokdungar kranza leende skogsängar, tätare och glesare bevuxna med allehanda andra sorter löfträd; sura myrar och kärr aflösas af vilda, steniga och enbevuxne så kallade ljun-gfåladar. Sandstenslager komma i dagen vid Wittseröds bekanta quarnstensbrott. Sand- och grusmark omskifta med stora åkerfält af den feta skånska lerjorden på mergelbotten. Sålunda finner man lokalen vara nog vexlande, och att den är rik på dagfjäril-arter, skall af efterföljande visas.

*Papilio Machaon*<sup>1</sup> anträffas tämligen ofta i trädgårdar och skogsmarker samt i synnerhet i kanterna af de större mossarne.

---

<sup>1</sup> Hvad nomenklaturen beträffar har KIRBY'S Katalog med ett par undan-tag blifvit följd.

Ehuru ej inom detta område anträffad, nämnes dock *Par-nassius Apollo* såsom förekommande i största mängd på Skäralid, en i Skåne märkvärdig bergformation, en och en half mil norr om Rönne Mölla. *P. Mnemosyne* är mycket talrik i glesa ekskogar både närmast Rönne Mölla och vid Stehag.

*Pieris*-arterna, med undantag af *P. Daphnice*, hvaraf endast ett par stycken blifvit af herr C. MÖLLER på Wedelsbäck fångade vid Stehag, äro naturligtvis äfven här väl representerade.

*Euchloë cardamines* fladdrar öfver alla sankare skogsängar och *Leucophasia sinapis* å en enbevuxen ljungfälad bland björkar på ett ganska inskränkt område.

På sumpiga skogsmader och kärr samt vid kanten af de större mossarne är *Colias Palæno* ymnig. På en ljungmark vid Rönne Mölla i närheten af en sandåker såg jag i September 1878 helt flyktigt en *Colias*, troligast *Hyale*, som dock undgick mig.

*Goniopteryx rhamni* är öfverallt synnerligen allmän både vår och höst.

*Zephyrus quercus* är i ekskog icke sällsynt och *betulæ* är tagen i björklundarne vid Rönne Mölla och på tistlar i bokskog å Gyaberg vid Stehag år 1878 i massa af herr C. Möller, som ock der året förut fångade många *Thecla ilicis*. *T. w album* är sparsam i skogar, der alm växer; af *T. pruni* fångades sist nämnda år omkring ett tjog å en liten törnbevuxen stenbacke vid Rönne Mölla, men den är det sista året ej der anträffad. *T. rubi* finnes öfverallt å enfäladerna.

Af *Polyommatus* äro *P. virgaureæ* och *P. Hippothoë* (L.) (= *chryseis*) på torrare skogsängar och *P. Phlæas* i synnerhet i beteshagar och å åkerrenar allmänna.

*Cupido Argus* (L.) (= *Aegon W. V.*) å ljung- och enmarker samt *C. Argyrognomon* (BERGSTR.) å vissnade ormbunksblad i Billinge klockareboställes kohage äro talrika; *C. Optilete* icke sparsamt förekommande å Kroks mosse i Wittseröd; *C. Icarus* (ROTT.) allmän bland löf på grusig mark. *C. Argiolus* sällan, men *C. minimus* ofta anträffad vid Wittseröd och på galbacken vid Gunnaröd. *C. semiargus* är på skogsängar ej just ymnig, men deremot finnes å en inskränkt rymd i Kroks mosse *C. Alcon* i stor mängd. *C. Arion* finnes icke sparsamt å en- och ljungbackarne vid Wittseröd.

*Nemeobius Lucina* har herr C. Möller tagit i mängd vid Stehag; vid Gunnaröd och Bögerup är den sparsamt funnen i ekskog.

Af *Limenitis populi* togs ett par vid Rönnemölla 1878 och sista året dersammastädes 32 stycken, dock bland alla dessa icke en enda hona.

Af *Vanessa* är *V. c. album* icke allmän, *V. polychloros* var i synnerhet sista hösten talrik i Rönnemöllas trädgård och på almar vid Stockamöllan, *V. urticae* då ovanligt fåtalig, *V. cardui* samt *V. Atalanta* och *V. Antiopa* särdeles rikligt representerade 1879, *V. Io* deremot båda åren icke så.

*Melitea Maturna* har båda åren tagits i hundratal å torrare skogsängar, der *Arnica montana* och *Melampyrum nemorosum* växa, och synes den från nämnda växter suga sin hufvudsakliga näring. *M. Aurinia* (ROTT.) (= *Artemis*) är sparsamt funnen å dylik mark. *M. Cinxia*, *M. Athalia* och *M. Dictynna* äro lika allmänna som *M. Maturna*. I synnerhet å sur och sumpig kärrmark flyger *M. Dictynna* tätt.

*Argynnis Selene* finnes öfverallt i sumpig ängsmark i skog, *A. Euphrosyne* i gles björkskog, *A. Pales v. Arsilache* å Kroks mosse, *A. Ino* i alla madängar och *A. Lathonia* här och der i synnerhet på åkrarne — alla rikligt. *A. Aglaja* är allmän å alla skogsängar, och *A. Niobe*, både med och utan silverfläckar, fås i mängd på de torra enmarkerna vid Wittseröd. *A. Adippe* var. *Cleodoxa* är lika allmän som hufvudformen i skogsmarker och på ängar. *A. Paphia* svärfvar i hela svärmar på dylika stälten och i toppen af blommande lindar. Ynglingen JESPER MÖLLER har ett par gånger tagit dess honvarietet *A. valesina* å Gyaberg.

*Erebia Ligea* är ett par gånger funnen vid Rönnemölla samt förekommer ymnigt i dalgångarne på Skäralid.

*Satyrus Semle* är å torrare platser, såsom vid stengärdesgårdar och grusgrafvar, en mycket vanlig fjärlart, och likaså finnas af *Pararge*-släktet å nämde lokaler många *P. Hiera* och *P. Megera*; i skogsängar är *P. Mera* vanlig. *P. Achine* (= *Dejanira*) är inskränkt till en mycket liten rymd i ekskog vid Stehag, der den först iaktogs af ynglingen JESPER MÖLLER, och var 1877 mycket talrik, men fåtaligare de senare åren.

*Epinephele Jurtina* L. (= *Fanira*) och *Hipparchia Hyperanthus* kan man rikligen skörda nästan öfverallt på öppna och torra platser i skog.

*Coenonympha Hero* var de tvenne sista åren en bland de talrikast förekommande dagfjärilarna, *C. Pamphilus* i något mindre mängd; i kärr och sumpiga mader var godt om *C. Tiphon* (Rott.) (= *Davus*). *C. Arcania* är ej sedd i trakten.

Af *Hesperia* förekommer endast *malvæ* i beteshagar, der äfven *Nisoniades Tages* icke är sällsynt.

I skogar å öppna ställen äro *Pamphila Sylvanus* och vid vägar samt å torrare platser *P. comma* allmänna; mycket sparsamt förekomma deremot *Thymelicus Thaumias* (Hufn.) (= *linea*) och *lineola* å sandmarkerna.

---

## SVENSK-NORSK ENTOMOLOGISK LITERATUR 1878—79.

I Sverige och Norge tryckta arbeten eller uppsatser:

- AURIVILLIUS, P. O. CHR., Lepidoptera Damarensia. Förteckning på fjärilar, insamlade i Damaralandet af G. DE VYLDER åren 1873 och 1874 jemte beskrifning öfver förut okända arter. 1879. — K. V. A. Öfv., Årg. 36 (1879): N:o 7, Sthm., sid. 39—69.
- DAHM, O. E. L., Biet, dess natur och vård samt några drag ur bikännedomens historia. Sthm. 1878 P. A. Norstedt & Söner. 8:o 184 sid. med 1 pl. och 50 fig. i texten.
- HOLMGREN, AUG. EM., Om Skadeinsekter inom hus, deras kännetecken, utveckling och lefnadssätt samt medlen att utrota dem. Sthm. J. Beckman. 1879. 8:o., 111 sid. m. 45 afbildn.
- KRAMER, JULES HENRI, Ville de Stockholm! Description physique et naturelle. Sthm. 1878. 8:o. — Insectes p. 35—37; la liste des papillons diurnes et crepusculaires par K. FR. THEDENIUS.
- PIHL, AXEL, Om några af de för trädgårdsväxter skadligaste insekter och smådjur samt medlen att utrota dem. 1879. — Svenska Trädgårdsföreningens Tidskrift 1879. Sthm., sid. 81—87.
- SCHÖYEN, W. M., Mærkelig Optreden af Tortrix viburnana W. V. 1878. — Nyt. Mag. f. Naturvidenskaberne, Bd. 24 (1879), Christiania, p. 146—149. — Særskilt Aftryk p. 1—4.