

FYNDORTER Å MER ELLER MINDRE SÄLLSYNTA
SVENSKA SKALBAGGAR

MEDELADE AF

A. WÅNGDAHL.

Carabus nemoralis säges af Prof. BOHEMAN ej vara funnen i landska-
pen mellan Skåne och Stockholm; men togs förra året i Hammars
socken i Nerike vid byn Skyrsta bland tröskad hafra.

Bembidium rufipes, Hammars socken.

» *Sahlbergi*, Helsingland Iggesunds bruk och i Hammar.

Trechus rivularis, Helsingland, Iggesund.

Cymindis basalis, Iggesund.

Feronia gracilis, Iggesund och i Hammar.

» *borealis* på Hornslandet.

Amara lunicollis, Hammar.

» *nitida*, n. Helsingland vid Iggesund.

Anchomenus livens, n. Helsingland och Hammar.

» *bifoveolatus*, »

» *versutus*, »

» *Bogemani*, »

Badister peltatus, Askersunds socken, torpet Tastorp.

Chlenius nigricornis, Hammar, Lunna ägor.

Ophonus puncticollis, Hammar.

Harpalus luteicornis, »

» *rubripes*, Hammar, under stenar i en sandgrop invid Stora Sun-
det. Flere exemplar.

» *discoideus*, Hammar.

» *neglectus* »

Bradycellus cognatus, n. Helsingland och Hammar.

» *placidus*, Hammar.

Hydroporus bilineatus, Hammar.

» *brevis* vid Iggesund.

» *geniculatus* »

» *elongatulus* » och ett exemplar i Hammar.

» *notatus* » och ett d:o i d:o.

» *Gyllenhali* »

Hydaticus stagnalis i en vattenpus vid Ultuna i Upland, tagen af
RAGNAR WÄNGDAHL.

Cymatopterus striatus i Storsjön i Arbrå socken i Vestra Helsingland.
Illybius ater, utom i Norra Helsingland, förekom rätt ymnigt i en vatten-
samling vid Hammars kyrka.

» *crassus*, n. Helsingland.

» *obscurus*, » i flere småsjöar.

Agabus serricornis, n. Helsingland utom vid Nianfors bruk, sedermera
i flere exemplar i en tjärn på holmen Alsterdam i Iggesunds skärgård.

Gaurodytes nigro-æneus, n. Helsingland.

Cyphea curtula, för första gången tagen i Skandinavien i n. Helsingland,
bestämd af Adj. THOMSON och lemnad till Riksmuseum i Stockholm.

Necrophorus vestigator, Iggesund.

» *microcephalus*, Hammars glasbruk.

Spherites glabratus, n. Helsingland.

Anisotoma Triepkei, »

Amphicyllis globosus » och i Hammar.

Cyphocele lævigata, Hammar.

Agathidium mandibulare, ».

Napochus Mäklini, »

Rhizophagus parallelo-collis, » och n. Helsingland.

Cercus bipustulatus, n. Helsingland.

Meligethes exilis, Hammar.

Soronia punctatissima, n. Helsingland, talrik.

Epuræa silacea, Iggesund på nysågade bräder.

» *parvula*, »

» *variegata*, »

Thymalus limbatus, n. Helsingland, Norrbo socken.

Peltis grossa, under granbark i n. Helsingland.

Calitys dentata, ett exemplar på berget Nipen i Norrbo socken och ett
på en gärdsgård vid Månfors bruk, n. Helsingland.

Micropeplus tesserula, Hammar, Skyrsta egor.

Dermestes murinus, Iggesund i mängd i cadaver.

Hister stercorarius, Hammar.

Athalus bimaculatus, Hammar.

Platysoma frontalis, Iggesund.

» *deplanata*, Helsingland.

» *oblonga*, »

Apodius granarius n. Helsingland i flere exemplar.

» *piceus* »

» *nitidulus* »

» *conspurcatus* »

Pediacus depressus, Iggesund i safven på barkad Asp.
Dendrophagus crenatus »

Bothrideres contractus, n. Helsingland.
Cerylon deplanatus »
 » *impressus* »
Ernobius nigrinus VAR C, Hammar.
Sitodrepa panicea, n. Helsingland.
Coniporus orbiculatus »
Cis alni »
Ennearthron cornutum »
Eridaulus Jacquemarti »
Entypus fronticornis »

Lathridius rugicollis, n. Helsingland.
Conithassa hirta »
Corticaria cylindrica »
Cryptophagus saginatus »
Anchicera Zetterstedti »

Chrysobothrys Chrysostigma, n. Helsingland.
Habroloma nana, Hammar.
Adelocera conspersa, n. Helsingland.
Corymbites serraticornis »
 » *melancholicus* »
 » *bipustulatus* »
Elater tristis »
Cantharis violacea, Hammar.
 » *pilosa*, n. Helsingland.
Malthodes guttifer »
 » *mysticus* »
Hylecoetus dermestoides Iggesund på vedkast.

Blaps mortisaga, Iggesund inuti en spismur.
Upis ceramboides, n. Helsingland på Hornslandet under granbark, på
 Innerstön under björkbark.
Hypophloeus longulus, n. Helsingland.
Mycetochares flavipes »
Ernocharis obscura »
Cistela ceramboides, Hammar.
Mordella maculosa, n. Helsingland.
Zilora ferruginea »
Rhinosimus ruficollis »
Cnestocera violacea » talrikt.

- Apion pallipes*, n. Helsingland.
 » *Ervi* »
 » *simile* »
Sitones elegans, Hammar.
Polydrosus fulvicornis » och n. Helsingland.
Otiorrhynchus lepidopterus, n. Helsingland.
Phytonomus punctatus, Hammars glasbruk.
Bagous binodulus, n. Helsingland och Hammar.
Lixus Bardanæ, i Hammars glasbruks trädgård på *Spiræa*.
Pisodes piniphilus, Hammar.
Coeliodes Epilobii » och n. Helsingland.
 » *fuliginosus* »
Centorrhynchus apicalis VAR., B. Hammar.
 » *viduatus* »
Baridius picinus »
Gymnetron linariæ »
Elleschus scanicus »
Magdalinus phlegmaticus »
Hylesinus crenatus »
-

- Callidium coriaceum*, Hammar, St. Aspön i Vettern.
Toxotus Lamed med varietet, Iggesunds bruk ymnigt.
Pachyta septentrionis med var., n. Helsingland vid Nianfors bruk på
 nysågad plank.
 » *marginata* vid Nianfors bruk äfven på nysågad plank.
Acantoderes varius Hammar, St. Aspön i Vettern.
Pogonocherus ovalis, Iggesunds bruk och Hammar.
Monochamus Sartor, Iggesunds bruk på grantimmer.
Saperda Seydlii, n. Helsingland på Östanå hemman nära Iggesunds bruk
 i samma asp, i hvilken *Chryphalus binodulus* första gången
 togs i Skandinavien.
-

- Donacia obscura*, n. Helsingland och Hammar.
Phyllotreta 4-stigma, n. Helsingland.
Psylliodes Napi D:o.
Chrysomela geminata, n. Helsingland och synnerligast Hammar, der
 den ej synes vara så sällsynt.
Lina lapponica, n. Helsingland, der ej sällsynt, men träffades år efter år
 vid Iggesund endast på en enda säljbuske.
Plagiodera salicis, n. Helsingland på Ljusgrunden i Hudiksvalls-fjärden
 i stor mängd, ett exemplar i Hammar.
Cryptocephalus distinguendus, n. Helsingland.
 » *coryli* »

<i>Cassida vibex</i>	Hammar.
» <i>thoracica</i>	»
» <i>sangvinolenta</i>	»

Coccidula scutellata, Hammar.

Hippodamia segetalis m. fl. variteter Hammar.

Adimonia mutabilis »

Halyzia impustulata »

Coccinella magnifica, Iggesunds bruk.

» *14-pustulata*, n. Helsingland i mängd på Storön i Forsa socken äfven Hammar.

BIDRAG TILL KÄNNEDOMEN OM SKANDINAVIENS FJÄRILSFAUNA

AF

K. FR. THEDENIUS.

NYA ELLER MINDRE KÄNDA FYNDORTER FÖR FJÄRILAR.

(Forts. från pag. 101).

Oeneis Jutta Hb. Denna fjärl synes icke tillhöra fjällen utan de lägre belägna, fuktiga skogstrakterna och mossarne i norra och mellersta delen af Skandinavien. WALLENGREN uppgifver 61° nordlig polhöjd såsom den sydligaste trakten i vårt land, der den blifvit funnen, nämligen i Ore socken i Dalarne. Såsom varande en nordlig art, borde den icke gå så långt sydligt i kustprovinserna. Den är dock icke sällsynt i Helsingland och D:r R. HARTMAN tror sig hafva sett den i skogarne nära Gefle. Ännu sydligare har den blifvit funnen under sista sommaren, ända ned på Wermdön, öster om Stockholm. Skolynglingarne GUSTAF ZETTERLUND och EMIL HOLMGREN fångade två exemplar af denna fjärl den 27 Juni 1880 på en vidsträckt myr vid Långvik på Ingarön på 59,4° latitud.

Fjärilarne synas icke vara så noga med latituden. Detta är väl icke heller underligt. De sofva såsom pupor under den kallare årstiden. Om sommaren är det nog tillräckligt varmt för dem äfven långt norr ut. Mera se de