

- Paa den tilhørende Planche er paa figg. 3 og 4 Forvingernes Grundfarve ikke bleven tilstrækkelig mørk, hvorfor Tegningerne træde for skarpt frem, navnlig paa fig. 4. Figg. 5 og 6 har ligeledes altfor skarpt fremtrædende Tegninger; specielt udmærker den fig. 6 afbildede Form sig i Virkeligheden ved lysere Farver og mere udviskede Tegninger end Hovedformen, væsentlig som Følge af den langt tyndere Bestøvning.
- P. 120 Linie 2 f. n.: Kunsamo, læs: Kuusamo.
 - » 121 » 6 f. o.: (?), læs: (♂).
 - » 121 » 12 f. n.: Ausschen, læs: Aussehen.
 - » 122 » 6 f. o.: abweichendes der, læs: abweichendes Aussehen der.
 - » 122 » 14 f. n.: Kirkenas, læs: Kirkenæs.
 - » 123 » 4 f. o.: Alekryarg, læs: Aleknjarg.
 - » 123 » 12 f. n.: Bergen, læs: Bergtin.

Paa den tilhørende Planche er paa figg. 3 og 4 Forvingernes Grundfarve ikke bleven tilstrækkelig mørk, hvorfor Tegningerne træde for skarpt frem, navnlig paa fig. 4. Figg. 5 og 6 har ligeledes altfor skarpt fremtrædende Tegninger; specielt udmærker den fig. 6 afbildede Form sig i Virkeligheden ved lysere Farver og mere udviskede Tegninger end Hovedformen, væsentlig som Følge af den langt tyndere Bestøvning.

RÉSUMÉS.

(P. 177 du texte.)

H.-D.-J. WALLENGREN: *Note sur les Tipulides de la Scandinavie.*

L'auteur donne sous ce titre un aperçu systématique des Tipulides de la Scandinavie, aperçu dans lequel il établit les nouveaux genres suivants:

De *Limnobia variicornis* ZETT., le genre nouveau *Nasiterna*; de *Trichocera hirtipennis* SIEBKE, le genre *Diazoma*; de *Limnobia bifurcata* ZETT., le genre *Verucina*; enfin, des types *Limnobia alpina*, *juvenilis* et *virgo* de ZETTERSTEDT, le genre *Ninguis*. Les diagnoses génériques sont communiquées en latin dans le texte.

(P. 209 du texte.)

O.-TH. SANDAHL: *Petites communications.*

L'auteur fournit, tant d'après ses observations et ses trouvailles propres, que sur des communications écrites d'autres entomologistes, des données sur de nouveaux lieux de trouvaille d'insectes rares pour la faune de notre pays, insectes parmi lesquels les suivants ont droit à une mention spéciale par la raison qu'ils n'avaient pas encore été découverts jusqu'ici en Suède.

Coleoptera.

- Throscus carinifrons BONV.
Zeugophora Turneri POWER.

Lepidoptera.

- Sciapteron tabaniforme ROTTEMB.
Colias nastes v. Rossii GUENÉE.
Polyommatus Hippothoë v. Eurybia OCHS.
Carterocephalus Palaemon PALL.
C. Silvius KNOCH.
Cymatophora octogesima HB. (ocularis GN.)
C. fluctuosa HB.
Agrotis Dahlii HB.
Hadena sublustris ESP.
H. lithoxylia FAB.
Taeniocampa gothica v. gothicina H. S.
T. opima HB.
Herminia cribrumalis HB.
H. derivalis HB.
Boarmia luridata BKH.
Schoenobius mucronellus SCHIFF.
Chilo phragmitellus HB.

(P. 216 du texte.)

W.-M. SCHÖYEN: *Remarques sur les variations de Caradrina quadripunctata* FABR. indiquées dans le Catalogue de MM. Staudinger et Wocke.

Après avoir comparé des exemplaires typiques de *C. leucoptera*, de la Suède, avec d'autres, de *C. quadripuncta* v. *cinerascens* (TENGST., = *menetriesii* KRETSCHM.), de la Finlande, l'auteur arrive à la conclusion que ces formes sont identiques. Il porte le même jugement sur *C. grisea* EV. et *C. petræa* TENGSTR. Quant à la question de savoir s'il y a lieu de considérer ces dernières formes comme des espèces spéciales ou comme des variétés de *C. quadripunctata* L., l'auteur pense qu'il est impossible de la décider sans la connaissance de leur développement.
