

samt hemielytra, en del nerver på membranen och pronoti process brun, corii discoidalfält med två stora svarta fläckar, sidoranden med en eller kort före spetsen två rader maskor, vaxelvis svart- och gul-maskig; pronoti disk starkt punkterad, kölarne utan maskor.  $3\frac{1}{3}$ — $3\frac{1}{2}$  mm. l.

SAHLB., Mon. 133, 4. *Tingis Humuli* FALL., H. Sv. 144, 3 (delvis).

På *Boragineer*, särskildt *Echium vulgare*. Sverige: Skåne, Öland, Kinnekulle. Finland: Yläne i Åbo län, enl. J. SAHLBERG.

2. **M. Lupuli** KUNZE: äggrund, svart, tredje antennleden och den andras spets, lårspetsar, tibier och tarsernas bas rostgula; pronoti ränder, kölar, process och hemielytra smutsigt grågula, pronoti kölar låga utan maskor, den återkastade sidomem-

(Forts.)

---

OM  
TROCHILIUM MELANOCEPHALUM (DALM.).

AF

CHR. AURIVILLIUS.

---

Sommaren 1879 fångades vid Bjuf i Skåne af Hr inspektor A. F. CARLSON ett exemplar af en Sesiid, hvilket sedermera skänktes till Riksmusei entomologiska afdelning. Vid en närmare granskning af detsamma fann jag, att det var en hane af den allt sedan DALMANS tid ej inom Sverige återfunna *Trochilium melanocephalum* (DALM.). Det enda förut af PAYKULL tagna exemplaret är en hona och befinner sig likaledes i Riksmusei

entomologiska samling. Hanen af denna art skiljer sig från hanarne af de andra arterna i släktet derigenom att antennerna äro tydligt kammade, och kamgrenarne nå vid antennernas bas en längd af antennernas dubbla bredd. De äro på dessa exemplar gulaktiga liksom själfva antennen.

*[Faint, mirrored text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*

OM  
TROCHILUM MEZOCEPHALUM (Dalm.)

Gen. Annyvulus

*[Faint, mirrored text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*