

HEMIPTEROLOGISKA MEDDELANDEN

II

AF

O. M. REUTER.

I Entomologisk Tidskrifts innevarande årgång (1882), pag. 63—64, har Red. haft artigheten under särskild titel publicera »hemipterologiska meddelanden» af mig, hvilka ursprungligen i all anspråkslöshet delgåfvos henne, för att någon gång under tidens lopp sammanställas med öfriga liknande smärre meddelanden beträffande Skandinaviens fauna. Ur denna författarens afsigt bör äfven förklaringen sökas till den brefstil, i hvilken de berörda meddelandena äro hållna, i det författaren under andra förhållanden hade gifvit sin uppsats en mer vetenskaplig form.

I nämnda meddelanden förekommer tyvärr ett skriffel, hvilket gör den notis, hvori detta insmugit sig, obegriplig. Jag begagnar mig därför af tillfället att rätta detsamma.

Globiceps cruciatus REUT. säges nämligen af FIEBER vara beskrifven under namn af *quadrimaculatus*, hvilket bör heta *flavomaculatus*. De fyra i Sverige funna *Globiceps*-arternas synonymi gestaltar sig nämligen sålunda:

1. **Globiceps flavomaculatus** FABR., sec. spec. typ. in Mus. Havn. a me examinata. (= *flavomaculatus* FALL., F. SAHLB., REUT. in Rev. crit. Caps. p. 117, = *selectus* FIEB., REUT. Medd. Soc. F. Fl. Fenn. V, p. 174). Allmän på åtskilliga örter.

2. **Globiceps cruciatus** REUT., Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XXI, 36, 10 (= *flavomaculatus* FIEB., REUT. in Medd. Soc. F. Fl. Fenn. l. c., nec in Rev. crit. Caps.). Gotland; lefver på smärre *Salices*.

3. **Globiceps salicicola** REUT., Medd. Soc. F. Fl. Fenn. I. c. (= *flavomaculatus* Var. 1 F. SAHLB., = *fulvipes* REUT. in Rev. crit. Caps. p. 118, nec SCOP.). Lappmarken, Finland, på smärre *Salices*.

4. **Globiceps dispar** BOH. Sällsynt bland gräs.

Beträffande dessa arters nomenklatur, får jag för öfrigt hänvisa till Medd. Soc. F. Fl. Fenn. I. c. Här bör blott tilläggas, att, sedan jag sett FABRICII typexemplar och funnit dem tillhöra samma art, som FALLÉNS och F. SAHLBERGS *flavomaculatus*, jag numera ansett mig för denna böra bibehålla det ursprungliga Fabricianska namnet, om än alla dessa författares diagnoser lika väl kunna tolkas på båda arterna (*flavomaculatus* och *cruciatus*) och först FIEBER långt senare uppvisat de särskiljande karaktärerna. De af både FALLÉN och SAHLBERG uppgifna fyndorterna utvisa nämligen tydligt nog hvilken art i beskrifningarna afses; och då *cruciatus* (FIEBERS *flavomaculatus*) alls icke förekommer i dessa trakter, bör således FALLÉNS och SAHLBERGS art med prioritetens rätt bibehålla namnet *flavomaculatus*, enär äfven FABRICII egna typer visat sig tillhöra denna. Namnet *selectus* FIEB. bortfaller sålunda helt och hållet.

Angående karaktärerna för dessa arter, hänvisar jag till den snart utkommande tredje delen af mina »Hemiptera Gymnocerata Europae», der de äro vidlyftigt behandlade.

Den femte arten, som anförts under genus *Globiceps*, nämligen *flavoquadrinaculatus* DE GEER (= *flavonotatus* BOH.), är, såsom jag tidigare uppvisat på annat ställe (Ent. Monthl. Mag. XV, p. 113), alls ingen *Globiceps*, utan en *Cyllocoris*.

Dicyphus pallidus HERR. SCHÄFF. har inkommit i den skandinaviskt-finska faunan, på grund deraf att FIEBER såsom synonym till denna art anført *Capsus constrictus* BOH. Jag har emellertid numera lärt mig känna den äkta *Dicyphus pallidus* H. SCH., hvilken förekommer på *Stachys sylvatica* i mellersta och sydliga Europa, och funnit att den är en helt annan art, hvarför vår art bör erhålla namnet *constrictus*.

De svenska arterna af detta slägte äro sålunda följande:

I. **Dicyphus constrictus** BOH. (= *pallidus* REUT. (sec. FIEB.) in Rev. crit. Caps. 112, 3, = *pallidus* THOMS., Op. ent.

435, 59, nec HERR. SCHÄFF.). På *Melampyrum*, *Symphytum*, *Rubus idaeus*, sällsynt.

2. **Dicyphus errans** WOLFF (= *Capsus collaris* FALL.). På *Urtica*?, etc. sällsynt.

3. **Dicyphus stachydis** REUT. (= *Capsus collaris* FLOR nec FALL., = *errans forma brachypt.* REUT. in Rev. crit. Caps., p. 112). Kinnekulle, lefver på *Stachys*.

4. **Dicyphus globulifer** FALL. Sällsynt.

Jag vill icke heller för en framställning af dessa arters karaktärer upptaga tidskriftens utrymme, då de snart nog komma att publiceras i tredje tomen af »Hemiptera Gymnocerata Europae» och, i likhet med de för *Globiceps*-arterna, i sinom tid ingå i min påbörjade bearbetning af Finlands och den Skandinaviska halföns Hemiptera Heteroptera. Hufvudsyftet med detta meddelande har varit att från vår fauna utmönstra en art, *D. pallidus* H. SCH., hvilken orätt införts i densamma.

Under namn af *Anthocoris nemoralis* FABR. har i vår fauna inregistrerats en art, hvilken emellertid icke är den rätta, af FABRICIUS beskrifna. Den art, hvilken jag i Öfv. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 420, vägledd af F. SAHLBERGS typer, beskrifvit under namn af *A. nemoralis*, afviker nämligen från den i mellersta Europa allmänna Fabricianska arten af samma namn genom de mycket svagare membrannerverna, hvilka mot inkanten blifva allt otydligare, så att den fjerde (som hos *A. nemoralis* FABR. ligger parallel tätt utmed den tredje och är lika tydlig som denna), nästan alldeles försvunnit, äfvensom derigenom att den fernissartade glansen på cuneus sträcker sig inåt endast till den genom cuneus gående längsnerven, icke ända till cunei inrand. Slutligen är färgen mer konstant. Jag kallar denna art, som är den allmänare hos oss, *A. confusus*. Af den äkta *A. nemoralis* FABR. har jag sett endast två skandinaviska exemplar, tagna af BOHEMAN på Gotland och förvarade i Riksmuseum.

Under mitt senaste besök derstädes sista sommaren fann jag äfven bland den vanliga *A. sylvestris* LINN. (= *nemorum* LINN.) en för Sverige visserligen redan af DE GEER anford, men af senare författare förbisedd art, *A. gallarum Ulmi* DE GEER, (enligt typexemplar icke hörande till *A. nemoralis*, utan = *A. pratensis* HAHN, FIEB. nec FABR.; *A. pratensis* FABR. = *sylvestris* LINN.

sec. sp. typ.). Exemplaren äro från Stockholm. Arten är af mig närmare beskrifven i Medd. Soc. F. Fl. Fenn. V, p. 183. FALLÉN har måhända i sina Hem. Svec. sammanblandat alla tre, *nemorialis* FABR., *confusus* m. och *gallarum ulmi* DE GEER. För öfrigt får jag hänvisa beträffande ofvanstående arter till en uppsats öfver de europeiska *Anthocoris*-arterna, införd i Medd. F. Fl. Fenn., IX, der deras nomenklatur och artkaraktärer utredas.

I två särskilda uppsatser, hvilka snarligen skola inlemnas till Tidskriftens redaktion, skall jag meddela beskrifningar på två nya Hemipterarter från Sverige, nämligen på den i mina förra meddelanden berörda, af THOMSON på Öland funna nya *Anthocoriden*, *Piezostethus Thomsoni* n. sp. och på en ny *Idiocerus*, tagen af BOHEMAN i Dalarne, och hvilken jag kallat *I. Spångbergi* n. sp.

Slutligen har jag att nämna att d:r F. Löw i Wien genom bref underrättat mig att aflidne FRAUENFELD från sin resa i Norge medfört en för Skandinavien ny Psyllod, *Trioxa dispar* F. Löw, funnen af honom vid Christiania, hvarest han äfven tagit den inom vårt fannagebit förut endast i Skåne observerade *Psylla luxi* LINN.

Helsingfors den 12 November 1882.