

Högst sällsynt i Finland: Satakunta (Yläne), C. SAHLBERG, Ladoga Kårelen (Pärkkälä), J. SAHLBERG.

13. **A. moestus** REUT.: svart, tibier i midten stötande i beckbrunt; abdominalsegmentens spetshörn lergula; antennernas andra led småningom starkt afsmalnande mot den knöligt uppsvulna basen, tredje leden omkring $\frac{1}{4}$ kortare än den andra; hufvud bakom de starkt utstående ögonen starkt och långt hopsnördt samt i kanten urbugtadt, med en stor hvass tand nära hvardera ögat, sido-utskottet spetsigt, längre än ögats diameter, i utkanten oväpnadt, inkanten i midten bugtigt utvidgad; pronotum mer än dubbelt så bredt som långt, sidorna i midten rundadt utvidgade, före framhörnen urbugtade, öfverallt fint crenulerade, äfven mot basen tydligt afsmalnande; scutell aflångt triangulär, tillspetsad, kanterna starkt uppböjda, i midten lindrigt ur-

(Forts.)

OM CIDARIA OLIVATA W. V.

K. FR. THEDENIUS.

Min vän, regementsläkaren, doktor C. H. NERÉN, sände mig under sistlidne Februari ett exemplar af ofvannämnda fjäril, hvilket han under sina ifriga forskningar efter insekter i sin hemort, Skeningetrakten, funnit under förra sommaren. Jag förefvisade detsamma vid Entomologiska Föreningens sammanträde i Mars, eftersom ingen uppgift hittills varit i tryck lemnad om, att denna *Cidaria* förr blifvit funnen i Sverige. Hon synes vara ganska sällsynt i vårt land. Åtminstone undgår hon lätt uppmärksamheten, hvilket kan bero derpå, att hon sätter sig att hvila på trädstam-

mar och mossiga klipphöllar, der hon, såsom till största delen brungrön till färgen, har fördelen af »skyddande likhet». Hon är dock funnen på några ställen. På en mossig, af träd skuggad klippvägg af Klinteberget på Gotland fann jag den 14 Juli 1873 ett exemplar och på en trädstam i »hästhagen», tillhörande Elfkarleby kyrkoherdeboställe i norra Upland, fann jag ännu ett den 26 Juli 1874. Konservator KOLTHOFF har funnit ett exemplar vid Upsala. I Norge har konservator SPARRE-SCHNEIDER den 21 Juli 1876 funnit ett ex. i St. Hanshaugen och ånyo ett 1880. Kandidaten W. M. SCHÖYEN har 1880 funnit flera ex. i Söndmøre. Utom Skandinavien är fjärlen påträffad i Lifland, Schlesien, mellersta och södra Tyskland, Schweiz, Belgien, Galizien och England äfvensom på Ural och Altai.

Fjärlilens framvingar äro vid basen och på den yttre hälften olivgröna, genomdragna af mer eller mindre tydliga bruna, vågiga band och försedd med två smala, vågiga, lika breda, hvita strimmar, hvilka äro åtskilda af ett smalt, gråbrunt, vågigt streck. Midtbandet har en svart punkt nära framkanten. Nära vingens utkant finnas på främre hälften tre brunsvarta äggrunda fläckar, utåt kantade med hvitt och på den bakre hälften tre hvita, mindre tydliga fläckar, utgörande en fortsättning bakåt af de främre, brunsvarta fläckarne. Nära utkanten löper en rad af mycket små aflånga, svarta punkter. Fransarne äro gråhvita med bruna fläckar. Bakvingarne brungrå med en vågig, hvit dubbelstrimma, men otydligare än den på framvingarne.

Hanens antenner hafva korta kamtänder.

Flygtiden är hos oss Juli månad.