

ENTOMOLOGISCHES ZEITSCHRIFT 1883. 102

Caput supra subtrapezium depressum, apicem versus attenuatum, vertice medio quam ad oculos vix duplo longiore, oculis inter se quam a basi verticis fere duplo longius distantibus. Frontum fere dimidio longius quam vertex, marginibus antice quam postice fere dimidio longioribus.

Hæc species ad divisionem FF pertinet.

SPECIES NOVAS GENERIS GYPONÆ

QUÆ IN MUSEO ZOOLOGICO CÆSAR. VINDOBONENSI ASSERVANTUR

DESCRIPSIT

JACOBUS SPÅNGBERG.

Versanti mihi abhinc paucos annos Vindobonæ, ubi insecta, quæ in Museo Zoologico Cæs. urbis illius asservantur, inspicere et perquirere studebam, aliquot species insectorum, nondum descriptas, ALEXIS FREDERICUS ROGENHOFER, custos ejus Musei præclarissimus, describendas tradidit, quas hoc opusculo meo describere conabor. Pro magna benevolentia, quam doctissimus ille vir mihi hac in re præstitit, ei gratiam quam maximam habeo semperque habebo.

Gypona insignis n. sp.

Pallide straminea, dorso abdominis subaurantiaco, margine antico capitis obscuriore, in fusciscentem colorem vergente; areolis tegminum lituris vel maculis parvis punctiformibus destitutis, haud venoso-reticulatis; ocellis pone medium verticis positis, inter se quam ab oculis vix longius remotis, fere æque longe distantibus; alis sublacteis.

Mas ignotus.

Femina segmento ventrali ultimo fere æque longo ac penultimo, apice distincte bisinuato, lobo medio sat lato postice leviter sinuato.

♀: long. corp. 12 mill., long. corp. c. tegm. 14 mill., lat. 4 mill.

Patria: Brasilia.

Caput supra subtusque depressum, apicem versus attenuatum, vertice medio quam ad oculos vix duplo longiore, ocellis inter se quam a basi verticis fere duplo longius distantibus. Pronotum fere dimidio longius quam vertex, marginibus anticis quam posticis fere dimidio longioribus.

Hæc species ad divisionem FF pertinet.¹

Gypona obesa n. sp.

Sordide subolivaceo-flavescens, subtus pallidior, margine antico capitis parteque scutellari tegminum obsolete rufescente-testaceis; areolis tegminum lituris vel maculis parvis punctiformibus destitutis, haud venoso-reticulatis; ocellis pone medium verticis positus, inter se et ab oculis fere æque longe remotis; alis hyalinis.

Mas ignotus.

Femina segmento ventrali ultimo ad latera duplo longiore quam penultimo, in medio brevior quam penultimo, apice in medio profunde emarginato-sinuato et ad latera sinubus duobus sat magnis instructo, lateribus sinus medii illius emarginati postice subsinuatis.

♀: long. corp. 10,5 mill., long. corp. c. tegm. 11,5 mill., lat. 5 mill.

Patria: Mexico.

Caput supra subtusque depressum, structura verticis, pronoti scutellique eadem ac in congeneribus, ocellis subtestaceis, ab apice verticis quam a basi fere duplo longius remotis, inter se quam a basi fere duplo longius distantibus.

Hæc species ad divisionem FF pertinet.

Gypona unicolor STÅL

var. nigro-dorsalis n. v.

Flavescente-virescens, subtus cum pedibus paullo pallidior; segmentis dorsalibus abdominis in medio maculis nigris, postice apicem versus magnitudine decrescentibus ornatis; alis hyalinis.

Hæc species etiam in museo Holmiensi asservata.

¹ Refero ad meum opusculum: *Species Gyponæ Generis Homopterorum* (Bih. Vet. Ak. Handl., tom. 5, n:o 3. 1878).

Gypona approximata n. sp.

Sordide flavescens-subolivacea, subtus cum pedibus aliquanto pallidior; vittis sex verticis, octo pronoti flavescens, subaurantiacis; macula parva punctiformi utrimque paulo ante medium pronoti pone oculos nigro-fusca; alis hyalinis.

Mas ignotus.

Femina segmento ventrali ultimo fere dimidio longiore quam penultimo, apice subtruncato, levissime trisinuato.

♀: long. corp. 12,5 mill., long. corp. c. tegm. 13 mill., lat. 5 mill.

Patria: Brasilia?

Caput supra subtusque depressum, apicem versus attenuatum, vertice distincte striato, striis mediis intercellaribus longitudinalibus, fere parallelis, striis ceteris oblique subtransversis, inter se apicem versus convergentibus, medio quam ad oculos fere dimidio longiore; ocellis flavescens, pone medium verticis positus, ab oculis quam a basi fere dimidio longius distantibus, inter se quam a basi duplo longius remotis. Pronotum fere duplo longius quam vertex, marginibus lateralibus anticis quam posticis fere plus dimidio longioribus. Tegmina venis longitudinalibus utrimque punctulatis, præsertim basin versus, areolis lituris vel maculis parvis punctiformibus destitutis, haud venoso-reticulatis.

Hæc species ad divisionem EEE pertinet.

Gypona fallax n. sp.

Sordide subtestaceo-flavescens, abdomine ad maximam partem, margine exteriori corii subtus pedibusque magis minusve testaceis; vittis sex verticis, octo pronoti flavescens-aurantiacis; areolis tegminum lituris vel maculis parvis punctiformibus destitutis, haud venoso-reticulatis; ocellis pone medium verticis positus, inter se quam ab oculis aliquanto longius remotis, inter se quam a basi verticis fere dimidio longius distantibus; alis pallide fuscescentibus.

Mas ignotus.

Femina segmento ventrali ultimo aliquanto longiore quam penultimo, apice truncato, in medio leviter emarginato.

♀: long. corp. 11 mill., long. corp. c. tegm. 13 mill., lat. 4 mill.

Patria:?

Caput supra subtusque depressum, vertice medio quam ad oculos vix duplo longiore. Pronotum fere dimidio vix duplo longius quam vertex, marginibus lateralibus anticis quam posticis fere dimidio longioribus.

Hæc species ad divisionem EEE pertinet.

Gypona liturata STÅL.

Femina segmento ventrali ultimo aliquanto longiore quam penultimo, apice ad latera leniter sinuato lobis lateralibus interioribus productis, majoribus quam exterioribus, in medio trisinuato lobis duobus mediis multo minoribus quam lobis lateralibus interioribus.

♀: long. corp. 12,5 mill., long. corp. c. tegm. 13,5 mill., lat. 4 mill.

Gypona liturata STÅL, Rio Jan. Hem., tom. 2, p. 45 (1862)

♂. — SPÅNGBERG, Bihang Vet. Ak. Handl., tom 5, N:o 3, p. 27 (1878) ♂.

Patria: Brasilia.

Gypona Germari STÅL.

Femina segmento ventrali ultimo fere æque longo ac penultimo, apice sat late sinuato.

♀: long. corp. 8 mill., long. corp. c. tegm. 9 mill., lat. 2,5 mill.

Gypona Germari STÅL, Stett. E. Z. 25, p. 84 (1864) ♂.

— SPÅNGBERG, Bihang Vet. Ak. Handl., tom. 5, N:o 3, p. 26 (1878) ♂.

Patria: Mexico.

Gypona ruficauda n. sp.

Subolivaceo-flavescens, subtus cum pedibus pallidior; dorso abdominis rufo-aurantiaco; apice venarum clavi fusco; areolis tegminum lituris vel maculis parvis punctiformibus destitutis, haud

venoso-reticulatis; ocellis fere ad medium verticis positis, inter se quam ab oculis aliquanto longius remotis; alis hyalinis.

Mas ignotus.

Femina segmento ventrali ultimo fere dimidio longiore quam penultimo, prope medium quam ad latera aliquanto longiore, apice in medio profunde emarginato, ad latera truncato.

♀: long. corp. 8 mill., long. corp. c. tegm. 10 mill., lat. 3 mill.

Patria: Mexico.

Caput supra subtusque paullo depressum, apice obtuso, margine antico rotundato, vertice medio quam ad oculos paullo longiore, ocellis inter se quam a basi verticis fere dimidio longius distantibus. Pronotum vix duplo longius quam vertex, marginibus lateralibus anticis quam posticis aliquanto longioribus.

Hæc species ad divisionem H pertinet, *Gyp. chilensi* similima et affinis, segmento ventrali ultimo feminae, vertice minus producto et attenuato, colore abdominis præsertim facile distinguenda.

Gypona pulchra SPBG.

Mas segmento ventrali ultimo fere æque longo ac penultimo, apice subrotundato-truncato.

♂: long. corp. 7 mill., long. corp. c. tegm. 8 mill., lat. 2,5 mill.

Gypona pulchra SPÅNGBERG, Bihang Vet. Ak. Handl., tom. 5, N:o 3, p. 32 (1878) ♀.

Patria: Bogota.

Hæc species variat colore: vertice, pronoto scutelloque magis minusve virescentibus, margine antico verticis fusco.

Gypona gracilis n. sp.

Sordide flavescente-straminea; vertice et pronoto remote maculis parvis vel punctis sanguineis irroratis, facie fere tota, lateribus pectoris, pedibus partim, apice venarum clavi venulisque transversis duabus discoidalibus corii fuscescentibus; areolis tegminum lituris vel maculis parvis punctiformibus destitutis, haud

venoso-reticulatis; ocellis aliquanto ante medium verticis positus, inter se quam ab oculis plus duplo longius remotis; alis fuscescentibus.

Mas ignotus.

Femina segmento ventrali ultimo aliquanto longiore quam penultimo, apice bisinuato, lobo medio subtruncato vel levissime emarginato.

♀: long. corp. 6 mill., long. corp. c. tegm. 8 mill., lat. 2,5 mill.

Patria: Rio Janeiro.

Caput supra subtusque vix depressum, apicem versus sensim leviter attenuatum, margine antico rotundato; vertice transversim striato, in medio quam ad oculos paullo longiore, structura verticis, pronoti et scutelli eadem ac in congeneribus; ocellis a basi verticis quam ab oculis aliquanto longius quam vertex, marginibus lateralibus anticis ac posticis fere æque longis.

Hæc species ad divisionem I pertinet.

Gypona adpersa STÅL.

Mas segmento ventrali ultimo ad latera vix æque longo ac penultimo, in medio aliquanto longiore quam penultimo, apice rotundato.

♂: long. corp. 8 mill., long. corp. c. tegm. 10,5 mill., lat. 3,5 mill.

Gypona adpersa STÅL, Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1854, p. 252. ♀. — SPÅNGBERG, Bihang Vet. Ak. Handl., tom. 5, N:o 3, p. 67 (1878) ♀.

Patria: Mexico.

Gypona Dohrni STÅL.

Mas segmento ventrali ultimo plus dimidio (fere duplo) longiore quam penultimo, margine postico fortiter rotundato in apice ipso leniter truncato.

♂: long. corp. 6,5 mill., long. corp. c. tegm. 8 mill., lat. 2,5 mill.

Gypona Dohrni STÅL, Stett. E. Z. 25, p. 82 (1864) ♀. —

SPÅNGBERG, Bihang Vet. Ak. Handl., tom. 5, N:o 3, p. 62
(1878) ♀.

Patria: Mexico.

Gypona modesta n. sp.

Sordide flavescente-grisea, subtus cum pedibus sordide subferrugineo-flavescens; maculis duabus parvis basalibus verticis, pone ocellos positis, angulis basalibus scutelli nigro-fuscis; vertice, pronoto scutelloque plus minusve ferrugineo-irroratis; areolis tegminum, apicalibus exceptis, lituris vel maculis parvis punctiformibus nigro-fuscis ornatis; ocellis inter se quam ab oculis longius distantibus, aliquanto ante medium verticis positis; alis fusco-hyalinis.

Mas ignotus.

Femina segmento ventrali ultimo in medio fere dimidio longiore quam penultimo, ad latera fere æque longo ac penultimo, apice trisinuato.

♀: long. corp. 8 mill., long. corp. c. tegm. 10 mill., lat. 3 mill.

Patria: Illinois.

Caput rotundatum, vertice medio quam ad oculos fere dimidio longiore, ocellis ab oculis et a basi verticis æque longe distantibus. Pronotum fere duplo longius quam vertex, marginibus lateralibus anticis et posticis fere æque longis.

Hæc species ad divisionem N pertinet.

Gypona megalops n. sp.

Simillima *G. australi* SPÅNGB. quoad colorem omnino obscurior, segmento ventrali ultimo feminae fere dimidio longiore quam penultimo, apice leviter bisubsinuato, medio lobo longiore et angustiore quam in *Gyp. australi*, producto, apice truncato, vix vel haud emarginato; oculis in longitudinem majoribus quam intervallo inter hos et ocellos.

Mas ignotus.

♀: long. corp. 7,5 mill., long. corp. c. tegm. 9,5 mill., lat. 3 mill.

Patria: Brasilia et Paraguay.

Hæc species, *Gyp. australi* SPBG. simillima et affinis, notis supra illatis facile distinguenda, areolis tegminum sat dense fusco-maculatis, ocellis inter se quam ab oculis longius remotis, aliquanto ante medium verticis positus instructa. Pronotum plus duplo longius quam vertex.

Hæc species ad divisionem N pertinet.

Gypona Rogenhoferi n. sp.

Dilute et sordide subferrugineo-flavescens, vertice, pronoto medio, scutello, facie, partibus pectoris pedibusque magis minusve fuscis vel nigris; tegminibus sordide flavescente-albidis, areolis tegminum lituris vel maculis parvis fuscis ornatis; ocellis pone medium verticis positus, inter se quam ab oculis longius distantibus; alis fusciscentibus.

Mas ignotus.

Femina segmento ventrali ultimo fere dimidio longiore quam penultimo, apicè ad latera sat profunde sinuato, lobo medio sat lato, rotundato, in ipso apice emarginato.

♀: long. corp. 13 mill., long. corp. c. tegm. 16 mill., lat. 5 mill.

Patria: Rio Janeiro.

Caput sat rotundatum, apicem versus attenuatum, vertice medio quam ad oculos distincte longiore; ocellis ab oculis quam a basi verticis plus duplo longius remotis. Pronotum fere duplo et dimidio longius quam vertex, marginibus lateralibus anticis quam posticis aliquanto longioribus.

Hæc species ad divisionem NN pertinet.

Gypona fraudulenta n. sp.

Dilute et sordide flavescens, supra subtusque maculis majoribus vel minoribus irregularibus, fusciscentibus ornata, areolis tegminum venisque hic illic fusco-maculatis; ocellis vix pone medium verticis positus, inter se et ab oculis fere æque longe remotis; alis pallide fusciscentibus, subhyalinis.

Mas ignotus.

Femina segmento ventrali ultimo fere dimidio longiore quam penultimo, apice bisinuato, lobo medio sat lato, postice subtruncato.

♀: long. corp. 6,75 mill., long. corp. c. tegm. 7,5 mill., lat. 2,5 mill.

Patria: Mexico.

Caput supra subtusque depressum, apicem versus valde attenuatum, vertice subtiliter punctato-ruguloso, medio quam ad oculos plus duplo longiore; ocellis inter se quam a basi verticis fere dimidio longius remotis. Pronotum paullo longius quam vertex, transversim striatum et distincte punctatum, antica et laterali-bus partibus subtilissime punctato-rugulosis, marginibus lateralibus anticis quam posticis paullo longioribus.

Hæc species ad divisionem LL pertinet.

Gypona placida n. sp.

Dilute ferruginea vel fusca, vertice et pronoto sordide subferrugineo-flavescentibus, illo parteque antica pronoti fusco-maculatis, parte cetera pronoti fusco-irrorata; tegminibus fuscis sordide albo-luturis et albo-maculatis; ocellis pone medium verticis positus, inter se et ab oculis fere æque longe distantibus; alis fuscescentibus.

Mas segmento ventrali ultimo aliquanto longiore quam penultimo, apice rotundato.

Femina ignota.

♂: long. corp. 8 mill., long. corp. c. tegm. 9,5 mill., lat. 3 mill.

Patria: Brasilia?

Caput supra subtusque depressum, apicem versus attenuatum, vertice medio quam ad oculos plus dimidio longiore, ocellis ab oculis quam a basi fere duplo longius remotis. Pronotum aliquanto, vix dimidio longius quam vertex, marginibus lateralibus anticis ac posticis fere æque longis, forma et structura eadem ac in congeneribus.

Hæc species ad divisionem LL pertinet.

