

normalt farvede Individer af *Arsilache*, hvilken paa de fleste Steder inden vor arktiske Region er den almindeligste optrædende Form af Arten *Pales*. Et andet Exemplar af samme Udseende iagttoges sammesteds, men blev ikke fanget.

Varieteten *Inducta* af *Argyn. Pales* tilhører ligesom den tilsvarende for Arten *Aglaias* Vedkommende udelukkende den arktiske Region og er ogsaa der yderst sjelden, da den, saavidt vides, ikke er taget andre Steder end paa de ovenanførte Lokaliteter i *Finmarken*.

---

ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS BIBLIOTEK HAR  
ERHÅLLIT FÖLJANDE TILLÖKNING:

**Af La Société nationale de Sciences naturelles et  
mathématiques de Cherbourg:**

Catalogue de la Bibliothèque. I. Port.

**Af La Société des Sciences Physiques et  
Naturelles de Bordeaux:**

Memoires. Ser. II. Tome IV. (des procès-verbaux pp. XXXIII—XLVIII des publications recurs pp. XXXIII—XLVI. 1882.  
—, Ser. II. Tome V, Cah. I. 1882.

**Af La Société Linnéenne de Lyon:**

Annales: 1879—1881 (nouv. Série) Tom. XXVI—XXVIII.

**Af La Société d'Études Scientifiques d'Angers:**

Bulletin. XI:me e XII:me années 1881—1882.

**Af La Société d'Histoire Naturelle de Toulouse:**

Bulletin. XV:me année 1881.

Forts. sid. 132.