

OM EN FOR NORGES FAUNA OG REGIO  
ARCTICA NY RHOPALOCER

AF  
G. SANDBERG.

Den 30:de Juli dette Aar fangede jeg paa den norske Side af *Jakobselv* ved den *russiske* Grændse under en nordlig Bredde af henimod  $70^{\circ}$  og kuns omkring 4 Km. fra Ishavets Kyst et nys udklækket Exemplar af *Polyommatus Helle* W. V. Den flöi paa en med *Alchemilla* tæt bevoxet Engskraaning paa A. O. BRÆCHANS Eiendom i *Jakobselvdalen*.

Fundet af denne vakkre lille Art var af særdeles Interesse, baade fordi den aldrig för har været observeret indenfor *Norges* Grændser, og tillige fordi man hidtil ikke har været paa det rene med, hvor langt den gik mod nord. Dr. STAUDINGER sætter i sin Katalog Artens Udbredelse til det *nordlige (boreale)* og *midterste Europa, Armenien, det sydlige Sibirien* og *Amur*, og *svenske* Entomologer, Prof. BOHEMAN og WAHLBERG, indskrænker Opgaverne om Artens Flyvesteder inden *Sverige* til et temmelig begrændset Feldt i *Norr- og Westerbottens Län*, hvorhos Prof. ZETTERSTEDT nævner den som sjældent forekommende i *Sveriges Lapmarker*. *Polyom. Helle*s arktiske Borgerret har man saaledes lige indtil nu været i Uvidenhed om.

Det tagne Exemplar, der var en Han, udmærker sig i det hele taget ved Mathed i Farverne: *Oventil* er saaledes den violette Glands paa alle fire Vinger ganske svag og de sorte Flækker, der korresponderer med Undersidens, matte og næsten forsvindende med Undtagelse af den störste ved Enden af Disk-

feldtet paa Forvingerne, hvilken fremtræder mere markeret. Ligeledes er paa *Undersiden* den rödgule og gulgraa Grundfarve noget afbleget, hvorhos det mørkere rödgule Baand i Udkanten kuns viser sig paa *Bagvingerne*, idet Forvingerne paa Partiet imellem den yderste, sorte Flækkerad og Fryndserne paa ingen Maade er mørkere farvet end den övrige Del af Vingen paa denne Side. Forövrigt bemærkes, at WALLENGRENS Opgave i »Skandinaviens Dagfjärilar» om et for alle fire Vinger paa *Undersiden* hos denne Art »gemensamt mørkare rödgult band i utkanten» heller ikke passer paa Exemplarer fra *Mellemeuropa*, som jeg er i Besiddelse af, og som i denne Henseende stemmer o. s. v. ganske med det her omhandlede Individ fra Ishavets Nærhed.

---

ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS BIBLIOTEK HAR  
ERHÅLLIT FÖLJANDE TILLÖKNING:

Forts. fr. sid. 130.

**Af Académie Royale des Sc. des Lettr. et des  
Beaux-arts de Belgique:**

Annuaire 1882.

» 1883.

Bulletins de l'Académie; 3:me Série T. I—V.

**Af Die Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft  
zu Königsberg:**

Schriften. Jahrgang XXIII. Abtheil. I & II.

**Af Dr. Gustaf L. Mayr:**

MAYR, G. L., IV. Vorläufige Studien über die Radoboj-Formiciden in d. Samml. d. k. k. geol. Reichsanst. — Separat. aus Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1867. B. 17. H. 1.

——, МУРАВЬИ (Formicidæ) etc. Путеш. въ Турк. Т. II. ч. 5. Отд. 7.

——, Die Australischen Formiciden. — Wien.

Forts. sid. 138.