

feldtet paa Forvingerne, hvilken fremtræder mere markeret. Ligeledes er paa *Undersiden* den rødgule og gulgraa Grundfarve noget afbleget, hvorhos det mørkere rødgule Baand i Udkanten kuns viser sig paa *Bagvingerne*, idet Forvingerne paa Partiet imellem den yderste, sorte Flækkerad og Fryndserne paa ingen Maade er mørkere farvet end den øvrige Del af Vingen paa denne Side. Forövrigt bemærkes, at WALLENGRENS Opgave i »Skandinaviens Dagfjärilar» om et for alle fire Vinger paa *Undersiden* hos denne Art »gemensamt mørkare rødgult band i utkanten» heller ikke passer paa Exemplarer fra *Mellemeuropa*, som jeg er i Besiddelse af, og som i denne Henseende stemmer o. s. v. ganske med det her omhandlede Individ fra Ishavets Nærhed.

ENTOMOLOGISKA FÖRENINGENS BIBLIOTEK HAR
ERHÅLLIT FÖLJANDE TILLÖKNING:

Forts. fr. sid. 130.

Af Académie Royale des Sc. des Lettr. et des
Beaux-arts de Belgique:

Annuaire 1882.
1883.
Bulletins de l'Académie; 3:me Série T. I—V.

Af Die Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft
zu Königsberg:

Schriften. Jahrgang XXIII. Abtheil. I & II.

Af Dr. Gustaf L. Mayr:

MAYR, G. L., IV. Vorläufige Studien über die Radoboj-Formiciden in d. Samml. d. k. k. geol. Reichsanst. — Separat. aus Jahrb. d. k. k. geol. Reichsanst. 1867. B. 17. H. 1.
—, МУРАВЬИ (Formicidæ) etc. ПУТЕШ. ВЪ. ТУРК. Т. II.
Ч. 5. отд. 7.
—, Die Australischen Formiciden. — Wien.
Forts. sid. 138.