

UR SKOGSTJÄNSTEMANNENS OFFICIELA
BERÄTTELSE FÖR ÅR 1886

AF

J. MEVES.

På uppmaning från flera håll att i tidskriften offentliggöra de rön om skogsinsekter, som i skogstjänstemännens officiella berättelser år efter år kunna förekomma, får jag, såsom fortsättning af den härom i tidskriftens årgång för 1887 sid. 27 införda uppsats rörande tioårsperioden 1876—85, nu referera, hvad som i denna fråga inberättats angående år 1886.

Då spörsnålet, huruvida den med »grantorka» betecknade kalamiteten är orsakad af de densamma åtföljande insekterna (*Tomicus*) eller icke, ännu står öppet, har det ansetts lämpligt att här fortfarande omförmäla äfven denna.

Norra Fäntlands revir. Jägmästaren E. A. MALMBORG. *Grantorka* till ganska stor utsträckning har under året fortfarit i bestånd, där afverkning föregående vinter försiggick.

Norra Ångermanlands rev., t. f. jägmästaren J. V. WALLROTH. De äldre granbestånd, som under föregående år blädats å Solbergs stockfångstskogar, hafva nästan totalt aftorkat, hvadan all skog där, som kunnat till sågtimmer apteras, måst afverkas, hvarigenom dessa trakter se ut, som om de härjats af skogsinsekter. Dessa hafva äfven här sitt tillhåll, så att de träd, som ännu återstå friska, snart torde blifva angripna.

Södra Ångermanlands rev., Jägmästaren J. F. WALLROTH. I öfre landets socknar börjar granskogen angripas af skogsinsekter, så att å många trakter ganska betydliga vidder däraf torkat

eller äro under torkning. Mest förekommer denna skadegörelse i rena granbestånd å den äldre och medelåldriga skogen, och helst där bländningsafverkning under ett föregående år egt rum.

Gestriklands rev., t. f. Jägmästaren Lektor L. J. HALLGREN. *Grantorkan* fortfar att visa sig å flera pastorsboställens skogar.

Vesterås rev., Jägmästaren J. G. HJELM. Å Ridö kronopark och Siende härads allmänning göra *snytbaggar* stor skada på planteringarne; på förra stället äro omkring 4000 infångade. Erfarenheten börjar alltmer visa, att man till förekommande af dessa härjningar icke bör plantera hyggena förr än fem år efter afverkningen.

Enköpings rev., Jägmästaren S. TRYSÉN. Af *större björkmätaren* (*Amphidasis betularius*) aflöfvades björkbestånd under juni och början af juli månader, hvarest denna lilla insekthärjning småningom afstannade, och träden ånyo löfkläddes.

Örbyhus rev., Jägmästaren A. T. CNATTINGIUS. Det är endast den vanliga *snytbaggen* (*Hylobius abietis*), som inom detta revir utgjort föremål för åtgärder till utrotning, och hafva å Tierps kronopark, hufvudsakligen genom skogsskolans lärlingar, infångats medelst fångbarkar 5100 st., å Tierps allmänning 6850 st. och å Norunda allmänning 79050 st., förutom fångst med fångpålar.

Åkers rev., Jägmästaren C. G. ENGESTRÖM. Den insekt, som gjort största skadan å skogen, är *Tomiscus typographus*. Det är egentligen granskogen, som varit utsatt för dess angrepp. Bland de allmänna skogarne har den vid Gripsholms kungsladugård lidit mest.

Ombergs rev., nuvarande Skogsinspektören F. BAER. På en del skogar synes *mörghorren* hafva uppträdt ovanligt talrikt.

Vadsbo rev., Jägmästaren V. WILKE. *Ollonborrar* gjorde obetydlig skada, och *barkborren*, som visade sig i följd af för honom särdeles gynsam väderlek, blef hållen i vederbörlig begränsning.

Slätthygds rev., Jägmästaren V. F. HAMMARSTRAND. Bland förekommande skadeinsekter har det endast varit *snytbaggen* (*Hylobius abietis*), som åstadkommit någon afsevärd skada å skogen, och har detta synnerligast varit fallet å kronoparken Furubacka, där denna insekt uppträder i oroväckande grad å de

skogsodlade hyggerna och angriper icke allenast de flera år gamla plantorna, utan äfven de efter årets sådder uppkomna. Äfven å häradsallmänningen Rolken har den gjort skada vid skogsodlingarna. Å öfriga skogar har däremot någon nämnvärd olägenhet af insekten ej förmärkts. Under flera år hafva utrotningsåtgärder varit vidtagna, och äfven under året infångning skett med fångbarkar. Vid Furubacka infångades 143000 snytbaggas, och vid Rolken 25000 st.

Hunnebergs rev., Jägmästaren E. LINDBOHRM. *Snytbaggen* har på tvenne skogsblock gjort ej obetydlig skada på yngre kulturer, och *märgborren*, om än i mindre skala än föregående år, hemsökt en del på hyggerna kvarlemnade timmerämnena och något af tallskogen i samma hyggens närhet. De tallar, som under år 1885 lidit mest, syntes dock 1886 till stor del ha börjat repa sig igen.

Svältornas rev., Jägmästaren F. NORDÉN. De angrepp, som skadeinsekterna (*Hylesinus piniperda*) föröfvat, hafva varit af mindre betydelse och på långt när ej af sådan omfattning, som föregående år.*

Tjuts rev., Jägmästaren Frih. A. F. KRUSE. Den insekts-härjning af *Hylesinus piniperda*, för hvilken en del medelålders skog å kronoparken Norra Qvill varit utsatt, kan nu anses i det närmaste hafva upphört.**

Ölands rev., Jägmästaren J. E. BOHRMAN. Medelst användande af fångbarkar hafva insamlats omkring 734,000 *snytbaggas*. För att hålla *barkborrarne* m. fl. inom vederbörliga gränser hafva fångträd användts.

Eksjö rev., t. f. Jägmästaren F. WITT. På hyggerna å kronoparken Visingsö hafva *snytbaggas* uppträdt i myckenhet; insamlade äro 855 centiliter af denna insekt. Dessutom hafva i en del af ekplanteringen *ekvecklare* förekommit i ganska stor mängd.

Åhus rev., t. f. Jägmästaren E. WIMAN. Insekthärjningar äro här mycket besvärliga, och spelar *ollonborren* såsom vanligt hufvudrollen. Årets plantering å Rickarum*** uppåts med

* Jmfr Ent. Tidskr. 1887, s. 30.

** Jmfr Ent. Tidskr. 1887, s. 30.

*** Jmfr Ent. Tidskr. 1884, s. 43; 1887, s. 27.

begärlighet, så att ej mer än omkring 5 procent återstår. Fångstplatser skola därför anläggas för att uppsamla de ägg, som vid år 1887 inträffande svärmning komma att läggas. Likaledes insamlas och förgöres den fullbildade ollonborren. Betydligt lättare skulle denna skadeinsekts utrotande eller åtminstone förminskande vara, om härjningen återkomme fullkomligt periodiskt, men den årliga svärmningen* tager allt större dimensioner, så att den till slut blifver lika rik på individer, som periodiska svärmningarne. Äfven andra insekter hafva under året visat sig i ovanlig ökning, såsom *snytbaggar* särdeles i södra delen af Östra Göinge samt Villands härader. Grankottarne hafva äfven mycket angripits af *Anobium abietinum* och *Tortrix strobilana* .

Engelholms rev., t. f. Jägmästaren V. BRORSTRÖM. Härjningen af *ollonborrlarverna* har varit mindre under året än under föregående år. Försök äro på Kalleberga gjorda att genom inblandning i doppvällingen** af sådana ämnen, som äro för plantrötterna oskadliga, men för larverna menliga eller osmakliga, skydda kulturerna för dessa härjningar.

* Skulle detta möjligen varit *Melolontha hippocastani* ?

** Välling af jord och vatten, hvori plantornas rötter före utplanteringen neddoppas för att hindra deras torkning.