

lum ani). Arten förekommer också i södra och mellersta Sverige spridd ända upp i Upland (*»habitat Upsaliæ»*). Vingformen påminner, liksom antennernas längd, ganska mycket om *Tinea Svammerdamella*, med hvilken arten af L. jämföres. Ordet *»nigræ»*, som L. i beskrifningen tillagt för att närmare beteckna den *»bruna»* färgen på framvingarne, visar att färgen ej är ljusbrun utan mörkbrun. Den är också mörkt brun och blir mörkare hos den torkade insekten. Endast orden *»antennis albis»* tyckas svära emot vårt antagande, då antennerna äro hos *L. albo-guttatus* bruna, men de äro också ända *ut i spetsen försedda med hvita ringar*, hvilka mot basen äro ganska breda. I viss dager skimra också antennerna hvita, så att den tämligen ljusst bruna färgen försvinner för den skarpt hvita. Detta förklarar, hvarför L. vid denna art ansett antennernas färg vara hvit samt anmärkt den såsom sådan just för att därigenom skilja arten från den närmast föregående *Tinea Degeerella*, om hvilken han säger: *»antennæ nigricantes»*. Här inträder således samma förhållande, som vi nyss ofvan anmärkte vid LINNÉ'S *Phr. bilineata*. Ingenting kan därför vara vissare, än att *Tinea Robertella* L. är *L. albo-guttatus*, hvarför vi tilldela denna art det af L. gifna namnet.

NOTISER.

Agrilus Pratensis RATZ.

Denna hos oss mycket sällsynta art anträffades i ett exemplar på Lidingön 1889 af studeranden JOHN PEYRON. Den enda, så vidt jag vet, hittills kända fyndorten är Lärketorp i Östergötland (ZETTERSTEDT) enligt THOMSON. Den sistnämdes uppgift i sitt senare arbete *»Skandinaviens insekter»* att den funnits i Västergötland torde härröra af misskrifning eller tryckfel.

S. L.