

## NYA FJÄRILABERRATIONER.

BESKRIFNA AF

ENZIO REUTER.

**Thyatira Batis** L. ab. **confluens**. — Alis anticis superne basi medioqve sordide rubido-albidis, margine costali ante medium macula fere semiovali sordide fusco-olivacea, ab ea usque in marginem posticum pulvere fuscescenti parce et valde obsolete subfasciatim sordidatis; parte tertia apicali (exteriore) sensim sordide fusco-olivacea, maculis typicis ornata, his posterioribus autem quam in typo multo obsoletioribus; ciliis fuscis unicoloribus; alis posticis ut in typo, sed fascia media pallida obsoletiore; abdomine albicanti (♀).

Denna aberration skiljer sig från hufvudformen därigenom, att basalfläcken, den bakre fläcken vid framkanten samt de båda fläckarne vid inkanten nästan helt och hållet sammanflyta, så att vingarne till  $\frac{2}{3}$  från basen, blott med undantag af en tämligen stor halfoval fläck vid framkanten, äro nästan enfärgadt smutsigt rödhvita; blott öfver midten går en svagt antydd brunstoffig schattering från inkanten till den nyss nämnda fläcken; den yttersta tredjedelen är däremot tecknad ungefär såsom hos den typiska formen, dock äro fläckarne vid inre hörnet mycket otydligare; fransarne äro hos denna aberration enfärgadt bruna, under det de hos hufvudformen afbrytas af tydliga svarta fläckar; bakvingarne likna dem hos hufvudformen, men hafva det bleka mittelbandet mycket otydligare; bakkroppen är något hvitare än hos typen.



Bild. 1. *Thyatira Batis*  
L. ab. *confluens*.

Funnen i endast ett exemplar (♀) på Karkkali udde i Karislojo i Nyland, den 19 juni 1889.



**Zonosoma punctaria** L. ab. **infuscata**. — Sordida, alis fuliginoso-fasciatis, utrinque densius punctulatis, subtus (præcipue al. ant.) nonnihil infuscatis, rubro-indutis, anticis in medio paginæ superioris late saturateque fusco-hepaticoloribus (♂).

Denna nya aberration afviker från hufvudformen genom en öfverhufvud taget dunklare färgton; tvärstrecken äro nötbluna, tämligen smala och svagt färgade, isynnerhet på bakvingarne, där de äro nästan upplösta i fina punkter, på vingarnes undersida endast svagt antydda därigenom att öfversidans teckning lyser igenom; vingarne på båda sidorna något tätare punkterade än hos hufvudformen; undertill, isynnerhet framvingarne, förmörkade genom en brunaktig anlöpning, hvilken tillika företer en isynnerhet mot framvingarnes framkant tämligen stark skiftning i rödt; fläcken på midten af framvingarnes öfre sida tämligen stor och intensivt färgad, chokoladfärgad eller lefverbrun.



Bild. 2. *Zonosoma punctaria* L. ab. *arcufera*.

Endast ett exemplar, en hanne, har af mig blifvit anträffad i en ekdunge på Lenholmen i Pargas socken nära Åbo sommaren 1885.

**Zonosoma punctaria** L. ab. **arcufera**. — Alarum antica- rum fascia mox ante medium introrsum fortiter arcuata, in par- tem quartam basalem cellulæ discoidalis extensa (♀).

Vingarne mycket blekt färgade, fläcken på framvingarne kort före midten — ungefär vid diskfältets yttre ände — starkt inåt bågböjd, sträckande sig till den (från basen räknadt) första fjärdedelen af diskfältets längd, hvarest den gör en svag böjning mot dettas inre hörn; på undre sidan hafva tvärstrecken sitt normala förlopp, men den på öfre sidan gående bågen lyser dock äfven här igenom; främre delen af tvärstrecket — från framkan- ten till det ställe, från hvilket bågen böjer sig inåt — är täm- ligen bred och skarpt markerad.

Äfven af denna nya aberration har jag lyckats fånga endast ett exemplar, en hona, på en med ekar bevuxen skogssluttning på samma holme som föregående, den 27 juli 1888.