

TVÅ NYA SVENSKA SKALBAGGAR

BESKRIFNA AF

B. VARENIUS.

Heterocerus Mölleri n. sp. Oblongo-ellipticus, elytris pube brevissima grisea vestitis, ad humeris distincte, præterea vix punctatis; prothorace valde convexo, densius punctato, ad basin minus profunde impresso; pedibus obscuris geniculis pallidis, tibiis anticis extus spinis 7 instructis. Long. corp. 3,3 mm.

Aflångt oval, elytra med mycket kort gråaktig pubescens knappt, skuldrorna tydligt punkterade, elytras skuldror med tämligen djup buckla, deras främre gula teckningar i form af smala korta strimmor, de bakre af ojämn breda fläckar. Prothorax mycket kullrig, tätare punkterad, vid basen försedd med mindre djupa gropar. Benen mörka med undantag af knäna, som äro ljusa. För öfrigt mindre än *H. fuscus* och å framtibierna försedd med 7 taggar.

Sällsynt, funnen af förf. vid Landskrona.

Megarthrus Thomsoni n. sp. Subparallelus, ochraceus, supra undique rude punctato, prothorace medio late sulcato, elytris minus dense punctatis, abdomine late marginato. — Long. corp. 2,3 mm.

Lergul, jämnsmal, ögon svarta, prothorax bredt rännlad, groft punkterad; elytra starkt, mindre tätt punkterade, benen lergula; abdomen starkt punkterad och groft kantad.

Sällsynt, funnen i Skåne vid Alnarp af förf.