

växt den vistades, samt fann honom alltid mer och mindre inkrupen uti blåbären, hvilka han formligt åt ur, det ena efter det andra.

Under den tid, då blåbären ännu voro omogna, träffades den mer sällan, likväl fann jag äfven då små larver sittande på bären. Längre fram kunde man knappt träffa några mer allmänna larver och de förekommo aldrig på annat sätt än inkrupna i blåbären. Förgäfves sökte jag att få se dem äta blåbärsblad, men fann därvid den sällsynta larven af *Lasiocampa ilicifolia* L., som med god smak förtärde blåbärsbladen, men aldrig rörde frukten.

Uti HÜBNERS arbete öfver larver finnes *Thecla rubi* afbildad dels på *Helianthemum vulgare*, men äfven på *Empetrum nigrum* (kråkbär) och som denna senare växt finnes på samma trakter som blåbären, antyder detta, att larven troligen är en bärätare på icke allenast Myrtillusarter utan äfven andra bärsorter.

Då fjäriln för omkring 14 dagar sedan utkläcktes, erhöj jag bland andra ett exemplar med ett tydligt gröngrått bredt band på öfversidan af bakvingarne samt äfven en ljus fläck på framvingarne. Denna aberration är ej upptagen uti STAUDINGERS katalog eller i något annat arbete, som jag rådfrågat, och är troligen förut ej känd. Exemplet är aflemnadt till Riksmusei Entom. afdelning.

Stockholm den 25 April 1891.

Gottfried Hofgren.

NOTIS.

Med anledning af en i de dagliga tidningarne synlig notis, att herrar SANDIN och WIBERG i Göteborgstrakten anträffat flere exemplar af den sällsynta skalbaggen *Zeugophora Turneri* kan jag upplysa, att riksmusei entomologiska afdelning eger ett svenskt exemplar, som redan 1886 togs vid Skenninge af D:r H. NERÉN och af honom godhetsfullt öfverlemnats till riksmuseum.

Chr. A.
