

Gnophos obscuraria	C. fluctuata	Eurhypara urticata
Ematurga atomaria	C. montanata	Botys prunalis
Halia wauaria	C. ferrugata	Eurycreon verticalis
H. brunneata	C. cæsiata	Pionea forficalis
Scoria lineata	C. cuculata	Orobena extimalis
Ortholitha limitata	C. galiata	Crambus pinellus
Anaitis plagiata	C. albicillata	Aphomia sociella
Cheimatobia brumata	C. alchemillata	Tortrix xylosteana
Eucosmia undulata	C. bilineata	T. ribeana
Lygris prunata	C. trifasciata	Penthina ochroleucana
L. populata	C. corylata	Grapholitha tripunctana
Cidaria dotata	C. comitata	G. cynosbana
C. fulvata	C. silacea	Carpocapsa pomonana
C. ocellata	Eupithecia rectangulata	Hyponomeuta evonymella
C. bicolorata	E. succenturiata	Cnæmidophorus rhododactylus.
C. truncata	E. exigua	
C. viridaria	E. absinthiata	
C. didymata		

Från Hallandsås. Under vistelsen förlidet är på denna mellan Halland och Skåne belägna höjdsträckning användes en och annan ledig stund till insamling af insekter, dock blef ingen annan trakt än Östra Karups by och dess omgivningar för detta ändamål genomströfvad. Utbytet blef jämförelsevis helt ringa, oaktadt jag hade flere medhjälpare, som ifrigt sökte under stenar och på allehanda ställen efter *coleoptera*. Om detta härlledder sig därifrån, att trakten i sig själf är ovanligt fattig på andra skalbaggar än ållonborrar, eller om så var förhållandet blott nämnda år, detta vågar jag ej afgöra. Hvad, som likvälf frapprade mig, var den ovanliga rikedomen på arter af släktet *Carabus*, som trakten ägde. Mina unga samlare lämnade mig nästan dagligen flera exemplar af *C. Nemoralis* och *Cancellatus*, hvilka förekommo i stor ymnighet, samt en och annan *Hortensis*; mindre allmän var *Glabratus*, och af *Nitens*, *Granulatus*, *Clathratus* samt *Violaceus* erhölls endast högst få individer. Af den sällsynta *Arvensis* anträffades blott ett enda exemplar, dock icke på slutningen af åsen, utan i det nedanför belägna låglandet. Ej mindre än nio arter förekommo således inom det lilla området och det är ej osannolikt, att äfven de båda öfriga af släktet, *Catenulatus* och *Convexus*, åtminstone den sistnämnda, där äro till finnandes. *Cychrus Rostratus* och *Calosoma Inquisitor* saknades ej häller på platsen.