

TROPIPHORUS MERCURIALIS FABR.

Dr GEORG SEIDLITZ visar i den 1891 utkomna andra upplagan af hans synnerligen förtjänstfulla arbete: »Fauna Baltica die Käfer» att den art, som i THOMSONS »Skandinaviens Coleoptera» beskrifves under namn af *Tropiphorus mercurialis* FABR., egentligen utgör en sammanblandning af tvenne skilda arter: *T. obtusus* BONSD., FAUV. och *T. carinatus* MÜLL., FAUV. Af dessa passar BONSDORFFS *obtusus* in på THOMSONS beskrifning af honan, under det MÜLLERS *carinatus* är en äldre synonym till FABRICII *mercurialis*.

De båda arterna skiljas lätt medelst de af SEIDLITZ anförda kännetecknen:

T. obtusus BONSD., FAUV. (*lepidotus* HERBST, *mercurialis* ♀ THOMS.) — Elytra vid basen ej bredare än thorax; skulderhörnen ligga an emot bakvinklarna af thorax, och mellanrummen äro ej ribbformigt upphöjda. L. 6 mm.

T. carinatus MÜLL., FAUV. (*elevatus* HERBST, *lapidarius* PAYK., *mercurialis* FABR., *abbreviatus* STIERL.) — Elytras bas tydligt insvängd, bildande en vid båge, och de spetsvinkliga skulderhörnen utstående, öfverskjutande thorax åt sidorna; flera af mellanrummen, äfven de yttersta, tydligt kölade. L. 6—7 mm.

Claes Grill.