

concoloribus pallide cervinis, anticis fascia subbasali alteraque pone medium maculaque costali inter has fascias brunneis, disco inter fascias cinereo, linea nigra transversa ornato, serie submarginali macularum albidarum, intus nigro-marginarum; posticis ut anticis signatis, sed fasciis transversis multo magis approximatis. — Long. alarum exporr. 30—32 mm.
— Fig. 9 b, c.

Java (FRUHSTORFER).

Fam. Drepanulidæ.

17. *Euchera substigmaria* HÜBN. var. *javana* n. var. Mit *E. substigmaria* HÜBN. nahe verwandt und von dieser hauptsächlich nur durch das Fehlen des grossen, runden schwarzen Fleckes auf der Oberseite der Hinterflügel und auf der Unterseite beider Flügel. Die Zeichnung der Vorderflügel etwas veränderlich, bald ziemlich deutlich, bald sehr schwach angedeutet. Kopf schwarz. Flügelsp. 50—66 mm.

Java (FRUHSTORFER).



EINE NEUE LASIOCAMPIDE AUS AFRIKA

BESCHRIEBEN

von

CHR. AURIVILLIUS.

Oplometa n. gen.

A genere *Gonometa*, cui valde affinis, palpis longioribus et crassioribus, capite thoraceque densius pilosis, fronte cornu longo armata, costis 9+10 alarum antifarum longe ante apicem cellulæ egredientes et petiolo communi brevi, apicem cellulæ parum superante præditis nec non costis 7 et 8 ala-

rum posticarum ex eodem loco apicis cellulæ appendicularis egredientes facillime distincta. Forma alarum fere omnino ut in genere *Gonometa*.

1. **Oplometa cornuta** n. sp. Alis anticis valde elongatis, apice acutis supra obscure fusco-brunneis, basi rufescentibus, apice et margine exteriore pallide cervinis, linea submarginali nigra valde angulata, utrinque tenuissime ochraceo marginata; alis posticis subtriangularibus, apice et angulo anali productis, margine exteriore leviter emarginato; supra nigris, disco versus angulum ani obsolete coerulescente-nigantibus, margine anguste cervino; alis subtus nigris costis pallidioribus, marginibus exterioribus latius cervinis; capite supra, collari tegulisque nigro-brunneis, dorso thoracis brunneo? (denudato); dorso abdominis nigro; corpore subtus pallide cervino. — Long. corporis 37 mm., alarum exporr. 62 mm. — Sierra Leona (PREUSS). Collectio STAUDINGER.
-

Massvandring af trollsländor. Vid ett mitt besök i Halmstad den 12 sistlidne juni hade jag tillfälle iakttaga ett visserligen förut rätt ofta sedt, men aldrig af mig observeradt fenomen ur insektlifvet. Kl. 11 f. m. märkte jag först, huru enorma massor af *Libellula quadrimaculata* L. i oafbruten flykt (ingen enda sågs vända ens åt sidorna) drogo från nordvest å sydost, och detta observerade jag under $\frac{1}{2}$ timme. Huru länge på dagen sländorna synts, innan jag blef dem varse, vet jag ej. Vinden var mycket svag, men när täget upphörde, uppstodo något starkare fläktar i samma hufvudriktning som sländorna flögo. De höllo sig lågt — $\frac{1}{4}$ till ett par meter öfver fälten samt lika högt öfver träd eller hus, då sådana kommo i vägen. Tägets bredd utgjorde 300 à 400 steg, dock så att mera spridda individer äfven förekommo utanför denna bredd. Afståndet mellan hvarje slända utgjorde än omkring en half, än 1 till ett par meter.

Den 13 juni fortsattes ej täget, men enligt platstidningarna och enligt meddelande af jägmästaren E. VON PORAT hade ett dylikt två timmar pågående sländtåg iakttagits den 9, och sländskaror drogo äfven den 10 juni på morgonen fram öfver Halmstad.

F. Trybom.
