

**Mamestra Dissimilis** KNOCH som skadedjur. Såsom bekant är, angripa larverna af vissa *Mamestra*-arter i brist på de lägre växter, som utgöra deras vanliga kost, äfven buskar och träd. I vanliga fall är emellertid den skada, de på sådana åstadkomma, ej nämnvärd. — Larven till *M. Pisi* har jag fångat på smärre buskar af lind, lönn och sälg, *Contigua* på sälg och *Dissimilis* på rönn, dock i allmänhet endast i enstaka exemplar. Förhållandena synas emellertid vid andra tillfällen kunna gestalta sig betänkligare. Åtminstone den sistnämnda arten har jag sett uppträda som skadedjur i större skala, och det på en af våra ädlaste buskar, remontantrosorna.

Förliden sommar upptäckte jag på baksidan af ett blad af en »la France» en större samling ägg, som jag genast, på grund af åtskilliga kännetecken antog tillhöra en *noctua*; jag intog äggen för närmare undersökning och efter deras kläckning fordrade jag larverna — till ett antal af ungefär 200 — med rosablåd, då de ännu voro för små för att göra bestämmandet af arten möjligt. Sedermera visade det sig, att de tillhörde *Mamestra Dissimilis* KNOCH. — Under tiden hade jag ej vidare uppmärksammat de öfriga i samma grupp stående buskarna; men då jag senare af en händelse kom att undersöka dem, fann jag, spridda öfver hela gruppen, ungefär ett 50-tal larver af nämnda art, visserligen ännu tämligen små, men dock i stånd till ett i ögonen fallande förstörelsearbete, hvilket de tätt genomstungna bladen på åtskilliga buskar noggsamt visade. Uppenbart är, att om dessa larver, som fullvuxna nå en längd af 4—5 cm., ostördt fått arbeta en något längre tid, betydlig skada skulle ha åstadkommit.

Stockholm, mars 1895.

J. Peyron.