

Cidaria dilutata.	Cochylis dubitana.
» polata.	Penthina sororculana.
» cineraria.	» metallicana.
» cæsiata.	» nebulosana.
» affinitata v. turbaria.	» schulziana.
» subhastata.	» lacunana.
» minorata.	» noricana.
» adæquata.	» bipunctana.
» albulata.	» schæfferana.
» autumnalis (3-fasciata).	Grapholitha solandriana (Larve).
Eupithecia pygmæata.	» aspidiscana.
Scoparia murana.	» sublimana.
» sudetica.	» phacana.
Botys decrepitalis.	Steganoptycha quadrana.
» inquinatalis.	Tinea fulvimitrella.
Crambus maculalis.	Incurvaria vetulella.
» furcatellus.	» oehlmanniella.
» myellus.	Nemophora swammerdamella.
» margaritellus.	Argyresthia curvella (sorbiana).
Myelois annulatella.	Gelechia diffinis.
Tortrix ministrana.	Oecophora stipella.
» cinerana.	» similella.
» rubicundana.	Coleophora laripennella.
Sciaphila osseana.	

J. S. S.

Platypsillus castoris RITS. Denna lilla egendomliga skalbagge lefver som parasit på bäfvern, *Castor fiber* L., och träffas nästan alltid i dess päls. Den saknar ögon, antennerna äro endast tvåledade, med den yttre leden förtjockad, hvarjämte antenner, tibier, prosternums sidor och thorax' bakre hörn äro försedda med långa hårfransar.

I bref berättar skolläraren LOUIS NEBEL i Dessau, att han den 2 april i år fick höra, att en bäfver var skjuten i grannskapet, hvarför han genast begaf sig af för att söka efter den sällsynta skalbaggen. Och ganska riktigt fann han tvenne exemplar. Jag har anfört detta på det entomologerna, där bäfver anträffas, ej må låta ett godt tillfälle gå förbi utan att söka efter detta sällsynta djur.

Claes Grill.