

- DOUGLAS, J. W., Notes on some British and Exotic *Coccide*. — Ent. Monthly Mag. XXIX, p. 130—131. (*Chionaspis sorbi* n. s. från Finland).
- HOFFMANN, A., Fortsetzung zu Schilde's Lepidopterologischen Mittheilungen aus Nord-Finnland. — Stett. ent. Zeit. LIV, p. 121—144. (Nya arter: *Gelechia Ilmatariella*, *Grapholitha Suomiana*).
- MORAWITZ, F., Kareliens Fossoria. — Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, p. 95—115. (Nya arter: *Pompilus signaticeps*, *carinulatus*, *Westerlundii*, *Güntheri*, *Sahlbergi*).
- , Die *Stelis*-Arten von Terijoki. — Hor. Soc. Ent. Ross. XXVII, p. 116—119.
- MORTON, K. J., Notes on *Hydroptilide* belonging to the European Fauna with descriptions of new species. — Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, p. 75—82, with 2 pl. (*Oxyethira ecornuta* n. sp. från Finland).

E. Bergroth.

Blattina (kakerlackorna) i Australien och Polynesien.

Mr J. G. O. TEPPER har i »Transact. Roy. Soc. of S. Australia» för 1892 lämnat ett utförligt arbete öfver dessa *Homoptera* och beskriver ej mindre än 193 arter, representerande 33 genera och 10 familjer, bland hvilka en familj, 3 genera och 55 arter äro för vetenskapen nya. Nämnade världsdelen synes sålunda vara jämförelsevis väl försedd med arter af dessa obehagliga djur, ty, oberäknadt de talrika synonymerna i WALKER'S katalog öfver arterna i brittiska museet, uppskattar BRUNNER VAN WATTENWYL antalet af alla kända arter till 343, bland hvilka 35 hafva en vidsträckt utbredning. Blott 2 äro verkliga kosmopoliter, nämligen österländska kakerlackan (*Periplaneta Orientalis*) och den amerikanska (*P. Americana*). Mr TEPPER lämnar synoptiska tabeller öfver familjerna, men tyvärr ej öfver släkten och arter, ej heller illustrationer. Publikationen är detta oakadt af stort värde. (Ins. Life, VI, 1893, p. 43),

Sven Lampa.
