

FÖR SVENSKA FAUNAN NYA LEPIDOPTERA.

Fyndorten är Färlöf, Kristianstads län, när ej annan plats uppgifves.

Sesia myopiformis BORKH. (Se vidare sid. 72.)

Lithosia arideola HER. Sandmarkerna vid Åhus i furuskog.

Tholomiges turfosalis WOCKE. Hofmantorp (Smål.) och N. Strö (Sk.) på sanka platser. De af mig tagna exemplaren (i synnerhet de, som fångats i det magra Småland) mäta ända till 20 mm. mellan vingspetsarna, hvilket mått icke obetydligt öfverstiger det, som uppgifves i »AURIVILLIUS, Nordens Fjärilar.»

Cidaria capitata, Herr. Sch.

Scoparia laetella ZELL. (^{26/6} 83 äfven i Stockholm af G. HOFGRENS.)

Botys falcatalis GN. (som dock väl knappast är annat än var. af *aurata* *Scop.*) Ovesholm (Sk.).

Botys stachydalis ZCK.

Crambus fulgidellus H. Färlöf och Åhus.

Grapholitha microgammana GN.

Phthoroblastis juliana CURT.

» **motacillana** ZELL. Den ^{26/5} 96 fann jag i N. Strö (Sk.) ett exemplar af denna sällsynta fjäril, sittande på *Salix caprea*. Jag anmärker detta sista därfor, att ovisshet råder om larvens näringsväxt, och som det af mig anträffade exemplaret uppenbarligen var aldeles nykläckt, kan man hafva anledning antaga, att den lefver på *Salix*. Dock bör jag äfven nämna, att flera olika slags löfräd och däribland äfven ek (på hvars galläpplen den antagits lefva) funnos i närlheten.

Phoxopteryx upupana TR. Ovesholm (Sk.).

Fumea betulina ZELL.

Blabophanes imella H.

Tinea cloacella Hw.

Incurvaria Koernerella ZELL.

Lampronia luzella H.

Prays Curtiselus DON. Var. *rustica* HAW.

Depressaria ultimella ST.

Bryotropha decrepitella H. S.

» **Iutescens** CONST. Öfvergångsformer synas mig göra det högst sannolikt, att dessa båda sista ej böra betraktas såsom självständiga arter, utan blott som varieteter af *terrella* V.

Lita junctella DGL.

Cleodora striatella V.

Ypsolophus limosellus SCHL. Åhus.

Sophronia humerella V. Flera af mina exemplar hafva framkantstrimman räckande öfver midten och knappast tillspetsad utåt samt mer eller mindre tydlig början till inkantstrimma, och då de sålunda bilda öfvergångsformer till *chilonella* TR., kan man väl fråga sig, om här verkligen föreligga två skilda arter.

Oecophora similella H. Algutsboda (Smål.).

Limnæcia phragmitella ST. Larven har jag på åtskilliga platser i Skåne anträffat redan tidigt om vårarna i kolfvarna af *Typha latifolia*, ofta till stort antal i hvarje kolf, och den tillbringar helt visst hela vintern därstädes). Den lefver af fröna och förorsakar genom dessas uppåtande, att fjunet lossnar och att kolfven får ett ulligt utseende, hvarigenom larvens närvoro röjes redan på afstånd. Genom att i april eller maj intaga sådana kolfvar, kan man lätt utkläcka fjärilar, men man bör därvid äfven medtaga några icke angripna kolfvar för förpuppningen. — Har säkerligen vidsträckt utbredning i vårt land.

Blastodacna Hellerella DUP. Jfr sid. 72. Besynnerligt nog omnämner icke HEINEMANN, att puppan är i bakre ändan på undersidan försedd med 2 i ögonen fallande, proportionsvis mycket långa, fotlika bihang, uppenbarligen afsedda för puppans framskjutande i gången.

Poeciloptilia aridella HEIN.

Heliozela stannella F. R.

Coleophora viminetella ZELL.

Lithocolletis padella GLITZ.

Aciptilia malacodactyla ZELL., hvars arträtt man dock med HEINEMANN kan starkt ifrågasätta.

Josef Andersson.