

- S. littoralis* L. (DOUGL. & Sc.). Rös vand.  
*S. riparia* FABR. Hatfjelddalen og svensk Skarmodalen.  
*Anthocoris nemorum* L. Ödemark, Botne, Sande, Klovimoen og Hatfjelddalen.  
*Nepa cinerea* L. Lier.  
*Notonecta lutea* MÜLL. Lier.  
*Philænus spumarius* L. Lier, Sandnessjøen, Hatfjelddalen og Rös vand.  
*Centrotus cornutus* L. Botne.  
*Tettigonia viridis* L. Lier (hyppig!).  
*Pediopsis flavicollis* L. Hyppig i Hatfjelddalen.  
*Euacanthus interruptus* L. Sandnessjøen.  
*Cixius nervosus* L. Hatfjelddalen, Rös vand og Klovimoen.
- Kristiania novbr. 1899.

---

#### NOTIOPHILUS LATICOLLIS CHAUD. I NORGE?

I en avhandling av Dr. K. PETRI: »Ueber den Stand der Coleopterenfauna der Umgebung Schässburgs» i »Verhandlungen und Mittheilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften in Hermannstadt» (1891), skrives i en anmerkning følgende:

»Zwei aus Norwegen stammende Exemplare, welche mir als *Notiophilus palustris* zugesendet wurden, zeigen die feineren Punktstreifen, ebeneren Zwischenräume, vollkommen parallelen Stirnstreifen des *N. laticollis* und stimmen auch in der Grösse und in allem übrigen mehr mit *laticollis* als mit *palustris*; auch die Chagrienierung der Zwischenräume der seitlichen Punktstreifen auf den Flügeldecken ist erkennbar, wenn auch etwas schwächer, so dass ich versucht bin, sie zu *laticollis* zu stellen».

Saa vidt Dr. PETRI. Jeg overlader det til coleopterologer av faget at finde ud, om *N. laticollis* virkelig hører med til Skandinaviens fauna eller ikke.

Kristiania <sup>7</sup>/<sub>12</sub> 99.

Embr. Strand.