

TILLÄGG TILL »BIDRAG TILL KÄNNEDOMEN OM  
SVERIGES PSEUDOSCORPIONER».

AF

ALBERT JULLGREN.

H. J. HANSENS uppsats i »Entomologiske Meddelelser udgivne af Entomologisk Forening ved FR. MEINERT, 4 Bd.» med titeln »Organs and Characters in different orders of Arachnide» p. 137 innehåller vissa synnerligen viktiga morfologiska fakta — redan förut publicerade i Naturhist. Tidskr. Kjöbnh 1884 —, hvilka synas undgått nästan alla, som bearbetat denna lilla djurgrupp. Äfven jag förbisåg dem vid nedskrifvandet af min uppsats i förra häftet af denna tidskrift. I anslutning till HANSENS åsikter får öfversikten af systemet följande lydelse:

**Chelonethi** THOR. (**Pseudoscorpiones** LATR.).

- I. Kroppen mer eller mindre plattad. Små chelicerer. Serrulan<sup>1</sup> utesfer hela sin längd fästad vid chelicerernas rörliga finger Subordo I. **Panctenodactyli** BALZAN.
- A. De båda första benparens *femora* odelade eller med en basal trochantin . . . Fam. I. **Cheliferidæ**.

<sup>1</sup> *Serrula* = kamlikt organ på chelicerernas rörliga finger.

- a. *Femora* utan trochantiner S. F. 1. **Cheiridinæ.**  
Gen. *Cheiridium.*
- b. » med » S. F. 2. **Cheliferinæ.**  
Gen. *Chelifera.*

B. De båda första benparens *femora* delade i en längre basal och en kortare tibial del Fam. 2. **Garypidæ.**  
Gen. *Garypus.*

II. Kroppen n. cylindrisk.

Stora chelicerer. Serrulan upptill fri . . Subordo 2. **Emictenodactyli** BALZAN.

A. De båda främre benparens tarser 2-ledade Fam. 1. **Obisiidæ.**  
Gen. *Obisium.*

B. » » » 1-ledade Fam. 2. **Chthoniidæ.**  
Gen. *Chthonius.*

Hufvudskillnaden mellan detta och det i min uppsats publicerade systemet ligger uti placeraudet af släktet *Cheiridium*. Man har nämligen ansett, dels att denna form endast har 10 abdominalsegment, och dels har man orätt uppfattat *femora* på de båda främre benparen. HANSEN har emellertid i nämnda arbeten påvisat, att det äfven hos detta släkte finnes 11 segment, och detta kan man lätt öfvertyga sig om, om man ser djuret rätt bakifrån, då det elfte segmentet framträder i form af en liten fin, odelad list. Beträffande femoras byggnad hos respektive släkten framhåller HANSEN, att man bör anse det hos *Cheiridium* vara odeladt, hos *Chelifera* deladt i *trochantin* och *femur*, hos *Garypus* deladt i *pars basalis* och *pars tibialis*, af hvilka den senare är kortast. Till följd af denna uppfattning, som utan tvifvel är riktig, blir släktet *Cheiridium* uppryckt i systemet, och öfversikten af familjer och släkten bör därför ha det ofvan anförda utseendet.

Ups. 4 dec. 1899.