

NÅGRA AF HERR INGENIÖR P. DUSÉN I CHILI OCH  
ARGENTINA INSAMLADE HEMIPTERA, BESTÄMDA

AF

C. J. EMIL HAGLUND.

Herr Ingeniör P. DUSÉN, en af deltagarna i den Svenska Expeditionen till Magellansländerna åren 1895—97, besökte på återresan i slutet af 1896 och början af 1897 en del af Chili och Argentina för att därstädes göra naturvetenskapliga iakttagelser och insamlingar. Genom Herr Prof. CHR. AURIVILLIUS' välvilja har jag blifvit satt i tillfälle att undersöka och bestämma de få hemförda Hemiptererna. Den lilla samlingen innehåller endast 7 fullt utvecklade arter, men dessutom en del larver och nymfer, hvilka, med den kännedom af dessa traktens Hemipterfauna, vi för närvarande äga, icke kunna bestämmas. Åtminstone trenne af dessa ej fullt utbildade arter tillhöra med full säkerhet andra än de här uppräknade arterna; en är en larv af någon *Salda*-art.

Ehuru samlingen sålunda är ganska obetydlig, innehåller den dock, såvidt jag kunnat utröna, 2 för vetenskapen nya arter. Dessutom erbjuder hvarje bidrag till kännedomen om dessa djurs utbredning, huru obetydligt det än kan synas, alltid något af intresse.

De insamlade arterna äro:

*Nezara apicicornis* SPIN. 1 ♀. Chili, Santiago <sup>10</sup>/<sub>s</sub> 96.

*Planois bimaculata* SIGN. 3 ♂♂, 2 ♀♀. Chili, Rio Aysén.

*Ditomotarsus Gayi* SPIN. 4 ♂♂, 3 ♀♀. —, —.

*Imbrius chilensis* n. sp. 2 ♀♀. —, utan speciel lokal.

*Hammatocerus Gayi* SPIN. 1 ♂. Argentina, Ensenada.

*Miris Dohrni* STÅL. 7 ♀♀. Chili, Rio Aysén. Febr. 97.

*Aphrophora Duséni* n. sp. 1 ♂, 1 ♀. —, —.

**Imbrius chilensis**, HAGL. n. sp. Testaceus, capite, parte anteriore pronoti, scutello, basi, fascia indistincta media et margine apicali corii nec non sternis magis ferrugineis; linea levigata media partis anterioris pronoti, maculis supracoxalibus et angulo apicali externo metasterni pallidis; articulo ultimo antennarum et unguibus + infuscatis. ♀. Long. c. membr. circ. 4 millim.

*Imbrio ferruginoso* STÅL similis et affinis, paululum major, præsertim latior, punctura paulo subtiliore et multo remotiore, præsertim pronoti, distinctus. Mesopleuræ interdum macula nigra notatæ, interdum immaculatæ. Inter *Ischnorhynchum* FIEB. et *Imbrium* STÅL fere medius. *Imbrius* ab *Ischnorhyncho* me iudice parum distinctus; orificiis in lobum non productis forsitan optime dignotus.

**Aphrophora Duséni** HAGL. n. sp. Viridis ♂, virescenti-testacea ♀, fortiter punctata, litura subbasali longitudinali, macula minuta costali ante medium, fascia media lata apiceque tegminum fuscis; litura basali fascia media fere conjuncta; parte costali fasciæ mediæ tegminum, segmentis ventralibus medio et segmento genitali apud marem nec non unguibus nigris; signaturis apud marem solito more distinctioribus quam apud feminam ♂♀. Long. ♂ 6, ♀ 8 millim.

Caput latum, obtusum, parum rotundato-productum, vertice non carinato. Habitu et magnitudine *A. quadrinotata* SAY similis et affinis, paulo latior, capite latiore, minus producto, vertice non carinato et punctura multo fortiore ac remotiore mox distincta.