

är tagen af EDGREN i Västergötland. Sedermera fann herr S. A. VON POST ett ex. på samma ställe; hvarjämte den äfven i ett ex. samma sommar af rektor RINGSSELLE infångades i Nerike. Under en utflykt till trakten af Eksjö försommaren 1893 anträffade S. på *Mentha* vid sjön Hunsnäsen två ex. af *Ceuthorrhynchus melanostictus* MARSH. (= *Stenbergi* THOMS.), hvilken förut endast är funnen i Skåne vid Stehag af STENBERG och vid Lund af C. ROTH samt i Södermanland af adjunkten AHLROT. Vid samma tillfälle togs äfven vid Eksjö den mycket sällsynta *Bembidium paludosum* PANZ. i flera ex. De hemfördes i tanke, att det var *B. velox* L., och upptäcktes det först långt senare hvilket värdefullt fynd här gjorts. *B. paludosum* är nämligen förut funnen en enda gång i vårt land, äfven då i Småland af prof. BOHEMAN, hvilken ej närmare angifvit lokalen. I Norge har B. LYSHOLM funnit den allmänt i trakten vid Trondhjem samt engelsmannen d:r T. A. CHAPMAN vid Bossekop vid Altenfjord 1898, hvarföre den nog ej är så sällsynt som hittills antagits, utan i allmänhet förväxlats med *B. velox*. *Carpalimus arcuatus* STEPH. (= *scrobiculatus* THOMS.) har visserligen anträffats från Skåne upp till Södermanland, men i Göteborgstrakten erhöles denna insekt första gången i siktgods från Götaälfs strand invid den nyanlagda Västgötabanan af fördelningsläkaren d:r A. H. WESTMAN. Vid detta senare ställe anträffades äfven den ännu sällsyntare *Pycnoglypta lurida* GYLL. i talrika ex.

---

DEN 24 MARS 1900.

Herr I. B. ERICSON från Mölndal lämnade ett meddelande om: »En entomologisk sommarutflykt inom östra Sverige år 1899». Färden, som företogs i sällskap med godsägaren S. A. VON POST, ställdes först till Kalmar, där man lyckades bland annat infånga *Aphodius scrofa* FABR., *Hedobia imperialis* L. och *Ptinus rufipes* FABR. Från Kalmar begaf man sig öfver till Öland, där ERICSON redan en af de första dagarna (den 22 juli) hade den stora lyckan att finna ett honexemplar af *Ptomaphagus sericatus*

CHAUD. i närheten af Borgholms ruin. Förut är i Sverige endast ett hanexemplar af denna skalbagge infångadt af herr L. HAGLUND på fastlandet i närheten af Kalmar. Bland »sällgods», som insamlades från en löfkompost vid Borgholms ruin och sändes till Mölndal för att vid hemkomsten undersökas, fann ERICSON de sällsynta *Colyptomerus enshamensis* STEPH. och *Colenis dentipes* GYLL. Från Öland ställdes färden längs ostkusten upp till VON POSTS egendom Åsgård i Södermanland. Storm och regn under denna annars så ovanligt regnfattiga sommar gjorde, att under färden föga kunde insamlas. Under vistelsen vid Åsgård fann man dock, bland mycket annat, följande mera sällsynta djur: *Colon serripes* SAHLB. (= *simplex* THOMS.) och *Eutheia Schaumii* KIESW., båda nya för Södermanland, *Dryophilus pusillus* GYLL., *Diphyllus lunatus* FABR., *Phosphaenus hemipterus* GOEZE, *Lixus paraplecticus* L., *Tropideres niveirostris* FABR., ny för Södermanland, samt *Exochomus quadripustulatus* L. Vid en utfärd till Gimmerstad anträffades i talrika ex. den för Södermanland nya *Pria dulcamaræ* ILL.

Göteborgskretsens sekreterare, herr EMIL SANDIN, lämnade härefter några »Meddelanden om entomologiska fynd i Göteborgstrakten», hvilka komma att såsom särskild uppsats inflyta i tidskriften, hvarefter undertecknad refererade en del ytterst intressanta fynd af skalbaggar, som under de tre senare åren gjorts af den framstående entomologen E. A. LÖVENDAL i Danmark, och hvilka äfven för oss svenskar böra vara af intresse att känna. Bland annat hade han funnit den sällsynta *Ochthebius auriculatus* REY, KUW., hvilken förut endast är känd från Calais, Dieppe och Borkum. År 1897 tog LÖVENDAL densamma första gången vid Esbjerg på Jyllands västkust. Uppmärksam på densamma, återfann han den i gamla samlingar, tagen dels vid Vejle på Jyllands ostkust och i Köpenhavns omgifningar. År 1898 söktes den förgäfvos vid Esbjerg, likaså år 1899. Men en dag hade LÖVENDAL och herr JENSEN-HAARUP begifvit sig öfver från Esbjerg till Fanö, där de vid tidvattnets stigande häfvade i själfva vattnet under det de drogo sig tillbaka. Nu visade det sig, att de i håfvarna hade fångat *O. auriculatus* i hundradetal. LÖVENDAL erinrade sig nu äfven, att första fynden vid Esbjerg blifvit gjorda efter sedan en skarp storm drifvit tidvattnet ovanligt högt

upp på land och där afsatt en mängd tång, som vid ebben sedermera ej kunde föras till hafs igen. Då insekten blifvit tagen i Kjöbenhavns omgifningar, kan ju tänkas, att den äfven kan förekomma vid Sveriges och Norges västkust, om den sökes på rätt sätt, d. v. s. genast efter en starkare västlig storm. Vid Esbjerg har LÖVENDAL äfven lyckats finna en annan för den skandinaviska norden ny insekt *Ochthebius obscurus* DEJ., REY. Först bestämde han den till *O. margipallens* LATR., som den äfven mycket liknar. Men *O. margipallens* har ett par glänsande, hårlösa fält på metasternum, hvilka ej förefinnas hos *O. obscurus*. Arten är sedermera äfven funnen på Lollands sydkust af ingenjör ENGELHART. Också här hafva vi ett »gif akt!» till våra entomologer. Den i undertecknads »*Catalogus Col.*» såsom synonym till *Ochthebius bicolor* GERM. upptagna *O. rufomarginatus* ER., THOMS. visar LÖVENDAL vara en fullt själfständig art, då den är mindre än *bicolor*, har en röd kant omkring thorax, är mera hvälfd samt har djupare fåror och högre intervaller; hela byggnaden är dessutom kortare än *bicolors*. Äfven förekommer den mest (ej alltid) i färskt vatten, under det *bicolor* uteslutande synes vara hänvisad till brakvattnet. I bref påvisar LÖVENDAL också en annan sak af intresse. *Phaleria cadaverina* FABR., hvilken äfven hos oss är tagen i Skåne, har kallats för *Ph. cava* af G. SEIDLITZ, hvilken i skarpa ordalag upptuktat en fransman, som ej ansåg sig kunna gå in härpå. I FABRICII verk angifves *cadaverina* »e Germania», hvilket »Germania» SEIDLITZ vill utsträcka ändå till Adriatiska hafvet. Men om FABRICII typ vore tagen vid Adriatiska hafvet hade han nog, såsom LÖVENDAL mycket riktigt anmärker, helt säkert skrivit »ex Austria». Nu finnas ju FABRICII typer i Kjöbenhavn, hvadan det var lätt att konstatera det SEIDLITZ i detta fall haft orätt. I undertecknads »*Catalogus Col.*» står äfven vid *Phaleria cadaverina* FABR. infördt »sec. specim. typ. (AURIVILLIUS)». Vi måste sålunda efter LÖVENDALS och prof. CHR. AURIVILLII afgörande dom fortfarande anse den i Sverige och Danmark förefintliga arten för *Ph. cadaverina* FABR. och överlämna SEIDLITZ' *Ph. cava* såsom en helt annan art till Adriatiska hafvets område.

Efter sammanträdets slut vidtog, såsom vanligt, ett angenämt aftonsamkväm.

Claes Grill.