

RONNEBYTRAKTENS PSEUDONEUROPTERA.

I. ODONATA.

AF

JOHN AGARDH WESTERLUND.

I. Fam. Libellulidæ.

Libellula LIN.**L. quadrimaculata** L. Mycket allmän.

L. depressa L. Endast anträffad på några få ställen i trakten, näml. vid Herrstorp (2 ex. ♀ d. 2 juni 1889), vid Hulta (2 ex. ♂ d. 3 juni 89), vid en damm (nu utdikad) strax norr om »Bruket», samt vid Tornerydbäcken, på båda sistnämnda ställena dock täml. talrik.

L. fulva MÜLL. Sälls. 1 ex. (♂) togs på Funkabo d. 5 juni 89. Förut endast påträffad sälls. i Skåne.

L. cancellata L. Tämligen allmän på flera ställen, ss. vid Herrstorsjön, Lindkullen, Skärsjön och Kroksjön.

L. coerulescens FABR. Denna sällsynta slända, som förut endast är anträffad vid Gusums bruk i Östergötland, togs första gången här i trakten af min far, d:r C. AG. WESTERLUND, i medio af augusti 1863, samt för andra gången tio år därefter d. ²³/₇ 73 på en åker ej långt från Herrstorsjön. Tio år förflöto åter, utan att den visade sig här, tills det lyckades mig att i juli 1883 fånga 1 ex. (♀) på bergen strax ofvanför Dalastugan. Åter försvunnen några år, dock denna gång ej flera än 5, hvarpå den återfanns på sensommaren 1888 i stort antal vid Skärsjöns norra och västra stränder, där den under soliga och lugna dagar påträffades, helst sittande på berghällar och stenar.¹

¹ Anträffades allmän vid Hallasjön i Blekinge den 16 juli 1899 af d:r Y. SJÖSTEDT. Red.

L. vulgata L. Täml. allmän, ss. vid Skärsjön, på en sum-
pig äng strax norr om »Bruket», m. fl. ställen.

L. sanguinea MÜLL. Talrikt förekommande vid bäcken
på Funkabo och på en sank äng nära ån strax nedanför Silfver-
forsen.

L. flaveola L. Allmän på flera ställen, ss. vid bäcken på
Funkabo, vid Storakurra, på en äng strax norr om »Bruket», vid
Skärsjöns stränder, m. fl. ställen.

L. scotica DON. Endast på några få ställen här i trakten
har jag observerat denna art, och, ss. på Funkabo, vid Silfver-
forsen och vid några kärr nära Djupadal, blott ett par ex. En-
dast vid Tornerydbäcken har den förekommit talrikare, så att
jag den 18 och 20 sept. 88 fångade inalles 16 ex., däraf 6 ♀.

L. dubia VAN D. LIND. Sällsynt, blott 1 ex. fångadt d.
²²/₆ 88 vid västra stranden af Skärsjön.

L. rubicunda L. Ej allmän, men tagen på flera ställen,
ss. vid Tresjön, Långasjön, vid bäcken på Funkabo samt vid en
damm nära Herrstorp.

L. albifrons BURM. Sparsamt förekommande vid Skärsjöns
och Tresjöns stränder.

L. caudalis CHARP. Denna vackra slända, hvilken länge
betvivlats tillhöra den svenska faunan, har jag under sommaren
1888 påträffat såväl vid Skärsjöns som Herrsjöns stränder, på
båda ställena täml. allmän, samt äfven fångat ett par ex. vid
den lilla sjön »Trollsjön» i skogen vid Hälsobrunnen.²

Epitheca CHARP.

E. bimaculata CHARP. Sälls. Endast 1 ex. (♂), taget af
mig vid stranden af Herrsjön d. 26 juni 1888.

Cordulia LEACH.

C. metallica VAN D. LIND. Täml. allmän, fastän blott en-

² Var mycket allmän vid Viksjön nära Krokeks gästgifvaregård å Kol-
mården år 1882 enligt meddelande af d:r C. J. E. HAGLUND; äfven träffad
i Helsingland af J. RUDOLPHI.

Red.

staka, ss. vid Skärsjön, Herrstorpsjön, Silfverforsen, i skogen mellan Persborg och Torneryd, vid Långasjön etc.

C. alpestris DE SELYS. Sällsynt, blott 1 ex. fångadt af mig d. ²⁶/₆ 88 vid stranden af Tresjön. Förut ej anmärkt söder om Värmland.

C. ænea LIN. Allmän flerstädes här i trakten, ss. vid Skärsjön, Tresjön, Herrsjön, Trollsjön, vid en damm nära Herrstorps gård vid Angelskogsån m. fl. ställen.

Gomphus LEACH.

G. vulgatissimus LIN. Denna äfven i Sveriges öfriga provinser ganska sällsynta slända har jag här i trakten endast observerat på tvänne skilda platser, näml. vid Herrstorpsjöns norra och västra sida, där jag fångat 3 ♀♀ och 3 ♂♂ samt i skogen vid Dalastugan, där 1 ♀ påträffades.

G. forcipatus LIN. Sälls. 1 ex. fångades vid Djupadal d. ⁵/₇ 88 och i medio af augusti samma år ytterligare några ex. vid den ej långt från Djupadal belägna Silfverforsen. Följande år togs 6 ex. (alla ♂♂) vid Herrsjön.

Cordulegaster LEACH.

C. annulatus LATR. Sparsamt, men här och där förekommande, ss. vid Silfverforsen, Djupadal, Herrstorpsjön, Långasjön, Hynnekulla, Funkabo, Herrsjön, m. fl. ställen.

Aeschna FABR.

A. pratensis MÜLL. Täml. sparsamt förekommande på ett par ställen, ss. vid Skärsjöns södra och västra strand samt vid norra ändan af Herrstorpsjön. Vid ån strax norr om »Bruket» har jag äfven fångat 1 ex.

A. cyanea MÜLL. Sällsynt. Tre ex. fångade här i trakten, näml. 1 vid bäcken på Funkabo d. ²¹/₈ 88, 1 vid Troll-

sjön d. $16/8$ 82 samt 1 ex. vid en nästan uttorkad bäck i skogen mellan Persborg och Lindbloms kyrkogård.

A. juncea LIN. Sällsynt. Jag har endast lyckats fånga 1 ex., näml. en ♀ vid Tornerydbäcken d. $20/9$ 88.

A. grandis LIN. Allmän flerstädes, ss. vid Skärsjön, Herrstorpsjön, Trollsjön, vid bäcken på Funkabo, vid Silverforsen, Djupadal, Torneryd, m. fl. ställen.

II. Fam. Agrionidæ.

Calopteryx LEACH.

C. virgo LIN. Allmän flerstädes vid rinnande vatten, ss. vid Ronnebyån ofvan vattenfallet, vid Sörby bäck, Hynnekullabäcken m. fl. ställen.

C. splendens HARRIS. Träffas merendels tillsammans med föregående art, men är dock ej så allmän som denna.

Lestes LEACH.

L. nympa DE SÉLYS. Allmän flerstädes, ss. vid norra och västra stränderna af Skärsjön, vid en damm nära Herrstorps gård, vid Djupadal, Långasjön, Torneryd, på Funkabo m. fl. ställen.

L. spona HANSEM. Täml. sällsynt. Denna art tyckes ej på långt när vara så allmän här i trakten som föregående, och har jag observerat den endast på några få ställen, ss. vid Torneryd och Göholm, där ett par ex. tagits, samt vid ån strax nedanför Silverforsen, där jag fångat ett 10-tal ex.

Platycnemis CHARP.

P. pennipes PALLAS. Ej sällsynt. Denna, genom sina utvidgade och borstbesatta skenben så utmärkta art, synes ej vara så sällsynt i Ronnebytrakten utan på sina ställen täml. tal-

rik, ss. vid bäcken på Funkabo, vid Dalastugan, vid ån strax norr om Djupadal, på ängarna vid »Bruket», m. fl. ställen.

var. *lactea* förekommer äfven flerstädes.

Agrion FABR.

A. najas HANSEM. Sparsamt, men här och hvar förekommande, ss. vid Skärsjön, Tresjön, Herrsjön, Djupadal, Angelskogsån, Kroksjön, Lindkullen, m. fl. ställen.

A. minium HARRIS. Täml. allmän. Denna lilla vackra slända, som i det öfriga Sverige förekommer tämligen sparsamt, har jag här i trakten funnit vara ganska allmän; så har jag på flera ställen påträffat den i ganska stort antal ex., ss. vid bäcken på Funkabo, vid en damm strax norr om »Bruket» nära ån, vid Angelskogsån samt vid Djupadal. Äfven har jag fångat den vid lerdammarna vid Bustorp, vid Tornerydbäcken och vid bäcken mellan Långasjön och Kroksjön.

A. elegans VAN D. LIND. Tämligen allmän flerstädes i trakten, ss. vid Herrstorpsjöns norra ända, vid Lindkullen, Kroksjön, vid ån nära Djupadal, vid Skärsjöns norra och västra strand samt på Karön, där jag fångat ett ganska stort antal ex., isynnerhet vid en liten vik nära »Torpet».

A. elegantulum ZETT. Denna mycket sällsynta slända, som förut i Sverige blott är observerad i Lappland och i Skåne nära Lund, har jag fångat på tvänne ställen här i trakten. Första gången den 27 juni 1883, då jag vid bäcken på Funkabo lyckades fånga 1 par (♂ & ♀); och den andra den 19 juli 1888, då jag tog 3 ex. (alla ♀), vid en liten bäck, som förenar Långasjön med Kroksjön.

A. pulchellum VAN D. LIND. Täml. allmän flerstädes ss. vid Skärsjön, Långasjön, Djupadal, vid en damm nära Herrstorps gård, vid lerdammar på Bustorp och vid Angelskogsån; på sistnämnda ställe mycket talrik.

A. puella LIN. Allmän vid nästan alla bäckar, sjöar och kärr, isynnerhet har jag tagit den i mängd vid ån strax norr om Djupadal, vid Angelskogsån, Skärsjön, Funkabobäcken m. fl. ställen.

A. hastulatum CHARP. Ej allmän, men flerstädes förekommande, ss. vid bäcken på Funkabo, vid de små dammarna strax norr om »Bruket» nära ån, vid Skärsjön, Tresjön, Långasjön, vid en damm nära Herrstorps gård, vid Bustorps lerdammar och vid ån strax ofvanför Djupadal (här talrik).

A. lunulatum CHARP. Sällsynt. Endast 2 ex. tagna vid stranden af Skärsjön d. 27 juli 1888.

A. cyathigerum CHARP. Allmän flerstädes, ss. vid Skärsjön, Herrstorpsjön, vid en damm mellan Brunnen och Bustorp, vid ån strax norr om »Bruket», vid en damm nära Herrstorps gård, vid Göholm, på Karön m. fl. ställen.

NOTISER.

En skalbagge, som hittills mycket sällan påträffats i Sverige, är *Bembidium Nigricorne* GYLL. GYLLENHAL säger: »Habitat in arenosis passim» och THOMSON anför arten, troligen med anledning häraf, såsom: Sällsynt; funnen i Västergötland af GYLLENHAL. I GRILLS katalog äro blott två lokaler till upptagna, nämligen Halland (Fjärås) och Dalarna (Säter). Enligt uppgift fann konservator H. MUCHARDT ett exemplar den 4 sistlidne maj på en vägg i Helsingborg och ett annat vid Ringsjön. Arten synes alltså vara tämligen utbredd, fast mycket sällsynt.

Herr M. uppgifver äfven nya lokaler för några andra skalbaggar, näml.: *Anthaxia Morio* FAB., *Clerus Rufipes* BRAHM och *Microcara Bohemani* MANNHM., alla anträffade den 22 juni vid Markaryd i Småland, samt slutligen *Cryptophagus Labilis* ER., förut funnen endast i Skåne och vid Stockholm.

Sven Lampa.
