

FÖR FINSKA FAUNAN NYA INSEKTER.

Ur »Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica», tjugusjette häftet, 1899—1900, hvilket blifvit mig tillsändt, tager jag mig friheten anföra följande från redogörelserna vid nämnda sällskaps sammanträden. Vid dessa förevisades eller omnämndes såsom ej förut inom landet funna insekter:

Lepidoptera.

Cerostoma Nemorella L. erhölls på en liten mosse vid Käppäselkä i Onega-Karelen den 19 aug. 1896. Denna tineids förut kända nordligaste fyndort i Europa är belägen i Östersjö-provinserna (B. POPPIUS).

I Sveriges södra och mellersta landskap äfvensom i Norge skall den enligt WALLENGREN vara funnen.

Catocala Promissa ESP. anträffades i september 1899 å Runsala ö invid Åbo af G. WAHLSTRÖM (J. SAHLBERG).

Anarta Melanopa THBG. är funnen vid Nuorunen af J. E. ARO. Var förut känd endast från Kolahalfön. — Detta är ganska märkvärdigt, emedan arten ej är sällsynt i norra Sverige och alltså borde finnas äfven i det mellanliggande, egentliga Finland.

Mamestra Persicarie L. Fångades å Föglö på Åland af A. NORDSTRÖM (E. REUTER).

Lymantria Monacha L. I TENGSTRÖMS katalog öfver Finlands fjärilar omnämnes nunnan såsom finsk, hvilket sedermera trots vara ett misstag. I augusti 1899 anträffades dock exemplar af densamma af disponenten I. LINDQUIST, hvilket sändes till svenska Riksmuseum för granskning. Fyndorten var närlheten af Viborg (E. REUTER).

Lycæna Baton BERGSTR. är funnen vid Nyby af d:r R. FABRITIUS (E. REUTER).

Coleoptera.

Platambus Maculatus L. ab. *Aterrima* J. SAHLBG är funnen af W. PYLKÄNEN och beskrifves af SAHLBERG å sid. 71. Hela insekten är svart, med obetydlig metallglans.

Stenus Cordaticollis LEINBERG. En *St. Bupthalmus* GRAV. närlägande art, som beskrifves af kand. A. LEINBERG. Den är funnen i endast ett exemplar vid Storby på Åland (Mus. Helsingfors).

Necrobia Rufipes FAB. anträffades på zoologiska musenm i Helsingfors, antagligen inkommen med däggdjurshudar från sydligare beläget land. (J. SAHLBERG).

Cryptophagus Plagiatus POPPIUS, nära besläktad med *Cr. Fasciatus* KR., är beskrifven af B. POPPIUS från ett enda exemplar, funnet vid Hakokoski, nära floden Patsjoki i nordligaste Lappland i augusti 1897. (Mus. Helsingfors).

Cr. Cylindrus KIES. är tagen i ett exemplar vid Helsingfors af prof. J. SAHLBERG.

Ilyobates Nigricollis PAYK. funnen vid Lojo af A. LUTHER.

Otiorhynchus Raucus FAB. vid Nystad af H. SÖDERMAN (B. POPPIUS).

Hypera Punctata FAB. funnen på Åland vid Eckerö af kand. A. LEINBERG (J. SAHLBERG).

Tribolium Madens CHARP. anträffades af H. SÖDERMAN i två exemplar, det ena under en sten, det andra flygande vid Nystad. Har förut ej observerats norr om Riga och Dorpat och hvarken i Danmark eller Sverige. Släktet var i Finland förut representeradt endast af en art, nämligen den med handelsvaror inkomna *Tr. Ferruginum* FABR. (B. POPPIUS). — I Sverige hafva på ena handa sätt införts två arter, nämligen den nyss nämnda samt *Tr. Confusum* Duv.

Diptera.

Systoechus Leucophaeus MEIG. funnen vid Tuovilanlaks.

Volucella Inanis L. har fångats af K. A. NURMI vid Sonboda i Föglö på Åland. (J. E. ARO). — Är enligt ZETTERSTEDT tillvaratagen på flera ställen af södra Sveriges fastland, äfvensom på Öland och Gotland. Larven skall lefva i getingbon.

Sven Lampa.