

NÅGRA BIDRAG TILL KÄNNEDOMEN OM SVENSKA HYMENOPTERERS GEOGRAFISKA UTBREDNING.

(Forts. från Årg. 21, pag. 201—208).

Anteckningar från exkursioner i Östergötland, sydvästra Småland, Öland och Skåne under åren 1900 och 1901. — Bestämningarna med ledning af hufvudsakligen WESMELS och THOMSONS, delvis äfven HOLMGRENS och BERTHOUMIEU's arbeten. Nomenclatur och uppställning i allmänhet enligt THOMSON.

AF

H. NORDENSTRÖM.

Ichneumonides.

Ichneumonides oxypygi & amblypygi:

Eupalamus oscillator (WESM.), ♀; ÖG.: St. Lars, ängsmark 13.9;
»täml. sälls.» THOMS.

Chasmodes lugens (GRAV.), ♀; ÖG.: St. Lars, i granstubbbar
15.10; ett ex. 20 mm. i längd.

Ichneumon fusorius (LIN.), ♂; kläckt 10.1 1902 ur en puppa
(af *Sphinx pinastri* enligt benäget meddelande fr.
prof. LAMPA) tagen 19.10 1901 under mossa på ste-
nar vid Linköping; längd 26 mm. (= *Amblyteles f.*).

» *bucculentus* (WESM.), ♂, var. *segm. 7 albomaculat.*;
ÖG.: Åtvid, gräsmark 8 o. 12.7; Mjölby, under mossa
på stenar 27.10.

» *gracilentus* (WESM.), ♂; ÖG.: Åtvid, gräsmark 8 o.
27.7; St. Lars, barrskog, i flykten.

» *tuberculipes* (WESM.), ♀; ÖG.: St. Lars, granstubb
11.10.

» *nigritarius* (GRAV.), ♂, var. *antenn. fuscoannulat.*;
ÖG.: Kärna, på klöfver 16.8; ♀. var. *tibiis haud
alboannulatis.*

» *albosignatus* (GRAV.). ♂; Sk.: Röstånga, 21.6; ÖG.:
Kärna, på klöfver 16.8.

- Ichneumon tergenus* (GRAV.), ♀; ÖG.: St. Lars, ängsm.
Amblyteles divisorius (GRAV.), ♀, var. *abdom. toto nigr.*; ÖG.:
 Åtvid, gräsm. 8.7 (ad *A. fossorius* GRAV.; i hvar-
 andra öfvergående arter?); ♂, St. Lars, barrskog, i
 flykten.
 » *funereus* (GRAV.), ♂; ÖG.: Skeninge, på sandplaner
 14.8; sälls. enl. THOMS.
 » *castigator* (GRAV., FABR.), ♀; Sk.: Stehag, 22.6;
 ÖG.: Mjölby, Kärna, på järnvägsbank (gräsm.) 22 o.
 27.9; enl. THOMS. ♀ sälls.
Alomyia ovator (GRAV.), ♀; ÖG.: Linköping, i trädg. 7.6; ♂
 var. *abdom. toto nigr.* 15.6, d:o.

Ichneumonides platyuri:

- Eurylabus torvus* (WESM.), ♀; ÖG.: Linköping, gräsmark 9.6;
 »sälls.» (HOLMGR. & THOMS.).
Platylabus pedatorius (FABR.), ♀; ÖG.: St. Lars, gräsm. 8.8.
Hypomecus albitarsis (WESM.), ♂, var. *abdom., exc. segm. 1,*
toto rufo; ÖG.: St. Lars, gräsm.; »ej allm.» (THOMS.).
Tricholabus strigatorius (FABR.), ♀; ÖG.: Åtvid, gräsm. 10.7;
 »mindre allm.» HOLMGR.

Ichneumonides pneustici:

- Colpognathus celerator* (LIN., THOMS.), ♀; ÖG.: Kärna, under
 mossa 24.10; »ej allm.» THOMS.
Centeterus major (WESM.), ♀; ÖG.: St. Lars 22.8; enl. HOLMGR.
 en gång funnen i Sverige af BOHEMAN; ej funnen af THOMSON.
Aethecerus pallicoxa (THOMS.), *A. discolor* (WESM.), ♂; ÖG.:
 St. Lars, på hassel.
Phæogenes semivulpinus (GRAV.), ♂; ÖG.: St. Lars, på hassel o.
 klöfver, aug., sept.
 » *melanogonus* (WESM.), ♀; ÖG.: Kärna, gräsm. 25.8;
 »sälls., isynnerhet ♂» (THOMS.).
 » *ischiomelinus* (GRAV.), ad *crassidens* (THOMS.), ♂;
 ÖG.: St. Lars, ängsm.
 » *impiger* (WESM.), ♀, var. *antenn. fere tot. rufis*;
 ÖG.: St. Lars, ängsm.

Cryptidæ.

Cryptina:

- Cryptus obscurus* (GRAV.), ♂; ÖG.: St. Lars, ängsm. 19.9.
 » *Dianæ* (GRAV.), ♀; Smål.: Vernamo 28.6; ÖG.: St. Lars, ängsm. 8.9.
Gonicryptus glabriculus (THOMS.), ♀; ÖG.: Åtvid 11.7; »sälls.» (THOMS.).
Cænocryptus pubiventris (THOMS.), ♀; ÖG.: St. Lars, ängsm. 10.6; 6.8 (ad *C. rufiventris* [THOMS.]), sannolikt obetydligt skilda arter.
Gombrus armatulus (THOMS.), ♀; ÖG.: Kärna, på klöfver; »funnen i Sk.» (THOMS.).

Phygadeuonina:

- Plectocryptus scansor* (*P. grisescens* (GRAV.)), ♂; Mjölby o. Kärna, järnvägsbank (gräsm.), mycket ymnig en kort tid i slutet af sept.
Trichocryptus cinctorius (GRAV.), ♂; ÖG.: Linkpg, trädg. (*sub herbis*) 10.9.
Microcryptus graminicola (GRAV.), ♂; Smål.: Vernamo 2.7.
Stylocryptus parvientris (GRAV.), ♀; ÖG.: Kärna, gräsm. 21.8; »sälls. Sk.» (THOMS.).
Phygadeuon fumator (GRAV.), ♂; ÖG.: St. Lars, ängsm. 5.8.
 » *grandiceps* (THOMS.), ♀; ÖG.: Norsholm—Gistad, i järnvägskupén 16.9; »funnen vid Pålsjö i Sk.» THOMS.
 » *inflatus* (THOMS.), ♀; ÖG.: St. Lars, ängsm. 19.9.
Hemiteles elymi (THOMS.), ♀; ÖG.: Mjölby, gräsm. 11.9.
Pezomachus agilis (GRAV.), ♂; ÖG.: St. Lars, ängsm. 5.8.

Tryphonidæ.

Tryphonides homalopi:

- Tryphon elongator* (GRAV.), ♂; ÖG.: Kärna, gräsm. 25.8, 27.9.
 » *vulgaris* (HOLMGR.), ♂; Sk.: Stehag 28.6.

- Tryphon trochanteratus* (HOLMGR.), ♂; var. *abdom. nigresc., trochant. postic. supra nigr.*; Sk.: Skärålid, Röstånga, 20 o. 21.6; Smål.: Vernamo 2.7.
- » *brunniventris* (GRAV.), ♀ ♂; Smål.: Vernamo gräsm. 5.7.
- Polyblastus mutabilis* (HOLMGR.), ♂; ÖG.: St. Lars, ängsm. 6.8; »i Lapl.» (HOLMGR.).
- » *pratensis* (GRAV.), ♀; Smål.: Vernamo, gräsm. 28.6; »funnen i Grenna-tr. och ÖG.» (HOLMGR.).
- Mesoleptus typhæ* (FOURCROY), ♂ ♀; Sk.: Stehag 22.6; Smål.: Vernamo, gräsm. 28.6.
- » *genalis* (THOMS.) ad *M. paludicola* (HOLMGR.), ♀; Smål.: Vernamo, gräsm. 28.6.
- Catoglyptus fuscicornis* (GRAV.), ♀; ÖG.: Mjölby, gräsm. 11.9.
- Euryproctus geniculatus* (GRAV.), ♀; Smål.: Vernamo 27.6.
- » *atomator* (GRAV.), ♀; ÖG.: Mjölby, gräsm. 11.9.
- Mesoleius annulipes* (THOMS.), ad *M. colon* (GRAV.), ♀; ÖG.: Lkpg, trädg. 21.9; »funnen vid Båstad Sk.» (THOMS.).
- » *semicaligatus* (GRAV.), ♂; ÖG.: Mjölby, järnvägsbank 22.9.
- » *ruficornis* (GRAV.), ♀; ÖG.: Mjölby, järnvägsbank, gräsm. 22.9.
- » *rufolabris* (ZETT.), ♀; ÖG.: St. Lars 6.8, Kärna, gräsmark 25.8.
- » *hamulus* (GRAV., THOMS.), *M. nobilis* (HOLMGR.), ♂; Smål.: Vernamo 28.6; »sälls., vid Ringsjön Sk.» (THOMS.).
- » *sinuatus* (THOMS.), ♀; ÖG.: Landeryd, på klöfver 13.8; »funnen vid Pålsjö Sk.» (THOMS.).
- » *humellus* (THOMS.), ♂; var; Smål.: Hvittaryd 4.7; »funnen vid Lund» (THOMS.).
- » *albopictus* (GRAV.), ♀; var. *macula humerali et areis metathoracis deficient.*; an sp. nova? ÖG.: Lkpg, trädg. 21.9; »vid Ringsjön Sk.» (THOMS.).

Tryphonides prosopi:

- Exochus gravipes* (GRAV.), ♀; ÖG.: St. Lars, ängsm. 12.9.

Tryphonides schizodonti:

Bassus nemoralis (HOLMGR.), ♂; Smål.: Vernamo 27.6.

Homoporus (Bassus) lateralis (GRAV.), ♀; ÖG.: Norsholm, gräsm.
7.6; »täml. sälls.» (THOMS.).

Tryphonides macrochili:

Banchus volutatorius (LIN.), ♀ ♂; ÖG.: Åtvid, gräsm. 10.7 (10
♀, 1 ♂); Smål.: Vernamo 27.6, endast ♀♀; Sk.: Röstånga
♂, 27.6.

Banchus falcator — f. ö. en af de allmännare parasitstek-
larne — anträffades i förvånande stor mängd i och utmed en
rågåker i Hvittaryds socken i Smål. (4.7); enl. RATZEBURG para-
siterar den på Tallmätaren (*Bupalus piniarius* LIN.); i närmaste
omgivning fanns emellertid där intet tallbestånd.

Pimplariæ.

Ephialtes tuberculatus (FOURCR.), ♀; ÖG.: St. Lars 21.5; vid
tallstubbar (i flykten) 19.9.

» *carbonarius* (CHRIST.), ♀; ÖG.: St. Lars, på gärdes-
gårdar 19.9.

» *rex* (KRIECHB.), ♀; ÖG.: St. Lars, på gärdesg. 12.9;
liksom föreg. ymnig en kort tid medio sept.

Pimpla flavicornis (THOMS.), ♀; ÖG.: Åtvid, gräsm. 8.9.

» *rufata* (GMEL.), ♀; Smål.: Vernamo 28.6.

Glypta ceratites (GRAV.), ♂; ÖG.: Lkpg, trädg. 15.6; »funnen
i Norrl.» (THOMS.).

Lissonota leptogaster (HOLMGR.), ♂; ÖG.: Kärna, gräsm. 21.8;
»rarissime in Smol., Gotl.» (HOLMGR.).

» *bellator* (GRAV.), ♀; Smål.: Hvittaryd 4.7.

» *commixta* (HOLMGR.), ♂; ÖG.: flerst., gräsm., aug.,
sept.

Polysphincta tuberosa (GRAV.); Smål.: Vernamo, juni.

Ophionidæ.

- Anomalon cerinops* (GRAV.), ♂; Sk.: Båstad 24.6.
 » *canaliculatum* (RATZ.), *A. nigricans* (WESM), ♀; Sk.: Stehag 22.6; »*rarius*» (HOLMGR.), »ej sälls. i S. Sverige, äfven i Lapl.» (THOMS.).
- Porizon hostilis* (GRAV.), ♀; ÖG.: Mjölby, järnvägsbank 22.9.
 » *harpurus* (GRAV.), ♀; Smål.: Hvittaryd 4.7.
- Campoplex cultrator* (GRAV.), ♀; Smål.: Vernamo; »*in frutic. rariss. ♂ unic. prope Holmiam, ♀ ignoro*» (HOLMGR.); »N. o. mell. Europa» (THOMS.).
 » *stragifex* (FOERST.), ♀; ÖG.: Åtvid, gräsm. 28.6, 8.7; Sk.: Stehag, Attarp, juni; »ej sälls. i N. o. mell. Europa» (THOMS.).
- Cymodusa leucocera* (HOLMGR.), ♂; ÖG.: Kärna, järnvägsbank 28.9; St. Lars, gräsm. 26.9.
- Casinaria claviventris* (HOLMGR.), ♀; ÖG.: Åtvid, gräsm. 8.9.
- Pyraconon fumipennis* (ZETT.), ♀; Smål.: Vernamo 22.7.
- Limneria longipes* (MÜLL.), *Olesicampa* (THOMS.), ♀; Smål.: Vernamo 27.6.
 » *exareolata* (RATZ.), *Augitia* (THOMS.), ♀; ÖG.: St. Lars, ängsm. 19.9.
 » *rufocincta* (GRAV.), *Anilasta* (THOMS.), ♀, ♂; Öl.: Eriksöre 3.7.
 » *notata* (GRAV.), *Anilasta* (THOMS.), ♀; Smål.: Vernamo, gräsm. 2.7.
 » *clandestina* (HOLMGR.), *Holocremma* (THOMS.), ♀; Smål.: Hvittaryd 4.7. »Funnen i Sk.» (HOLMGR.) »och Lapl.» (THOMS.).
 » *buccata* (THOMS.), *Holocremma* (THOMS.), ♀; ÖG.: St. Lars, gräsm. 8.8; »funnen vid Pålshö i Sk.» (THOMS.).

Braconidæ.

Clidostomi:

- Chelonus rugigena* (THOMS.), ♂; Smål.: Vernamo, juni; Sk.: Båstad 24.6; »sälls.» (THOMS.).

Helcon tardator (NEES), ♀; Öl.: Borgholm 2.7; »i löfskog i Blek. o. Sk.» (THOMS.).

» *æqvator* (NEES), ♂; Smål.: Vernamo, *in ligno*, 5.7; »ej allm.» (THOMS.).

» *femoralis* (NEES), ♀; Smål.: Vernamo, *in ligno*, 6.7.

Macrocentrus infirmus (NEES), *Rogus* (WESM.), ♂; ÖG.: Landeryd, på klöfver 13.9; »ej allm.» (THOMS.).

Leiophron sp. ad *fuscipes* (WESM.), *mandibul. nigr. (non rufi)*, ♂; ÖG.: Lkpgs-tr., på klöfver 13.9; »endast en ♂ funnen vid Lund» (THOMS.).

Cyclostomi:

Rogas irregularis (WESM.), ♂; ÖG.: Åtvid 11.7.

Vipio heteropus (THOMS.), ♂; Smål.: Vernamo, på timmer 12.7; »funnen i ÖG.» (THOMS.).

» *obscuripennis* (THOMS.), ♀; Smål.: Vernamo, ängsm. 8.7; »funnen i Lapl.» (THOMS.).

Bracon fuscicornis (WESM.), ♀; ÖG.: Lkpgs-tr., i ekgaller, kläckn. 20.5; »vid Ringsjön Sk.» (THOMS.).

Doryctes obliteratus (NEES), ♀; Smål.: Vernamo, ängsm.; »ej sälls. i skogstr.» (THOMS.).

Areolarii:

Microgaster meridianus (HAL.), ♀; ÖG.: Lkpg, trädg. 25.9; »flerest. i Sk.» (THOMS.).

Exodonti:

Alysia ruficeps (NEES), ♀; Smål.: Vernamo 28.6; »sälls. i södra Sv.» (THOMS.).

Hymenoptera Phytophaga.

Hylotoma pagana (LATR.), ♂; Öl.: Färjestaden, ängsm. 19.6; »täml. sälls. i S. Sv.» (THOMS.).

- Athalia glabricollis* (THOMS.); Kalm, län: Ljungby, ängsm. 22.6;
»sälls.» (THOMS.).
- Emphytus rufocinctus* (KLUG), ♀; Öl.: Borgholm, buskm. 26.6;
»täml. sälls.» (THOMS.).
- » *calceatus* (KLUG), ♀; Öl.: Borgholm 28.6; »sparsam»
(THOMS.).
- Blenncampa albipes* (KLUG), ♀; ÖG.: St. Lars, ängsm. 31.5.
- » *2-punctata* (KLUG), ♀; ÖG.: Norsholm, gräsm. 9.6;
»sälls., Sk.» (THOMS.).
- Taxonus glabratus* (FALLÉN), ♂; ÖG.: St. Lars, Tinneräng, på
hassel 26.8.
- Macrophya blanda* (FAB.), ♀; Öl.: Borgholm, buskm. 26.6; »ej
allm.» (THOMS.).
- » *rustica* (LIN.), ♀, ♂; Öl.: Borgholm & Tveta, buskm.
23—29 juni; »täml. sälls.» (THOMS.).
- Synairema rubi* (PANZ.), ♀; ÖG.: Norsholm, gräsm. 7.6; »täml.
sälls.» (THOMS.).
- Perineura solitaria* (SCHRANK.), ♀; Kalm. län: Ljungby, ängsm.
- Tenthredo flavicornis* (FAB.), ♂, ♀; Öl.: Borgholm, buskm. 26.6;
Sk.: Stehag 22.6.
- Sirex spectrum* (LIN.), ♀; Kalmar, *in domo*, 14.6.

Fossores.

- Pompilus rufipes* (LIN.), ♂, ♀; Öl.: Färjest., ängsm. 19.6.
- » *fuscmarginatus* (DBM), ♀; ÖG.: St. Lars, fukt. äng
18.8; »sälls. på Gotl.» (THOMS.).
- » *spissus* (SCHIÖDTE), ♀; Öl.: Tveta 29.6.