

Bothriurus vittatus (GUÉR.).

Two specimens from Tatarenda in the Bolivian Chaco. BORELLI has also found it in Bolivia and it is also known as well from Argentine and Brazil, as from Chili and Peru.

All these four species are typically South American like their congeners, and thus certainly indigenous.

SÄLLSYNTARE COLEOPTERA.

III. Från Stockholmstrakten.

Helophorus strigifrons THOMS. Sthlm (Skanstull) maj 1901.

Ceryon littoralis GYLL. Sthlm (Skanstull) vid en bäck aug. 1900.

Philonthus chalcus STEPH. Sthlm (Skanstull, Djurgården m. fl. st.) ej sällsynt i utsipprande saft vårtiden.

Quedius scintillans GRAV. Sthlm (Djurgården) i rutten svamp okt. 1901.

Sunius pulchellus HEER. Sthlm (Rackarebergen) juni 1901, april 1902. Förut funnen i Hall, vid Fjärås af I. B. ERICSON samt vid Kalmar af E. L. HAGLUND.

Oligota subtilis KRAATZ. Sthlm (Rackarebergen, Skanstull) under stenar april 1902.

Baryodma verna SAY. Sthlm (Skanstull) juni 1901.

Leptusa fumida ER. Sthlm (Djurgården) under bark 24 maj 1902.

Gnypeta carbonaria MANNH. Sthlm (Skanstull) vid en bäck maj 1901.

Homalota occulta ER. Sthlm (Skanstull) maj 1901.

Tachyporus solutus ER. Sthlm (Skanstull) våren 1901.

Phlaeostiba plana PAYK. Sthlm (Skanstull) i björksaft 27 maj 1902.

Bolitobius trivotatus ER. Sthlm (Skanstull) i björksaft 18 maj 1902.

Agathidium badium ER. Sthlm (Skanstull) under almbark våren 1901.

Scaphisoma boleti PANZ. Sthlm (Skanstull) på trädsvamp (*Boletus*) juni 1901.

Epurca longula ER. Sthlm (Skanstull) våren 1901.

Cantharis pellucida FABR. Sthlm (Skanstull) 1901.

Hypophlæxus fasciatus FABR. Sthlm (Djurgården, Albano) under ekbark maj, aug. 1902.

Ceuthorrhynchus chalybeus GERM. Sthlm (Skanstull) 1900.

Longitarsus tabidus FABR. Sthlm (Skanstull) 1900.

Longitarsus pratensis PANZ. Sthlm (Skanstull) 1900.

Stockholm, aug. 1902.

Eric Mjöberg.