

OM NÅGRA FYND AF PARASITSTEKLAR FRÅN
SÖDRA ÖSTERGÖTLAND OCH HALLANDS ÅR 1902

AF

H. NORDENSTRÖM.

Under sommaren och hösten 1902 hade jag emellanåt tillfälle göra utflykter i en del af södra Östergötland — hufvudsakligen Stångådalen och trakterna omkring de vackra Kindasjöarne, numera genom den nyanlagda östra centralbanan lättare tillgängliga; därjämte vistades jag under en månad på Hallandsås, med hufvudkvarter i Östra Karup, därifrån några ströftåg äfven gjordes inom Skånegränsen. Fångsten utgjorde i det hela omkring ett par hundra arter — naturligtvis en stor del allmänna — hvilkas bestämning upptagit en god del af tiden under förflutna hösten och vintern, hvarvid för diagnosen af flere arter en värdefull hjälp lämnats af filos. stud. A. ROMAN.

Väderleken var under sommaren 1902 i hög grad ogynnsam för insamling af parasitsteklar, och af den tid, som tillbragtes på Hallandsås — omkring 4 veckor i juli och augusti — gick till följd däraf en del förlorad. Utvecklingen af parasitsteklarne var synbarligen försenad, sannolikt äfven af insektvärlden i allmänhet. Sålunda visade sig på Hallandsås under juli och början af augusti dagfjärilar ytterst sparsamt, afsedt från några af de allmännaste och hårdigaste arterna. Under första veckan af september kunde entomologen glädja sig åt några vackra dagar, och äfven under några soliga dagar i oktober, t. o. m. de sista dagarne af månaden, kunde en excursion löna sig. Sålunda fångades 5—12 okt. i flykten sex arter *Ichneumon* och ett par *Cryptider*, vid samma tid på de ännu gröna bladen af ekbuskar

Ichn. derivator ♂ och *Acanthocryptus nigrita* ♂ samt flere arter (♂♂) af fam. *Pimplariæ*; ännu de sista oktoberdagarne (26 31 okt.) kunde man se, krypande på mossiga stenar, flere arter *Ichneumon* (*I. albicinctus* ♀, *I. fabricator* och *annulator* ♂ ♀), ett par af de vanligare *Pimpla*-arterna (♂♂) äfvensom en *Microcryptus* (♀). Af öfriga parasitsteklar iakttoogs under denna sena årstid endast en Tryphonid (*Acrotomus xanthopus* ♂ ♀, flygande vid ekbuskar den 7 okt.).

Nedanstående förteckning öfver en del af fynden — de sällsyntare i. mindre allmänna — torde åtminstone för en och annan entomolog ha sitt intresse; ett par arter äro antagligen nya för vår fauna. Där ej annorlunda är angifvet, har fångstplatsen varit gräsmark, (naturliga ängar, vallar, dikesrenar), buskar (vanligen hassel) eller häckar af diverse trädslag. — Nomenklaturen hufvudsakligen enligt THOMSON (Opusc. Entom.).

Ichneumonides.

Limerodes arctiventris (BOIE) ♂; Hall: Karup 3. 8, Dörestorp 10. 7; Sk: Grefvie 1. 8; enligt HOLMGREN »rarissime in Suec. merid.». Syntes dock ej vara sällsynt på sluttningarne af Hallandsås.

Ichneumon similatorius (WESM.) = *I. sedulus* (GRAV.), *I. incubitor* (THOMS); ♂; Hall: Karup 3. 9; Ög: Bestorp 17. 8.

I. vestigator (WESM.) ♂; Hall: Karup 20. 7.

I. caloscelis (WESM.) ♀; Hall: Voxtorp 9. 7.

I. derivator (WESM.) ♂; Ög: Bjärka 7. 10; på ekbuskar.

I. lanius (GRAV.) ♂; Ög: Bjärka 20. 6.

I. xanthognathus (THOMS.) ♂; Sk: Hjernarp 8. 7.

Amblyteles triplicatus (THOMS.) (= *A. 7-guttatus* (GRAV.) ♂; Ög: Åtvid 27. 8.

A. Gravenhorsti (WESM.) ♂; Hall: Dörestorp 18. 7; ♂ sälls. enl. THOMS.

A. punctus (GRAV.) ♂; Ög: Åtvid. 27. 8.

Platylabus albinus (GRAV.) ♀; Ög: Bjärka 7. 10; ekbuskar.

Diadromus arrisor (WESM.) ♂; (determ. A. ROMAN); Ög: St. Lars 26. 9.

Phæogenes bellicornis (WESM.) ♂; Ög: Linköping 18.8.

Cryptidæ.

- Habrocryptus alternator* (GRAV.) ♂; Hall: Karup, juli; Vox-
torp 12. 7.
- Spilocryptus fumipennis* (GRAV.) ♂; Hall: Karup, Åsen 14. 7;
Dömostorp 5. 8.
- » *incubitor* (LIN.) (forsitan *S. migrator* var.) ♂; Ög:
Bestorp 17. 8.
- Calocryptus congruens* (GRAV.) ♂; Hall: Karup; juli.
- Plectocryptus curvus* (GRAV.) ♂; Hall: Karup 3. 8; ♂, var. *an-*
tenn. annul. ruf., ibid. (på *Heracleum sibiricum*);
♂; Ög: Linköping 2. 9.
- » *arrogans* (GRAV.) ♂; Ög: Bjärka, i flykten, vid
hasselbuskar, 5. 10.
- Microcryptus femoralis* (THOMS.) ♀; Ög: Bjärka 1. 7; ♂ Ög:
Vestra Harg 8. 6.
- » *perspicillator* ♀ (*M. abdominator*, GRAV. var. 3)
Ög: Hofvetorp 29. 10, krypande på mossor, på
stenar.
- Acanthocryptus nigrita* (GRAV.) ♂; var. *femor. postic. nigr.*,
Ög: Bjärka 12. 10, på ekbuskar.
- » *nigriceps* (THOMS.) ♂; var. *antenn. et femor. po-*
stic. nigr. Hall: Karup 16. 7; Ög: Åtvid 17. 6.
- Atractodes compressus* (THOMS.) ♀; Hall: Karup 16. 7; Dömes-
torp 6. 8.
- » *albobinctus* (CURTIS) ♂ (determ. A. ROMAN) Hall:
Karup 6. 8.
- » *rufipes* (THOMS.) ♂; Ög: Kisa 26. 6.
- Phygadeuon (ad) grandiceps* (THOMS.) ♂ (determ. A. ROMAN),
Ög: St. Lars 26. 9.
- » *hercynicus* (GRAV.) ♂ (determ. A. ROMAN), Ög:
Bjärka, buskmark, i flykten, 4. 10.
- » *cylindraceus* (RUTHE) (determ. A. ROMAN); Hall:
Voxtorp 9. 7.

Tryphonidæ.

- Mesoleptus macrodactylus* (HOLMGR.) (*hadrodactylus* THOMS.)
♂; Hall: Karup; Sk: Hjernarp, juli.

- Euryproctus fuscicornis* (HOLMGR.) (*Phobetus*. THOMS.) ♂ (det. A. ROMAN); Hall: Karup 31. 7.
- Perilissus coxalis* (THOMS.) ♀; Hall: Karup 21. 7; ♂, d:o 30. 7.
» *vernalis* (GRAV.) ♀; Ög: Hofvetorp; ♂, d:o, d:o; Åtvid 17. 6.
- Trematopygus Lethierryi* (THOMS.) ♂ (determ. A. ROMAN); Ög: St. Lars, 29. 5. Enligt THOMS. funnen i Frankrike vid Lille; antagligen ny för Sverige.
- Trematopygus procurator* (GRAV.) ♂ (det. A. ROMAN); Ög: Bjärka, 4. 6.
- Tryphon ephippium* (HOLMGR.) ♀ ♂, Hall: Karup, juli.
» *signator* (GRAV.) ♂; Hall: Dömostorp, 15. 7.
- Mesoleius fallax* (HOLMGR.) ♀; Ög: Bjärka, Hofvetorp, ymnig i maj o. juni.
» *viduus* (HOLMGR.) ♂; var. Hall: Karup 6. 8.
» *melanoleucus* (GRAV.) ♀; Hall: Dömostorp 5. 8.
» (ad) *cruralis* (GRAV.) ♂ (det. A. ROMAN); Ög: Kisa, 26. 6.
- Polyblastus mutabilis* (HOLMGR.) ♀; Ög: Åtvid 27. 8.
» *palustris* (HOLMGR.) ♂; Ög: Kisa, 26. 6. Enligt HOLMGREN funnen i Lappland, men ett ex. förut tagit i Kisa af Dr GOËS.
- Polyblastus rivalis* (HOLMGR.) ♀; Ög: Kisa 26. 7.
- Exenterus succinctus* (GRAV.) ♀; Ög: Kisa, Korpklef 25. 7.
» *morio* (HOLMGR.) ♂; Ög: Linköping, 19. 6; Hofvetorp 25. 6.
» *pumilus* (HOLMGR.) ♂; Hall: Ö. Karup 17. 7.
- Acrotomus insidiator* (HOLMGR.) ♀; Hall: Karup 6. 7.
» *xanthopus* (HOLMGR.) ♀ ♂; Ög: Bjärka, busksnår, flykten 6. 10.
- Chorinæus cristator* (GRAV.) (*Exochus* GRAV.) ♂; Hall: Dömostorp 18. 7; ej beskrifven i THOMSONS I. HOLMGRENS arbeten; HOLMGR. omnämner den dock i en annot. under släktbeskr. af *Chorinæus*. — GRAV. Ichn. Eur. II. pag. 352.
- Colpotrochia elegantula* (SCHRANK) ♂; Hall: Karup, Åsen 18. 7; enligt HOLMGR. »*rarissime in Halland* (Karup) & *Scan.* (Kullen)»; endast ♀ besk. hos HOLMGREN.
- Exetastes illusor* (GRAV.) ♂ ♀; Hall: Karup 31. 7; 3. 8.

Pimplariæ.

- Pimpla stercorator* (GRAV.) ♂; Hall: Karup 6. 7.
 » *detrita* (HOLMGR.) ♂; Hall: Karup 6. 8.
 » *oculatoria* (FABR.) ♀; Ög: Bjärka 19. 7.
 » *angens* (GRAV.) ♂; var. Hall: Karup 6. 7.
Glypta evanescens (RATZ.) ♂; Ög: St. Lars 21. 8.
 » *flavolineata* (GRAV.) ♀; Ög: Bjärka, på ekbuskar, 7. 10.

Ophionidæ.

- Sagaritis varians* (THOMS.) ♂; Hall: Karup 21. 7; Sk: Grefvie 1. 8 (determ. A. ROMAN).
Limneria geniculata (GRAV.) ♀; Ög: Kisa 25. 7; ♂; Hall: Voxtorp 12. 7.
 » *mandibularis* (HOLMGR.) ♀; Ög: Bjärka 14. 6 enligt HOLMGR. »*rariss. in Lapl. & Wg.*».
Nepiesta marginella (THOMS.) ♀ (determ. A. ROMAN); Ög: Bjärka 29. 5.
Omorga faunus (GRAV.) (*Limneria* HOLMGR.) ♀; Ög: St. Lars 2. 6.
 » *ferina* (HOLMGR.) (*Limneria* HOLMGR.) ♂; Ög: St. Lars 21. 8.
Angitia majalis (GRAV.) (*Limneria* HOLMGR.) ♀; Ög: Bjärka 14. 6; Sk: Grefvie 1. 8.
Mesochorus vitticollis (HOLMGR.) ♀ ♂; Hall: Karup 14. 7.
 » (ad) *pectoralis* (RATZEB.) ♀; Ög: Bjärka 14. 6.
 » *confusus* (HOLMGR.) ♀; Ög: Bjärka 14. 6; Hofvetorp 3. 6.
Cremastus interruptor (GRAV.) ♂; Hall: Karup 21. 7.
 » *spectator* (GRAV.) ♀; Ög: Kärna 25. 8; St. Lars 22. 8.

Braconidæ.

- Rogas dimidiatus* (SPINOLA) (*Aleiodes nigripalpis*, WESM.) ♂; Ög: Åtvid 28. 7.
Aleiodes circumscriptus (NEES) ♀; Hall: Dömostorp 11. 7.
Microdus calculator (PANZ.) ♂; Hall: Karup 11. 7; 19. 7.
Earinus delusor (WESM.); Ög: Hofvetorp 3. 6.
Meteorus nigricollis (THOMS.) (*Perilitus* WESM.), ♀; Hall: juli.
Ichneutes reunitor (NEES) ♀ (det. A. ROMAN); Ög: Bjärka 4. 6.