

BEITRÄGE ZUR KENNTNIS DER INSEKTENFAUNA
VON KAMERUN.

Contribution à la connaissance de la faune entomologique du Cameroun.

N:o 22.

LYCIDES RECUELLIS AU CAMEROUN PAR LE
PROF. YNGVE SJÖSTEDT

DÉTERMINÉS PAR

J. BOURGEOIS.

1. *Lycus (Acantholycus) elegans* MURRAY et var. *a* BOURG.
Nombreux ex. ♂ et ♀.
2. *Lycus (Acantholycus) latissimus* L. var. *praemorsus*
DALM. Nombreux ex. ♂ et ♀.
3. — var. *harpago* T. THOMS. 2 ♂, 5 ♀.
4. *Lycus (Acantholycus) apicalis* T. THOMS. 4 ♂, 5 ♀.
5. *Lycus* (in sp.) *semiamplexus* MURRAY. 2 ♂, 2 ♀.
6. *Lycus* (in sp.) *foliaceus* DALM. 2 ♂.
7. *Lycus* (in sp.) *immersus* MURRAY. 1 ♂.
8. *Lycus* (in sp.) *Sjöstedti* sp. nov. — ♂. *Obcordatus*,
subplanatus, *nitidiusculus*, *brevissime pubescens*, *ochraceus*, *thoracis disco longitudinaliter elytrisque dimidio posteriore nigris*,
nigredine elytrorum antice communiter profunde emarginata;
capite nitidiusculo, nigro, rostro subcylindrico, medio paullulum
coarctato, palpis antennisque nigris, his articulo 3:o tribus
sequentibus simul sumptis æquali; prothorace longitudine basi
fere æquali, apicem versus angustato, antice subrotundato-lobato,
postice recte truncato, lateribus late reflexo-marginatis, sat dense
ruguloso-punctatis, disco medio leviter canaliculato, antice cari-

nulato, angulis anticis rotundatis, posticis subacutis, vix productis; scutello elongato-quadrato, pone medium longitudinaliter impresso, nigro; elytris basi prothoracis latitudine, dein sat abrupte rotundatim dilatatis, postice conjunctim rotundatis, lateraliter reflexo-marginatis, 4-costatis, costa tertia humiliore, antice abbreviata, quarta ad humeros valde cristato-inflata, crista elevata, rotundata, postice introrsum curvata, mutica; corpore subtus nitidior, fusco-nigro, metasterno medio abdomineque ad latera rufescentibus, segmentis 8-conspicuis, penultimo postice medio triangulariter inciso, ultimo angustato, forcipe acuminato, apice simplici. Long. 15 mill.; lat. hum. 3 $\frac{1}{2}$ mill.; lat. elytr. maxim. 9 mill. — ♀. Hucusque invisita.

Cameroun, un ex. ♂.

Cette espèce est voisine de mon *L. prodigiosus* (Ann. Soc. ent. Fr., 1902, p. 660). Elle en diffère surtout par la dilatation humérale en forme de lamelle à contour arrondi; ne présentant aucune trace de prolongement spiniforme. En outre, le prothorax est atténué en avant au lieu d'être subcarré, le 3:e article des antennes est un peu moins long, les élytres sont conjointement arrondis à l'extrémité et n'ont pas de tache scutellaire.

Je me fais un plaisir de la dédier à M. le Professeur YNGVE SJÖSTEDT, qui l'a découverte.

9. *Lycus (Lopholycus) Staudingeri* BOURG. 2 ♂.
10. *Lycus (Haplolycus) sinuatus* DALM. Nombreux ex. ♂ et ♀.
11. *Lycus (Haplolycus) Dalmani* BOURG. 2 ♀.
12. *Lycus (Haplolycus) fastiditus* BOURG. 1 ♀.
13. *Cladophorus calidus* HAR. 1 ♀.
14. *Cladophorus sulcicollis* T. THOMS. 1 ♀.
15. *Cautires latithorax* BOURG. 1 ♂, 1 ♀.
16. *Cautires dichrocerus* BOURG. 2 ♀.
17. *Cautires unicolor* BOURG. 2 ♂.
18. *Cautires inflatellus* BOURG. 1 ♂, 1 ♀. — Ces deux ex. ne diffèrent du type que par les élytres subparallèles, à peine dilatés postérieurement et par la tête et le premier article des antennes rembrunis. Les bords latéraux du prothorax sont aussi un peu sinués dans leur milieu, tandis qu'ils sont droits dans mes exemplaires typiques; mais cette conformation, essentiellement

variable d'un individu à l'autre, n'a aucune valeur spécifique chez les Lycides.

19. *Xylobanus semiflabellatus* T. THOMS., var. *xanthaspis* BOURG. 5 ♀.

20. *Stadenus antennalis* BOURG., 1 ex. ♀.

La collection, qui contient 108 ex., appartient au Musée d'Histoire Naturelle de Stockholm.

NÅGRA FÖR VÅR FAUNA NYA COLEOPTERA

AF

ERIC MJÖBERG.

Stenus formicetorum MANNH. 1 ex. funnet på Öland vid Vipetorp juli 1902.

Scaphisoma subalpinum REITTER. 1 ex. anträffadt på trädsvamp vid Nockeby (Sthlm) 26 juli 1903.

Cryptophagus subfumatus KRAATZ. Sthlm (Skanstull; Ent. Anst.) 3 ex. ²⁴/₂, ⁵/₆ 1903.

Anchicera clavigera GANGLB. 2 ex. funna på Öland vid Källa under på stranden uppkastad tång ³/₇ 1902. Förekommer ytterst sparsamt i mellersta Europa och lär en gång ha anträffats i Finland.

Trichoceble fulvohirta BRISOUT. 1 ♀ ex. anträffadt vid Halltorp på Öland, inkrupet under löst sittande ekbark ¹⁸/₆ 1902.