

EN I SVERIGE FUNNEN NY ARADID.

AF

ERIC MJÖBERG.

Aneurus tuberculatus n. sp. Species *A. laevi* FABR. affinis, ferruginea, antice obscurior, antennarum articulo secundo minus rotundato, paullo longiore, basin versus minus attenuato; pronoti lateribus antice minus sinuatis, disco depresso; scutello transversim irregulariter rugoso, apice minus late rotundato; membra minus fortiter rugulosa; connexivo serie tuberculorum, quae in vicem oblonga maiora, et rotundata minora; abdomine utrinque longitudinaliter, irregulariter strigoso.

Mas: Mare *A. laevis* angustior, segmento quinto ventrali margine postico profundius sinuato, segmento sexto illo longiore, margine apicali profunde sinuato, parte posteriore distincte transversim strigoso, angulis posticis late rotundatis, segmento tertio dorsali marginibus sinuato, quarto illo paullo longiore, medio tuberculo distincto instructo, quinto quarto fere aequilongo, sexto margine apicali fortiter sinuato, segmento genitali robustiore et longiore, tuberculo parvo basi utrinque parum minore.

Long. corp. $4\frac{1}{3}$ mm.

Femina: Abdomine lateribus magis rotundatis, segmento tertio ventrali margine antico parum sinuato, postico subrecto, segmento quarto marginibus subrecto, illo paullo breviore, segmento quinto margine postico sat fortiter distincteque sinuato, antecedente paullo breviore, segmento sexto margine apicali fortiter sinuato, segmento tertio dorsali marginibus sinuato, quarto margine postico late sinuato, antecedente paullo longiore, quinto

margine postico subrecto, quarto longiore, sexto margine apicali fortiter sinuato, segmento primo genitali margine apicali distincte sinuato, angulis posticis prominulis, segmento secundo minutissimo, subtus processibus duobus ultra apicem excedentibus instructo.

Long. corp. 5 mm.

Nympha: Statura imagini omnino similis, luteo-alba, anten-
nis, pedibus, pectore rudimentisque hemelytrorum obscurioribus,
oculis rubentibus; segmentis omnibus ventralibus et dorsalibus
maculis duodecim subfuscis, duabus in medio maximis, harum
utrinque quattuor minoribus, quarum qui ad basin segmenti mino-
res, rotundatae, ceterae duæ pone medium oblongæ, illis fere duplo
maiores et in extremo margine una oblonga; segmento secundo
dorsali et ventrali et ex parte primo — id magis in mare —
macula magna rufa distincta; ad angulos anteriores pronoti ma-
cula oblonga subfusca, sculptura rugosa; segmentis genitalibus
subfuscis.

Mus. Holm.

Flera ex. anträffade på Öland vid Borgholm under barken
af gamla stubbar 10 juni 1902.

NOTIS.

Af den sällsynta, hos oss endast vid Alnarp i Skåne funna
histeriden *Saprinus laetus* Er. anträffade undertecknad midsom-
martiden förra året ett ex. på fruktträd vid komministersbostället
Hagen i Västergötland.

B. Varenius.
