

margine postico subrecto, quarto longiore, sexto margine apicali fortiter sinuato, segmento primo genitali margine apicali distincte sinuato, angulis posticis prominulis, segmento secundo minutissimo, subtus processibus duobus ultra apicem excedentibus instructo.

Long. corp. 5 mm.

Nympha: Statura imagini omnino similis, luteo-alba, anten-
nis, pedibus, pectore rudimentisque hemelytrorum obscurioribus,
oculis rubentibus; segmentis omnibus ventralibus et dorsalibus
maculis duodecim subfuscis, duabus in medio maximis, harum
utrinque quattuor minoribus, quarum qui ad basin segmenti mino-
res, rotundatae, ceterae duæ pone medium oblongæ, illis fere duplo
maiores et in extremo margine una oblonga; segmento secundo
dorsali et ventrali et ex parte primo — id magis in mare —
macula magna rufa distincta; ad angulos anteriores pronoti ma-
cula oblonga subfusca, sculptura rugosa; segmentis genitalibus
subfuscis.

Mus. Holm.

Flera ex. anträffade på Öland vid Borgholm under barken
af gamla stubbar 10 juni 1902.

NOTIS.

Af den sällsynta, hos oss endast vid Alnarp i Skåne funna
histeriden *Saprinus laetus* Er. anträffade undertecknad midsom-
martiden förra året ett ex. på fruktträd vid komministersbostället
Hagen i Västergötland.

B. Varenius.
