

under sådana omständigheter, som två cellkakor medhinnas i samma bo på en sommar, medan åter under vanliga förhållanden afkommans utveckling försiggår så långsamt i dessa bon utan värmande skyddshölje, att individantalet i jämförelse med *Vespa*-samhällenas förblir mycket oansenligt.

NYA FYNDORTER FÖR COLEOPTERA.

- Amara littorea* THOMS. 1 ex. vid Helsingborg under sten maj 1903.
- Brachinus crepitans* L. 1 ex. vid Markaryd i Småland juli 1902.
- Omophron limbatus* FABR. Allmän vid småsjöarnes stränder vid Markaryd i Småland juli 1903.
- Helophorus laticollis* THOMS. 1 ex. i en damm vid Pålsjö nära Helsingborg juni 1903.
- Cryptopleurum minutum* HERBST. Allmän vårtiden i torr spillning i Helsingborgstrakten.
- Agathidium piceum* THOMS. 1 ex. Roeskilde (Boserup skoo) Danmark $24/5$ 1903.
- Lathridius Bergrothi* REITT. Tämligen allmän i Helsingborg framför allt å torkade skelett, som blifvit uthängda till blekning.
- Uloma Perroudi* MULS. Ej sällsynt i ruttnade sågspånshögar vid sågverken i Markarydstrakten i Småland juli 1902.
- Tribolium confusum* DUV. Allmän i sädesmagasinerna i Helsingborg.
- Calandra oryzae* L. 2 ex. i ett magasin i Helsingborg.
- Hylobius pineti* FABR. 1 ex. vid Engelholm genom håfning augusti 1903.
- Catops longulus* KELLN. I mängd vid Helsingborg den 17 mars 1904.
- Telmatophilus Schönherri* GYLL. Pålsjö skog vid Helsingborg under håfning den 20 aug. 1903.
- Cryptophagus subfumatus* KRAATZ. I källare i Helsingborg i stor mängd under vintern 1903—4.
- Baryodma laevigata* GYLL. 1 ex. under en sten i Engelholms kronplantering den 17 mars 1904.

Harald Muchardt.