

NÅGRA FÖR VÅR FAUNA NYA INSEKTER

AF
ERIC MJÖBERG.

Agathidium Brisouti REITT. Stockholm (Skanstull) 1 ex Anträffadt under en sten våren 1903. Denna art, som förut är känd från Ungarn och Siebenbürgen, står nära *A. varians* BECK., men skiljs lätt från denna genom frånvaron af frontalimpressionen samt genom sculptur och färg. Att den ej anträffats på mellanliggande lokaler torde få tillskrifvas bristande undersökning.

Dermestes hæmorrhoidalis KÜST. Flera ex. anträffade på Stockholms Högskolas zootomiska institut på skelettdelar och dylikt i oktober 1903 och april 1904. Antagligen har denna art blifvit införd, möjligen med dr HEDINS skelettsamlingar från Asien. Arten beskreds först af KÜSTER 1853. Två år senare beskreds samma djur mycket utförligt af MULSANT under namn af *gulo*. Den senare författaren nämner om dess förekomst: »Cette espèce se trouve assez rarement à Lyon, dans les habitations». Enligt REITTER (1880) skulle denna art vara synonym med *peruvianus* LAP. och vara »über die ganze Erde verbreitet», något som dock SEIDLITZ drager i tvifvelsmål. Själf har jag på grund af bristande material ej varit i tillfälle att undersöka saken. Angående artens biologi m. m. har jag däremot gjort en del iakttagelser, och skola dessa en annan gång meddelas, då de ännu icke är afslutade. Jag anser det ganska troligt, att denna art, som för ungefär ena-handa lefnadssätt som vår vanliga *D. lardarius* L., uti vårt land kan acclimatiseras. Så har visat sig vara fallet med en

annan införd, likaledes inomhus förekommande skalbaggart, nämligen *Necrobia rufipes* DE GEER. Denna, som med hudar från Kaschgar blifvit införd till Sverige, förekommer ännu rätt allmänt på Zootomiska Institutet i Stockholm. Den har äfven blifvit anträffad uti Lund på skelettsamlingar och dylikt och tyckes nu på allvar ha bosatt sig här i landet. Angående *D. haemorrhoidalis* KÜST. måste man dock medgifva, att den vid en jämförelse med vår bekanta art *D. lardarius* L. ej på långt nära visar sig vara så väl rustad i kampen för tillvaron som denna, hvilken som bekant uti förställningskonst, förmåga att uthärda svält och umbäranden af alla slag m. m. synes vara synnerligen väl rustad för alla eventualiteter.

Scolopostethus pictus SH. var. **antennalis** HORW. Af denna varietet, som förut är iakttagen uti Ungarn, anträffades flera ex. april 1903 vid Årstagiken under på stranden uppkastade vassrör, växtdelar m. m. Af hufvudformen iakttogs ej några ex. (determin. O. REUTER).

Stålia boops SCHIÖDTE. 1 ♀ (f. **macroptera**) anträffadt vid Statens Entomologiska Anstalt på en *Salix*-buske 4 juli 1903. Denna art, som öfverallt är en sällsynthet, upptages af PUTON bland annat från Skandinavien. Enligt benäget meddelande från Prof. O. REUTER är den emellertid honom veterligen inom Skandinaviens område funnen endast uti Danmark och i södra Finland (Helsingfors och södra Karelen). Forma **brachyptera**, som är afgjordt sällsyntare, är anträffad i trakten af Berlin.