

BIDRAG TILL HUMLORNAS OCH SNYLT-
HUMLORNAS UTBREDNING.

Bombus hortorum L. forma *runderatus* FABR. Ej sällsynt i nordvästra Skåne, anträffas vanligen bland hufvudformerna på *Lamium album*, *Galeopsis* och *Galeobdolon*.

Bombus subterraneus L. Anträffad våren 1904 i Jordbodalen vid Helsingborg i många ex. samt vid Grefvie i södra Halland i Aug. 1903. Alla exemplaren infångades på *Lamium album* samt *Centaurea scabiosa* och *C. jacea*.

Bombus agrorum FABR. var. *tricuspis* KRIECH. 10 ex. anträffades under Augusti—September 1903 i Pålsjö backar vid Helsingborg på *Trifolium*.

Bombus agrorum FABR. var. *minorum* FABR. 4 ex. i Juli 1904 på samma växter som föregående.

Bombus arenicola TH. Allmän i Råå torfmosse söder om Helsingborg sommaren 1904. Anträffades talrikast på *Cirsium oleraceum*.

Bombus soræensis FABR. ♀. Allmän i Pålsjö vid Helsingborg på *Rubus idæus* i Juni och Juli 1904. ♀ och ♂ lefva mest å blommorna på *Campanula rotundifolia*.

Bombus soræensis FABR. var. *proteus* GERST. Anträffad jämte hufvudformen samt på samma lokal.

Bombus hypnorum L. Ej sällsynt i Helsingborgstrakten under Juli och Augusti 1904, träffades vanligen på *Campanula* och *Cirsium*.

Bombus jonellus KIRB. 1 ♀ funnen i Augusti 1903 i Pålsjö backar vid Helsingborg.

Psithyrus vestalis FOURCR. Mycket allmän i nordvästra Skåne. Lefver på *Cirsium*.

Psithyrus globosus EVERS. Anträffad i Jordbodalen på *Rubus* i Juli 1904.

Harald Muchardt.
