

Några fynd af sällsyntare Parasitsteklar i Halland och Östergötland år 1906.

Af

H. Nordenström.

Från exkursioner under 1906 i sydvästra Halland, hufvudsakligen Hallandsås (äfvén södra sluttningen däraf inom Skåne) jämte slättbygden norr om åsen och i sydöstra Östergötland hafva antecknats nedanstående fynd af sällsyntare parasitsteklar; några få fynd från föregående år, först nu bestämda äro äfvén medtagna.

Ichneumonides.

Coelichneumon biannulatus (GRAV.) ♂ (syn. *Ichn. comitator* var 1. WESM.) Ög., Bjärka 27. 5; »sälls. i mell. och s. Sv.» (THOMS.).

Coelichneumon fuscipes (GMEL.) ♀; Hall., Karup, hagtornshäckar; 16. 6.

Ichneumon albicollis (MESM.) ♀ Hall., Himmeslöf, på *Aegopodium*; 20. 6.

Ichneumon macrocerus (THOMS.) ♂; Hall., Karup, 5. 8; »sälls. i Sk.» (THOMS.).

Ichneumon cessatar (MÜLL.) ♀ Ög., Malexander, år 1896, leg. Dr A. v. GOËS; enligt HOLMGR. »min. frequ.»; THOMSON uppger den »ej sällsynt»; ett ♂-ex. af mig anträffadt i sydv. Smål. (Hvittaryd) 1899.

Ichneumon discriminator (WESM.) ♂; Ög., Bjärka, buskmark (i flykten), 6 okt. 1902; arten hör till *gracilicornis*-gruppen (THOMS.) af subgenus *Ichneumon*, long. 15 mm.; förut funnen

- i Tyskl., Frankr. o. Spanien; ♀ beskrifven af WESM. i »Remarques critiques». Ny för Sverige.
- Ichneumon bicingulatus* (GRAV.) ♀; Ög., Bjärka, 24. 5; Syn: *Amblyt. interruptus* (HOLMGR.) »sälls. i n. o. mell. Sv.» (THOMS.). Enligt benäget meddelande af Hr Kand. A. ROMAN ej ovanlig (♂♀) i Lima i Dal.
- Cratichneumon dissimilis* (GRAV.) ♂; Ög., Linköping, trädg., 26. 5; en var. punctis albis vertic. defic. Hall. 24. 7. 06, en var. vertice et scut. totis nigris, Hall. 10. 7; enl. THOMS. säll. i mell. och s. Sv.
- Cratichneumon albilvarvatus* (GRAV.) ♂; Ög., St Lars, Tinnerängarne, 11. 6. 1899.
- Amblyteles truncicola* (THOMS.) ♀; Hall., Karup, trädg. på häckar; 2. 7; 10. 6; »sälls., funnen vid Lund» (THOMS.).
- Diadromus intermedius* (MESM., HOLMGR.) ♀; Ög., Linköping, trädg., på *Aegopodium*, 1. 9; »Upl. Smol. rarius» (HOLMGR.)
- Diadromus varicolor* (WESM.) ♀; Ög., St. Lars, Tinnerängarne 7. 9; »sälls. men utbredd i n. och mell. Eur.» (THOMS.); »Scania, Smol. rarius» (HOLMGR.).
- Phæogenes mysticus* (MESM.) ♂; Ög., St. Lars, 22. 8; 25. 8. Enligt THOMS. ett par ex. funna på Skanör sand; »Gotl., Upl., rariss.» (HOLMGR.).

Cryptidæ.

- Spilocryptus dispar* (THOMS.) ♂; Hall., Dömostorp, 13. 8; en vackert tecknad art med hvit petiolus abdom; »ej sälls. i Sv. och Dmk» (THOMS.); ej förut af mig anträffad.
- Cratocryptus opacus* (THOMS.) ♀; Hall., Dömostorp, 13. 8; »sälls. i Sk. o. Dmk» (THOMS.).
- Microcryptus lacteator* (GRAV.) ♀; Hall., Karup, 14. 8; »sälls. Gotl.» (THOMS.).
- Phygodenon nitidus* (GRAV.) ♂; Hall., Karup, på häckar, 8. 6; »funnen vid Ringsjön och Ydinge» (THOMS.).
- Phygodenon trichops* (THOMS.) ♀; Ög., Bjärka 24. 5; »funnen vid Lund» (THOMS.).
- Acanthocryptus nigrita* (THOMS.) ♂; Ög., St. Lars, 22. 8; (ett ♀-ex. från Dr NERÉNS samlingar, fyndort obekant); »sälls. vid Lund» (THOMS.).

- Atractodes flavicoxa* (THOMS.) ♀; Hall., Hasslöf, åsen 4. 7. 1903.
 » » » ♂; Hall., Karup 26. 6; Ög. Bjärka
 9. 8. 1903; »funnen vid Lund» (THOMS.); afviker från
 THOMSONS beskr. endast genom storleken (5—7 mm.).

Tryphonidæ.

- Hadrodactylus gracilis* (HOLMGR.) ♂♀; Hall., Karup; slutet
 af juni 1906, ♂ i mängd; »Hall., Karup» (HOLMGR.); under
 de fyra föregående somrar jag besökt Karup ej anträffad.
Hadrodactylus confusus (HOLMGR.) ♂; Hall., Karup, 26. 6;
 »Lapl., Dal., Dovre» (HOLMGR.).
Hadrodactylus sp. ♀ (ad *nigricoxam* (THOMS.), eller snarare
 nov. sp.); long. omkr. 15 mm.; Hall., Karup, högplatån
 af Hallandsås; 25. 6.
Stiphrosomus (Catoglyptus) montanus (GRAV.) ♀; Hall., Karup,
 21. 6; »Dal., Lapl.» (HOLMGR.).
Euryproctus bivinctus (GRAV.) ♂; Skåne, Hjernarp, södra
 sluttn. af Hallandsås; 16. 6; »Ostrog. rariss.» (HOLMGR.).
Hypamblys (Syndipnus) buccatus (HOLMGR.) ♂; Ög., St. Lars,
 Smedstad 22. 8; »Lappon. merid. rariss.; Scania: Lind-
 holmen» (HOLMGR.).
Barytarbus virgultorum (GRAV.) ♂; Hall., Karup, hagtorns-
 häckar, 3—8 juni; »södra Sverige» (THOMS.); ♀ förut af
 mig funnen i Karup.
Scopesus tegularis (THOMS.) (= *Mesoleius longipes*) (HOLMGR.),
 ♂; Hall., Karup, 5. 8; »funnen vid Stockholm» (THOMS.);
 »Ostrog. Gusum» (HOLMGR.).
Polyblastus subalpinus (HOLMGR.) ♂; Hall., Karup; 28. 6;
 »Dal., Lapl., Dovre» (HOLMGR.).
Cteniscus pictus (GRAV.) ♂; Hall., Karup 25. 6; »Sk., Dal.,
 Lapl.» (HOLMGR.).
 » *hostilis* (HOLMGR.) ♀; Hall., Karup, Gropmöllan
 5. 6; ♂ Dömostorp 6. 8; »Upl., Dal., Lapl.,
 alpb. Norveg.» (HOLMGR.).
Exochus tibialis (HOLMGR.) ♀; Ög., Kärna 21. 9.
Promethus festivus (GRAV.) ♂; Ög., Linköpingstr; på *Daucus*
 19. 7; Hall., Karup, klöfveråkrar, 10. 8; »Skåne, Ring-
 sjön» (HOLMGR.), »mindre allm. i s. Sv.» (THOMS.).

- Homotropus pallipes* (GRAV.) ♂; Ög., Kärna, 21. 8; »sälls.» (THOMS.).
 » *graculus* (GRAV.) ♀; Ög., St. Lars, 22. 8; »sälls.» (THOMS.).
 » *pictus* (GRAV.) ♀; Ög., Linköping, trädg., på *Cornus sanguinea*, 17—20 sept.; »sälls.» (THOMS.).
Dyspetus prærogator (GRAV.) ♂; Hall., Karup, juni o. aug.; »Pålsjö, Holmeja i Sk.» (THOMS.).
Hyperacmus crassicornis (GRAV.) ♀; Ög., Kärna, 21. 8; »Boh., Lapl., Sk.» (HOLMGR.).

Pimplariæ.

- Apechtis (Pimpla) quadridentata* (THOMS.) ♂; Ög., Kärna 21. 9; »templ. sälls. s. Sv.» (THOMS.).
Glypta ad nigripes (STROBL.) ♂; Hall., Karup, Gropmöllan, 5. 6.

Ophionidæ.

- Campoplex notabilis* (FOERST) ♂; Hall., Karup, hagtornshäckar, 7. 6; ♀ Karup, trädg., juni.
Campoplex leptogaster (HOLMGR.) ♀; Hall., Karup, Himmelslöf, på *Aegopodium* — *Urtica*-vegetation vid åstränder, 13. 6; »ej allm. i n. och mell. Eur.» (THOMS.).
Cymodusa antennator (HOLMGR.) ♂; Hall., Hasslöf, Algutstorp 8. 7; 19. 7.
Sagaritis annulata (GRAV.) ♂; Ög., Linköping, trädg., på *Cornus sanguinea*, 18. 9.
Tranosema arenicola (THOMS.) ♂; Ög., Linköping, trädg., på *Cornus sanguinea*.
Angitia exareolata (RATZ.) ♂; Hall., Karup 5. 8; ♀ förut funnen i Ög.

Braconidæ.

- Rogas dissector* (NEES) ♂; Hall., Karup, 21. 6; »sparsamt utbredd Lapl.—Sk.» (THOMS.).
Opius cingulatus (MESM.) ♂; Hall., Karup, 14. 8; »funnen vid Lund» (THOMS.).
 » *procerus* (WESM.) ♂; Hall., Karup, häckar; 16. 6.
Phænocarpa (Alysia) pratellæ (HALID.) ♀; Ög., Bjärka, 13. 9.

- Microdus tegularis* (THOMS.) ♀♂; Ög., Banketorp 19. 8; Hall., Karup 23. 6; 14. 8; »funnen vid Pålsjö, Sk.» (THOMS.).
Microgaster fulvicrus (THOMS.) ♂; Hall., Karup, klöfveråker, 11. 8; 10. 6; »funnen vid Torekov» (THOMS.).
Apanteles falcatus (NEES) ♀; Hall., Karup, 10. 8.
Coelinus niger(?) (NEES) ♀; Ög., Kärna 23. 8; »funnen vid Lund» (THOMS.).

Vid bestämningen af flere af ofvanstående arter har äfven nu välvillig hjälp lämnats mig af Herr Kandidat A. ROMAN.

Om *Aneurus tuberculatus* MjÖB.

Af den under ofvanstående namn af hr MjÖBERG från Öland beskrifna *Aneurus*-arten har jag i Helsingfors museum varit i tillfälle att undersöka typexemplar och funnit, att arten är grundad på större, väl utvecklade exemplar af den vanliga *laevis* L. Hr MjÖBERG anför icke i sin beskrifning, hvarigenom den skulle skilja sig från *laevis*, men förmodligen är det de olika af honom beskrifna tuberklerna, som föranledt honom till artens uppställande. Dessa tuberkler finnas emellertid hos alla *Aneurus*-arter och äro rätteligen att anse såsom släktkaraktär. De äro olika starkt utvecklade hos olika exemplar af samma art, men hos ingen af de talrika dels beskrifna, dels obeskrifna arter af detta släkte, som jag undersökt, har jag funnit, att de skulle saknas. Prof. REUTER har äfven undersökt *tuberculatus* och har icke kunnat finna någon skillnad mellan denna och *laevis*.¹

E. Bergroth.

¹ Kand. MjÖBERG har anhållit att vid annat tillfälle i E. T. få bemöta detta uttalande.

Red.