

- Microdus tegularis* (THOMS.) ♀♂; Ög., Banketorp 19. 8; Hall., Karup 23. 6; 14. 8; »funnen vid Pålsjö, Sk.» (THOMS.).
Microgaster fulvicrus (THOMS.) ♂; Hall., Karup, klöfveråker, 11. 8; 10. 6; »funnen vid Torekov» (THOMS.).
Apanteles falcatus (NEES) ♀; Hall., Karup, 10. 8.
Coelinus niger(?) (NEES) ♀; Ög., Kärna 23. 8; »funnen vid Lund» (THOMS.).

Vid bestämningen af flere af ofvanstående arter har äfven nu välvillig hjälp lämnats mig af Herr Kandidat A. ROMAN.

Om *Aneurus tuberculatus* MjöB.

Af den under ofvanstående namn af hr MjöBERG från Öland beskrifna *Aneurus*-arten har jag i Helsingfors museum varit i tillfälle att undersöka typexemplar och funnit, att arten är grundad på större, väl utvecklade exemplar af den vanliga *laevis* L. Hr MjöBERG anför icke i sin beskrifning, hvarigenom den skulle skilja sig från *laevis*, men förmodligen är det de olika af honom beskrifna tuberkelerna, som föranledt honom till artens uppställande. Dessa tuberkler finnas emellertid hos alla *Aneurus*-arter och äro rätteligen att anse såsom släktkaraktär. De äro olika starkt utvecklade hos olika exemplar af samma art, men hos ingen af de talrika dels beskrifna, dels obeskrifna arter af detta släkte, som jag undersökt, har jag funnit, att de skulle saknas. Prof. REUTER har äfven undersökt *tuberculatus* och har icke kunnat finna någon skillnad mellan denna och *laevis*.¹

E. Bergroth.

¹ Kand. MjöBERG har anhållit att vid annat tillfälle i E. T. få bemöta detta uttalande.

Red.