

Honans öfre genitallameller äro i midten lika långa som hälften af den mellersta räta delen af sista dorsalsegmentets bakrand.

Af släktet *Aphelocheirus* WESTW., som synes hafva en vidsträckt utbredning (se HORVATHS Monografi i Termesget. Füzet. XXXII, 1899) i det att olika arter äro kända från Nya Guinea, Madagaskar och Kina, äro 3 arter kända från Europa.

A. nigrita är beskrifven (den långvingade formen) från Ungern och sedermera återfunnen i Finland (den kortvingade formen) på flodbotten i Nykyrka och Rivinebb socknar (O. M. REUTER; Medd. Soc. pro Fauna & Flora Fennica. H. 26. (1900) p. 128). Prof. REUTER uttalar emellertid sina tvifvel om, huruvida HORVATHS bestämning är riktig, enär den ungerska formens hufvud är märkbart längre än hos den finska formen, och vingdimensionen ej brukar inverka äfven på hufvudets byggnad. Frågan kan enligt REUTER ej afgöras, förr än arten är känd i båda formerna.

För Sverige nya eller sällsynta skalbaggar.

Senare undersökningar öfver coleopterfaunan i södra delarne af landet hafva kommit mig att anträffa ej blott en del sällsyntare arter såsom *Drapetes biguttatus* PILL. (*equestris* THOMS.), förut känd från Vg. och nu återfunnen vid Slättåkra prestgård i Hall., *Malachius marginellus* OLIV. återfunnen i Skåne (Ruus), *Calandra oryzæ* L. anträffad vid Helsingborg o. s. v. utan äfven två för vår fauna nya arter: *Gabrius thermarum* AUBÉ och *Coeliodes cardui* HERBST, båda förut kända från Danmark. Af dessa anträffades den förra vid Malmö, den senare vid Helsingborg.

B. Varenius.