

Podalirius parietinus (FABR.) ♂ ♀, Hall., Karup, talrikt förekom på en murvägg i juli. (THOMS.: »ej sälls. i s. Sv.»; AURIV.: »Sk.—Upl.».)

Några för årstiden mindre vanliga fynd kunna möjligen förtjäna omnämnas, bl. a. så sent som d. 27 okt. *Protichneumon fusorius* LIN.) ♀, ett ståtligt ex. om 23 mm:s längd, som anträffades krypande på den gräsklädda väggkanten i en barrskog $\frac{3}{4}$ mil söder om Linköping; på samma dag och lokal en ♀ af *Ichneumon lineator* (GRAV.). Under en af de varma dagarna i medlet af okt. togos i flykten i en solbelyst skogsbacke i samma trakt bl. a.: *Ephialtes Rex* (KRIECHB.) ♀, *Tromatobia angens* (GRAV.) ♀, *Stenichneumon castaneus* (WESM.) var. ♂, *Ichneumon deliratorius* (LIN.) ♂, *Cratichneumon nigritarius* (WESM.) ♂, *Chasmodes motatorius* (GRAV.) ♀, *Microcryptus micropterus* (GRAV.) ♂, *Lagarotus semicaligatus* ♂ ♀ (GRAV.), förutom åtskilliga fynd på mossa, ss. *Microcryptus sericans* (GRAV.) ♀ eller på vedstaplar (*Melanichneumon monostagon* (GRAV.) ♀).

Litteratur.

En ny svensk fjäril. Under rubriken »Neue palæarctische Macrolepidopteren» beskriver i »Deutsche Entomol. Zeitschr. Iris» för år 1908 den bekante lepidopterologen R. PÜNGELER en för Sverige och vetenskapen ny fjäril, som han benämner *Mamestra rangnovi*.

Då arten förtjänar att vidare eftersökas i våra fjälltrakter, lämnas härmed en öfversättning af originalbeskrifningen: »Spännvidd 34 mm., framvingens längd 17 mm. Genom framvingarnas färg och teckning lik entonica ex. af *M. glauca* men mindre, med mycket bredare vingar, den halfva tvärlinjen ej skönjbar, inre midtlinjen enkel, svart, på midten starkare böjd, yttre midtlinjen och ringfläcken ej skönjbara, njurfläcken längre och smalare, endast på utsidan hvit, tappfläcken ej ljusare inuti, våglinjen otydlig, nästan parallell med kanten, icke alls tandad, pilfläckarna innanför densamma smärre och bredare svarta, vingfransar otydligare ljusfläckiga. Bakvingar mera rundade, rent hvita, med bredt, djupsvart kantband, gråsvart framkant, mörk diskpunkt och hvita fransar. Fram- och bakvingarnas undersida med tydliga diskpunkter, utan båglinjer; framvingarna undertill gråpudrade med bredt, mörkt kantband, bakvingarna hvita med mattare och smalare kantband än på öfversidan. Palper mindre starkt håriga, smalare och ljusare; ögon håriga som hos *M. glauca* och ej cilierade; antenner hos ♀ som hos nämnda art, hos ♂ trubbtandade, tofslikt cilierade. Panna hvit, hjässa, mellan- och bakkropp grå med hvit inblandning, bakkropp utan hårtofsar, ben af vanlig beskaffenhet.» Förf. framhåller vidare, att arten är tydligt skild från *M. skrælingia* v. *kenteana* STAUD., med hvilken den på grund af de ljusa bakvingarna kunde förväxlas, samt att dess plats är mellan *M. glauca* och *skrælingia*. Två ex., ♂ och ♀, fångades 1907 i Lule lappmark på skogbevuxen kärrmark. Einar Wahlgren.