

Lidingön 1905. — *Agrotis cuprea* HB. funnen i Jämtland vid Åre, juli 1906. — *Aporophyla lutulenta* BKH. funnen i Grenna aug. 1909. — *Tenioctampa stabilis* VIEW funnen på Lidingön juni 1895. — *Tenioctampa populeti* TR. under de senare åren ofta iakttagen på Lidingön. — *Orrhodia wau punctatum* ESP. tvänne gånger under olika år funnen på Lidingön. — *Calocampa vetusta* HB. funnen i Jämtland vid Dufved 1906 och vid Storlien 1907. — *Lobophora viretata* HB. infångad vid Älkistan utanför Stockholm i maj 1908 och på Lidingön i maj 1910. Förut ej anträffad i Sverige. — *Scotosia rhamnata* SCHIFF, anträffad på Lidingön sommaren 1909. — *Larentia firmata* HB. ett ex. infångadt på Lidingön 1895. — *Tephroclystia inturbata* HB. funnen på Lidingön 1908. Sannolikt ej förut anträffad i Sverige. — *Tephroclystia sinuosaria* EV. funnen vid Mölnbo i Södermanland 1903 samt under de senare åren flera gånger på Lidingön. — *Chloroclystis debiliata* HB. under de senare åren ofta iakttagen i larvstadiet dels å Lidingön, dels för öfrigt i Stockholms närmaste omgifningar.

J. PEYRON.

**Några fjärilnotiser.** — *Hadena adusta* ESP.: puppan är i bakändan försedd med tvänne tätställda, i spetsarna något utböjda taggar; ofvan och på sidorna om dessa finnas inalles fyra korta, borstlika taggar. — *Hadena sublustris* ESP.: puppan är rödbrun, i bakändan försedd med en ofvan skrofflig, kullrig, undertill djupt skålformig förlängning, i hvars bakkant märkas 2 gröfre och två finare taggar. — *Herminia cribrumalis* HB. funnen i Södermanland (hittills blott i Sk. och Vg.). — *Lythria purpuraria* L. togs i flera, synbarligen nykläckta ex. vid Nacka (Stockholm) den 12 maj 1908. — *Larentia (Cidaria) firmata* HB. funnen i Hagaparken vid Stockholm, sept. 1908. — *L. pupillata* THUNB. funnen vid Mellösa i Södermanland 1906. — *Euosmia certata* HB. funnen vid Nacka, Stockholm. — *Scotosia transversata* (HUFN.) ROTT. funnen i Väddö i norra Roslagen 1908. — *Fitudonia carbonaria* CL. funnen vid Flen, Södermanland 1906. — *Acidalia virgularia* HB. tagen på Djurö, Uppland, 1905. — *Dianthoecia albimacula* BKH. Väddö, Uppland 1908. Å samma lokal anträffades den 8 juli 1908 nykläckta ex. af *Agrotis ypsilon* ROTT. samt larven af *Heterogenea limacodes* HUFN. — Slutligen må nämnas att ett ex. af *Phragmatobia fuliginosa* L. med alla röda teckningar skarpt gula (ex. ej urblekt) anträffats i Södermanland 1906.

Artisten D. LJUNGAHL.

Stockholm.