

Termitidæ novæ a Cl. Dom. Maurice de
Rothschild ex Æthiopia reportatæ

quas descripsit

Yngve Sjöstedt.

(Vorläufige Mitteilung.)

Termes rothschildianus n. sp.

Imago alata: *T. Palmquisti* SJÖST. (Kilimandjaro-Meru-Exped. 15: 1, Taf. 4, Fig. A.; pag. 16) maxime affinis, sed major, alis longioribus, latoribus pauloque pallidioribus, capite angustiore, articulo 3 multo minore quam 4 distinguendus. Exp. alar. 72, long. c. alis 37, long. alæ ant. 33, lat. alæ ant. 9, long. corp. c. cap. 15 mm.

Abessinien: Addis Abbeba.

Termes anceps n. sp.

Miles: *T. badio* HAV. valde affinis sed statura minore differt. Long. 8—9, corp. c. mandib. 3,5—4, lat. cap. 2—2,7, mandib. 1—1,4 mm.

Abessinien et Brit. O. Afr.

Termes mediocris n. sp.

Miles: *T. latericio* HAV. maxime affinis sed multo minor. Long. 3,5, corp. c. mand. 1,65 mm.

Abessinien: Diré Daoua.

Eutermes æthiopicus n. sp.

Miles: Capite rectangulari postice rotundato; labro linguiformi, longo, apice angustato hyalino; mandibulis angustis,

fere rectis, antrorsum attenuatis, dentibus nullis; antennis 14-articulatis; prothorace fere ovali postice late applanato, lobo anteriore brevissimo, medio exciso, $\frac{1}{4}$ angustiore quam capite. Cap. c. mand. 2, lat. cap. 0,75, mand. 0,75 mm. *E. Sikoræ* (WASM.) affinis.

Abessinien: Kottouki Dagaga.

Eutermes abyssinicus n. sp.

Miles: Capite rectangulari, sine fontanello; mandibulis brevibus, robustis, curvatis, margine inferiore medio dente parvulo instructo; labro brevi, linguiformi, latiore quam longo; antennis 14-articulatis; prothorace circiter dimidia parte latitudinis capitis, lobo antico medio non exciso. Long. 8, corp. c. mand. 3,8, cap. 2,7, lat. cap. 1,85 mm.

Abessinien: Hicka.

Nähere Beschreibungen und Abbildungen in dem Rothschild'schen Reisewerk!