

*H. vigintiduopunctata* L. Västerås.

\* \* \*

*Colias paleno* L. På en myr emellan Sala och Broddbo.

*Macroglossa bombylifformis* ESP. Sala vid Skuggan.

*Anthrocera exulans* HOCHENW. v. *vanadis* DALM. Storlien.

*Hepialus fusconebulosus* DE GER. Jmtl.: Åre.

*H. lupulinus* L. Jmtl.: Enafors.

*Eulepia cribrum* L. Sala vid Långforsen.

*Pygæra anastomosis* L. Västerås.

*Dasypteria templi* THUNB. Västerås, Sala, Uppsala.

*Cidaria serraria* ZELLER. Jmtl.: Mattmar.

*C. flavofasciata* THUNB. Jmtl.: Mattmar.

*C. adaquata* BORKH. Jmtl.: Åre.

*C. montanata* BORKH. v. *lapponica* STAUD. Jmtl.: Åre.

\* \* \*

*Orthetrum corulescens* FAB. Gottl.: Dalhem. I numera afidne lektor C. H. JOHANSSONS samling finnes ett exemplar på tecknad »Vstm». Han kunde dock ej erinra sig, när och hvar fyndet gjorts, hvarför kanske en feletikettering föreligger.

*Leucorrhinia albifrons* BURM. Sala Långforsen.

*Epithea bimaculata* CHARP. »Östergötland» enligt lektor C. H. JOHANSSON.

*Cordulegaster annulatus* LATR. Vstm.: Skinnskatteberg.

*Agrion Johansonii* WALLGR. Sala. K. V. OSSIAN DAHLGREN.

## Nya lokaler för insekter.

### Orthoptera.

*Labia minor* L. — Tyckes förekomma något sporadiskt i Uppsalatrakten. Vissa somrar har jag funnit den mycket allmänt vid stranden af Mälaren (Skokloster), då den isynnerhet observeras flygande om kvällen.

### Hemiptera Heteroptera.

*Atractus Dalmani* SCHILL. — Ett expl. taget af mig vid Uppsala 1907.

*Dasycoris pilicornis* BURM. — Två exempl. erhållna genom häfning i gräs 1910 i Vassunda socken (Uppl.).

*Pachymerus Rolandi* L. — Ett par expl. i Uppsala.

*Gerris argentata* SCHUMM. — Täml. allm. i Mälaren vid Vassunda socken.

*Coranus subapterus* DE GEER. — Allmän på en sandmark vid Uppsala. Äfven »forma macroptera» träffas där ej så sällsynt.

*Piezostethus formicetorum* BOH. — Allm. i stackar af Formica rufa vid Uppsala.

### Hymenoptera Aculeata.

*Podalirius retusus* L. — I »Svensk Insektfauna» uppgifves utbredn.-området till Sk.—Sthlm. Är emellertid ej sällsynt i Uppsalatrakten.

*Osmia leaiana* KIRBY. — Allmän i Vassunda socken, Uppland. Jag har funnit den bygga i trä.

- Anthidium manicatum* L. — Allmän i Uppsala, isynnerhet om hösten på blommor af labiater i Bot. trädgården.
- A. punctatum* LATR. — Flere expl. (hannar) funna i Vassunda 1910.
- Ceratina cyanea* KIRB. — En hona anträffades  $\frac{5}{5}$  1910 i Vassunda socken (i »Svensk Insektfauna» uppgifven endast för Öland).
- Nomada jacobæe* PANZ. — Två expl. funna i »sandgropen» vid Uppsala 1910.
- N. fabriciana* L. — Ett expl. taget i Vassunda.
- Melitta hæmorrhoidalis* FABR. — Tre expl. funna i trakten af Skokloster.
- Andrena nigriceps* KIRB. — Ett par expl. fångade vid Uppsala 1910.
- A. tarsata* NYL. — Ett expl. funnet i Vassunda 1910.
- Halictus zonulus* SM. — Funnen i Uppsala 1910.
- H. minutissimus* KIRB. — 1910 i maj anträffades en ♀ vid Uppsala.
- H. leucopus* KIRB. — Ej sällsynt vid Uppsala.
- Prosopis Rinki* GORSKI. — En ♀ funnen 1910 i Vassunda socken.
- Psammophila affinis* KIRB. — Ett expl. taget vid Uppsala.
- Pemphredon rugifer* DAHLB. — Ett par expl. funna vid Uppsala.
- P. morio* V. d. LIND. — Äfven af denna art äro några expl. tagna vid Uppsala.
- Nysson dimidiatus* JUR. — Af denna art har jag funnit några expl. å spridda lokaler i Uppsala omgifningar. Den har alltid iakttagits på sandmark.
- Hoplomerus levipes* SHUCK. — I Vassunda är ett expl. funnet 1910.
- Priocnemis pusillus* SCHIÖDTE. — Ett expl. taget i Uppsala 1910.
- Calicurgus hyalinatus* FABR. — Många expl. äro funna i Uppsala samt i Vassunda socken.
- Polyergus rufescens* LATR. — Våren 1910 anträffades i Lassby backar invid Uppsala en tämligen stor koloni af denna art. — Är äfven iakttagen i Vassunda socken (ett enda expl.).

### Diptera.

- Microchrysa flavicornis* MEIG. — Ett expl. Vassunda.
- Tabanus rusticus* L. — Ett expl. Vassunda 1910.
- Argyramæba æthiops* FABR. — Vassunda 1910.
- Nephrocerus lapponicus* ZETT. — Två expl. erhöles 1910 i Vassunda (genom häfning i gräs).
- Pipiza luteitarsis* ZETT. — Funnen i Vassunda.
- Didea fasciata* MACQ. — I expl. 1910 i Vassunda.
- Syrphus grossulariæ* MEIG. — Tämligen allmän vid Uppsala.
- Eristalis pertinax* SCOP. — Ej sälls. vid Uppsala.
- Microdon mutabilis* L. — Flera expl. äro fångade genom häfning i gräs i Vassunda, där äfven larver äro iakttagna, sittande å undersidan af stenar, under hvilka Formica fusca byggt bo.

### Lepidoptera.

- Arctia aulica* L. — Ett expl. funnet i Vassunda (uppgifves i



»Nordens fjärilar» förekomma Sk.—Sthlm).

### Coleoptera.

*Nebria brevicollis* FABR. — Funnen å Gottland 1905 och i mängd å Kinnekulle 1907 (under kalkstenar).

*Lebia cyanocephala* L. — Täml. allmän i Uppsala omgifningar såväl under stenar som under bark.

*Dromius marginellus* FABR. — Denna art förekommer synnerligen allmänt omkring Uppsala, och man finner den dels inkrupen under barken af skadade tallar, del också under stenar.

*D. nigriventris* THOMS. — Ett expl. taget strax söder om Uppsala, vid Flottsund.

*Leja gilvipes* STURM. — Funnen vid Uppsala (stranden af Fyrisån).

*Badister unipustulatus* BON. — Flere expl. fångades 1906 vid stranden af ett litet kärr beläget vid sandåsen några kilometer söder om Uppsala.

*Deronectes halensis* FABR. — I en damm vid Ekeby nära Uppsala äro flera expl. tagna af denna art; f. ö. funnen på flera lokaler omkring Uppsala.

*Othius fulvipennis* ER. — Allm. vid Uppsala.

*Tetartopeus punctatus* ZETT. — Denna nordliga form förekommer rätt allmänt på Uppsalaslätten. Flera expl. tagna på Polacksbacken invid staden.

*Conurus pubescens* PAYK. — Denna art har jag påträffat rätt all-

mänt under barken af gamla afdöda björkar i Uppsala-trakten.

*Bryocharis analis* THOMS. — Några expl. funna i Uppsala.

*Bryaxis sanguinea* L. — Ett expl. vid Uppsala.

*Cytillus auricomus* DUFT. — Jag har funnit några expl. vid Uppsala, vanligen i närheten af vatten.

*Saprinus nitidulus* FABR. — mycket allmän vid Uppsala.

*Saprinus immundus* GYLL. — Funnen på Öland 1910 (sandfälten vid Böda).

*Dendrophilus punctatus* HERBST. — Ett expl. Uppsala.

*Aphodius scybalarius* FABR. — Flere expl. funna i Uppsala.

*Chrysobothrys affinis* FABR. — Denna art fann jag i Vassunda socken i juni 1905, då fem expl. infångades på en ris-hög, bestående af torra hasslar.

*Throsacus dermestoides* L. — Ett par expl. tagna i Vassunda.

*Hypophleus longulus* GYLL. — Funnen i Uppsala.

*Eryx ater* FABR. — Funnen i Vassunda socken (genom håfning i gräs).

*Mordellistena abdominalis* FABR. — Många expl. funna i Vassunda och vid Uppsala.

*Rhinosimus planirostris* FABR. — Förekommer allm. omkring Uppsala.

*Pytho depressus* L. — 1906 anträffades i ett vedupplag i Uppsala en mängd exemplar af arten (i alla utvecklingsstadier) under barken af tallstockar.

*Anthicus ater* PANZ. — Förekom ett år mycket allmänt i Uppsala, men har hvarken förr

eller senare iakttagits där i mängd.

*Sitona hispidulus* FABR. — Jag har funnit den allm. såväl i Västergötland som Uppland.

*Toxotus meridianus* L. — Är anträffad i Vassunda socken, Uppland. Där har jag de flesta somrar funnit den vara till ytterlighet allmän.

*Pogonochærus ovatus* GOEZE. — Flere expl. vid Uppsala.

*P. hispidus* L. — Ett expl. funnet i Vassunda.

*Donacia cinerea* HERBST. — Fun-  
Uppsala <sup>10</sup>/<sub>3</sub> 1911.

nen i Botaniska trädgårdens damm, Uppsala.

*D. braccata* SCOP. — Ej sällsynt å flera lokaler i Väster-  
vikstrakten (G. TYDÉN).

*Chrysomela hæmoptera* L. — Fun-  
nen å Kinnekulle.

*Coccidula scutellata* HERBST. —  
Några expl. funna på Phrag-  
mites i Skofjärden vid Vas-  
sunda socken.

*Halyzia duodecimguttata* PODA.  
— Ytterst allmän i Vassunda  
och Sko socknar (Uppl.) å  
*Corylus avellana*.

O. LUNDBLAD.

**Några sällsynta fjärilfynd.** — Af ingenjör DAVID ARVÉN har riksmuseet erhållit ett vackert exemplar af *Sphinx neri*, fångadt vid Avesta natten mellan den 6—7 oktober detta år. Denna svärmare tillhör egentligen medelhafsländerna och är hos oss funnen blott på Gottland, hvarifrån museet äger ett exemplar.

Ett par andra mycket vackra fjärilfynd ha gjorts af studeranden ERIC NORDSTRAND. Det ena är en *Arctia purpurata*, anträffad vid Hoftuna i Uppland omkring den 9 juli 1910, det andra en *Deilephila euphorbia*, tagen på östra Langö den 24 juli 1910. Den förra är ny för Sverige den senare är förut funnen i Skåne. Båda hafva förvärfvats för riksmuseet.

Y. S.

### Rättelse.

Vid genomläsandet af det i förra häftet af Ent. Tidskrift införda protokollet från föreningens sammankomst den 24 sept. 1910, fördt af prof. Aurivillius, blef jag rätt öfverraskad af dess ordalydelse. I den skrifvelse, som jag vid min afgang från sekreterarebefattningen inom föreningen inlämnade, finnes icke något af den långa motivering, som där tillskrifves mig, och som ej heller öfverensstämmer med rätta förhållandet. Det vore önskvärdt, att i protokollen ej inflöte annat, än som står i öfverensstämmelse med de faktiska förhållanden, hvarpå de grundats.

Y. S.