

## Anteckningar om några fynd af Parasitsteklar under 1909—10.

Af

### H. Nordenström.

Af nedannämnde härstamma de fleste från fortsatta excursioner i Syd-Halland (Hallandsås) och nordvästra Skåne samt sydöstra Östergötland (från Linköpingstrakten till Kalmarlänsgränsen).

### Tryphonidæ.

Det kanske bästa fyndet tillhör denna grupp, nämligen *Sphinctus serotinus* (GRAV.) ♂, Ög, Bjärka, 28. 8. 10, på hassel; enligt GRAV. funnen vid Berlin och Halle samt i Italien («in coryletis»); bestämningen af D:r A. ROMAN, som sett ett ex. i Upsala zool. museum (utan angifven lokal). — *Hyperacmus crassicornis* (GRAV.) ♂, Hall. 28. 8. 09; enligt HOLMGR. endast ♀ funnen i Sverige; enligt meddelande af D:r ROMAN har THOMS. beskrifvit ♂ i Deutsche Ent. Zeitschr. (utan angifvande af lokal). — *Lamachus marginatus* (BRISCHKE) ♀ Ög, St. Lars, på tallstammar 7. 10; enligt THOMS. funnen vid Ilstorp, Sk. — *Spudæus assiduus* (HOLMGR.) ♀ Ög., Bjärka 4. 8. — *Perispuda facialis* (GRAV.) ♂, Ög. St. Lars, vid hasselbuskar, i flykten, 26. 5. *Sphécophaga vesparum* CURT. ♀, Ög, Bjärka 5. 6. — *Notopygus (Polycinetis) resplendens* (HOLMGR.) ♀, Hall., Karup, åsen, 22. 6; («frutic. rariss.» HOLMGR.). — *Erromenus frenator* (GRAV.) Hall., Karup, 2. 7, gräsmark. — *Metopiüs (ad) anxius* (WESM.) ♀, var. facie tota nigra, Sk. Hjernarp (sydsidan af Hallandsås) vid buskar, i flykten; ex.,

som har hufvud, thorax och 2:dra segm. svarta, genom strukturen af margo faciei närmast denna art. — *Smicroplectrus erosus* (HOLMGR.) ♂ Hall., Karup, 24. 6, 2. 7, gräsmark, i flykten; dessutom 2 ex. tagna i Karup 1907 på fol. Ceraci; enligt HOLMGR. endast ett ♀ ex. funnet vid Anneberg, Smål. af BOHEMAN. — *Mesoleius nivalis* (HOLMGR.) ♂ Ög., Bjärka, 15. 8, gräsmark. — *Homotropus caudatus* (THOMS.) ♀ Ög., Linköping, 24. 5. på flor. Loniceræ.

### Cryptidæ.

*Cratocryptus subpetiolatus* (GRAV.) ♀ Ög., St. Lars, på tallstammar 7. 10; »funnen i Danmark» (THOMS.). — *Cratocryptus pleuralis* (THOMS.) ♀ Ög., St. Lars, på blad af unga ekar 19. 5. — *Spilocryptus nasutus* (THOMS.) ♀ Ög., Linköping, på buskar; »Sk., Gotl., Öl.» (THOMS.). — *Spilocryptus tibialis* (THOMS.) ♂, Hall., Karup, flor. Aegopodii 27. 8; skild fr. *S. migrator* genom abdomens form; »Sk., Öl.» (THOMS.). — *Coelocryptus rufinus* (GRAV.) ♂ Hall., Karup, 12. 6, »sälls. i s. Sv.» (THOMS.). — *Phygadeuon clypearis* (STROBL.) ♂ ♀ Ög., St. Lars, Wallaskogen, på hassel, 28. 8; båda ex. tagna på samma buske; enligt SCHMIED. funnen i Steiermark och Thüringen.

### Ichneumonidæ.

*Amblyteles truncicola* (THOMS.) ♂, Hall., Karup, i boningsrum på golfplankor, 10. 7. »Sälls. vid Lund» (THOMS.). — *Amblyteles Fabricii* (GRAV.) *melanocerus* (WESM.) ♀ Hall., Karup, 2. 7, antennis totis nigris. — *Ichneumon terminatorius* (GRAV.) ♀ Hall., Karup, på umbellater, 11. 7; enligt THOMS. sälls. i s. Sv., hvilket väl gäller ♀, då ♂ är täml. vanlig. — *Ichneumon fusorius* (L.) ♀ Ög., St. Lars, Rosenkälla, barrskog, funnen tre år å rad på denna plats, krypande på dikesrenar; en ♀ för flere år sedan kläckt ur puppa af *Sphinx Pinastris* (intagen 19. 10, kläckning 10. 1). — *Platylabus Thedenii* (HOLMGR.) ♂ Hall., Karup 28. 8; gräsmark. — *Aethecerus rugifrons* (HOLMGR.) ♀ Ög., St. Lars, på Ekbuskar 30. 9; sälls. (THOMS.). — *Diadromus intermedius* (HOLMGR.) ♀ Hall., Karup, gräsmark 9. 7, förut funnen i Ög., Linköping, på Aegopodium.

### Pimplariæ.

*Coleocentrus excitator* (PODA) ♀, Ög., Bjärka, på aspstubbar, 5.6; ex. 23 mm. i längd. — *Xylonomus pilicornis* (GRAV.) (*Sterotrichus* FÖRST.) ♀ var. *obscura* (abdom. toto nigro); Ög., St. Lars, gräsmark, 13.5. — *Ephialtes gnathaulax* (THOMS.) ♂, Ög., St. Lars, vid buskar, i flykten, 19.5; förut endast ♀♀ här anträffade. — *Lissonota tenerrima* (THOMS.) ♂ *impressor* (HOLMGR.); Hall., Karup, hafsstranden, graminosis, 25.8.

### Ophionidæ.

*Demophorus arenicola* (THOMS.) ♀ Hall., Karup, hafsstr. 2.7; »på sandfält i Sk. och Öl.» (Thoms.) — *Diaparsis nutritor* (GRAV.) ♀ Hall., Karup, 12.6; »Esperöd, Sk.» (THOMS.) — *Campoplex angustatus* (THOMS.) ♀ Ög., St. Lars, 24.9. — *Angitia areolaris* (HOLMGR.) ♀ Hall., Karup, hafsstranden 24.8. — *Angitia vestigialis* (RATZ.) ♂, Hall., Karup, åsen, gräsmark.

### Braconidæ.

*Phylacter annulicornis* (NEES) ♂ Hall., Hasslöf 20.7. — *Microgaster messorius* (HAL.) ♂ Ög, Bjärka, 8.8; »funnen vid Örtofta, Sk.» (THOMS.). — *Chelonus Gravenhorsti* (NEES) ♂ Hall., Karup, hafsstranden, 29.7; »täml. sälls. i s. Sv.» (THOMS.); arterna af detta sl. talrikt förekommande på denna hafsstrands graminéer. *Opius truncatus* (WESM.) ♂; Hall., Karup 18.7, gräsmark; »Pålsjö och Ramlösa i Sk.» (THOMS.).

\* \* \*

Dessutom några fynd inom andra grupper af hymenoptera: *Apidæ*: *Osmia maritima* (FR.) ♀ Hall., Karup, hafsstranden, på Thymus 20.7; *Osmia rufa* (L.) ♀ Hall., Karup, murväggar, 12.6; *Coelionys quadridentata* (L.) ♀ Hall., Karup, hafsstranden 12.7, på murväggar 24.6; *Melitta leporina* (PANZ.) ♂ Hall., Karup, gräsmark, 25.7; *Prosopis brevicornis* (NYL.) ♂, Hall., Karup, hafsstranden 2.7; *Heriades florisonis* (L.) ♀ Ög., Bjärka 1.8; *Andrena cineraria* (L.) ♂ Ög., St. Lars, 28.4, på *Salix repens*; ♀ på dikesrenar 2.5.